

NÍVEL Superior



**Concurso Público para Servidor
Técnico-Administrativo
UFBA e UFRB 2009**

Fisioterapeuta



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA • PROGRAD/SSOA
Rua João das Botas, nº 31 - Canela • CEP: 40110-160
Salvador - Bahia - Brasil • Telefax: (71) 3283-7820
www.concursos.ufba.br • ssoa@ufba.br

INSTRUÇÕES

Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.

1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos **referente ao cargo a que você está concorrendo**:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 101 a 130

- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você **ganha** 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale -0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você **não ganha** o ponto da questão que errou e ainda **perde**, em cada resposta errada, 0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem perde nada**.

2. Folha de Respostas

- Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
- **NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.**
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

Exemplo da Marcação
na Folha de Respostas

01	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
03	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- **O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.**
-

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISIOTERAPEUTA

QUESTÕES de 101 a 130

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **101** a **130**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 101

A oxigenoterapia acelera a resolução dos pneumotórax através do aumento da absorção de nitrogênio.

Questão 102

Nas condições de acidose respiratória e na alcalose metabólica, o gás carbônico (CO₂) total eleva-se.

Questão 103

A Bronquite Crônica é definida, em termos clínicos, como uma condição na qual a tosse produtiva crônica com expectoração mucosa ou mucopurulenta está presente por, no mínimo, três meses por ano, durante, pelo menos, dois anos consecutivos.

Questão 104

Imagem radiológica de condensação pulmonar do tipo retrátil é sugestiva de Enfisema Pulmonar.

Questão 105

O CPAP, administrado via nasal, é indicado para pacientes acima de 20 kg.

Questão 106

Os músculos abdominais, supridos pelos nervos espinhais de T6-T12 são essenciais para a expiração forçada e para a tosse produtiva, pois estabilizam as costelas inferiores e auxiliam a função do diafragma.

Questão 107

A Doença de Parkinson corresponde a uma desordem neuroanatômica e neuroquímica dos núcleos da base e suas conexões, e a postura adotada pelo seu portador é de flexão de todas as articulações, com ombros arqueados, cabeça para frente e marcha com diminuição dos movimentos automáticos dissociados.

Questão 108

O efeito de sedação da massagem terapêutica é dado, quando essa técnica é realizada sem variações agudas na pressão, com movimentos ritmados, de forma lenta e repetitiva.

Questão 109

Alterações na sensibilidade protetora de pacientes com Hanseníase podem ser quantificadas através da estesiometria com utilização dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, cujo resultado pode variar de sensibilidade normal até perda total da sensibilidade protetora.

Questão 110

O declínio funcional de um indivíduo inicia-se a partir dos 30 anos, e as alterações funcionais e anatômicas que, com o decorrer do tempo, ocorrem naturalmente no organismo denominam-se **senilidade**.

Questão 111

A Doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa cerebral primária, que é progressiva, irreversível, de curso fatal e predomina no sexo feminino.

Questão 112

A fase de apoio da marcha representa, aproximadamente, 60% de seu ciclo total e inicia-se com o choque do calcanhar, momento este em que os músculos tibial anterior e tibial posterior se contraem, concêntricamente, para manter concomitantemente o tornozelo em dorsiflexão e inversão.

Questão 113

A contratura isquêmica de Volkman representa uma seqüela da síndrome compartimental associada à fratura supracondilar do úmero.

QUESTÕES de 114 a 116

Paciente, 43 anos, sexo feminino, bancária há 15 anos, portadora de hérnia de disco (extrusa) posterolateral esquerda entre L5-S1, diagnosticada através da ressonância nuclear magnética, encontra-se na fase aguda, com quadro de dor irradiada para o membro correspondente e incapacidade funcional para atividades laborativas e da vida diária.

Questão 114

Dor e parestesia na face anteromedial da perna esquerda são aspectos clínicos que traduzem comprometimento da raiz nervosa ao nível de L5-S1.

Questão 115

Os exercícios de hiperextensão de Mackenzie deverão ser introduzidos na fase subaguda.

Questão 116

Nesse caso, o reflexo aquileu pode estar diminuído.

Questão 117

A fratura do colo do fêmur possui elevada incidência em mulheres idosas e, por não existir periosteó nessa área, sua consolidação ocorrerá através do endosteó.

Questão 118

O método de Kleinert para mobilização passiva precoce, pós-reparo do tendão flexor da mão, permite contração isotônica concêntrica resistida dos extensores dos dedos e nenhuma contração dos tendões flexores reparados.

Questão 119

Quadro clínico caracterizado por diminuição da sensibilidade e atrofia da eminência tenar e, ainda, pela incapacidade de realizar a pinça indicador-polegar é característico da Síndrome do Canal de Gyon.

Questão 120

O processo de atrofia consequente à inatividade muscular começa após a primeira semana do início do repouso, resultando na redução da massa muscular, do diâmetro da célula muscular e do número de fibras musculares.

Questão 121

O tratamento inicial da Doença de Scheuermann é conservador, consistindo em extensão torácica, exercícios de alongamento da cadeia muscular anterior do abdome e na proibição de levantamento de peso.

Questão 122

A amputação de Syme permite descarga distal sobre o coto, consistindo em uma amputação ao nível transtarsiano.

Questão 123

São componentes de uma prótese canadense modular (desarticulação): cesto pélvico, articulação protética do quadril anteriorizada, segmento de coxa tubular, joelho protético, segmento de perna tubular, articulação do tornozelo e pé protético, podendo opcionalmente usar espuma e meia estéticas.

Questão 124

Um aparelho de ultrassom com frequência de 1mhz, aplicado em tecido mole, através de um transdutor de 3cm, terá um campo de ação estendendo-se 15cm a partir do cabeçote de tratamento.

Questão 125

A estimulação elétrica em nível sensorial para modulação da dor é definida como uma estimulação acima dos limiares sensorial e motor.

Questão 126

A laserterapia de baixa intensidade tem sido empregada em vários estudos, devido à sua ação analgésica e anti-inflamatória e também por aumentar a microcirculação local e por ocasionar aumento na regeneração dos tecidos.

Questão 127

Movimentos assimétricos, como saltitar e galopar, surgem inicialmente no lado dominante da criança, sendo que essa assimetria diminui a partir dos três anos de idade.

Questão 128

A Enfermidade de Still afeta principalmente meninos com idade inferior a 15 anos e sua clínica se assemelha à da artrite reumatóide do adulto em muitos aspectos que incluem a ocorrência de comprometimento visual.

Questão 129

Para os bebês portadores de amiotrofia espinhal, deverá ser realizada a elevação da cabeceira do berço.

Questão 130

A Artrogripose Múltipla é uma afecção congênita, caracterizada pela substituição das fibras musculares por tecido fibroso, levando a uma postura de contração articular global, em que se destaca a contratura dos pés em eversão e dorsiflexão.



Universidade Federal da Bahia

**Direitos autorais reservados. Proibida a
reprodução, ainda que parcial, sem autorização
prévia da Universidade Federal da Bahia - UFBA**