



SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009
UROLOGIA
Código 141

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

➤ Conhecimentos Gerais

CIRURGIA GERAL

Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

CLÍNICA MÉDICA

Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

COLUNA II

- () Agravamento de insuficiência arterial periférica
- () Edema
- () Menor efeito em negros
- () Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptção de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- () O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- () O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- () O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

➤ PEDIATRIA

Questão 13

Em crianças, a tétrede clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

SAÚDE PÚBLICA

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

COLUNA II

- () Odds Ratio
() Risco Relativo
() Razão de Médias
() Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.

Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

➤ Conhecimentos Específicos

Questão 21

Assinale a alternativa que representa a medicação com **menor probabilidade** de associação com a disfunção erétil.

- A) Atenolol
- B) Enalapril
- C) Amitriptilina
- D) Carbamazepina

Questão 22

Assinale o tratamento que é **mais corretamente** indicado para o tratamento da ejaculação precoce.

- A) Inibidores da recaptção da serotonina
- B) Implante de prótese peniana
- C) Postectomia
- D) Neurotripsia cirúrgica

Questão 23

Com relação às fístulas uroginecológicas, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Fístulas vesicovaginais pós-radioterapia para tumores ginecológicos que aparecem após 10 anos, sugerem recorrência tumoral.
- B) A interposição de retalho gorduroso pediculado (*epíplon* ou *Martius*) é recomendada em todos os casos de reparo de fístula vesicovaginal, pois aumenta significativamente a taxa de sucesso cirúrgico.
- C) Apesar da conduta clássica de se esperar cerca de três a seis meses para se indicar a correção da fístula vesicovaginal pós-histerectomia, estudos recentes demonstram que fístulas identificadas no pós-operatório recente (primeiras 48 horas) podem ser reparadas com segurança.
- D) A histerectomia abdominal é o fator etiológico mais comum em fístulas vesicovaginais, tanto nos países pobres quanto nos desenvolvidos.

Questão 24

Assinale a alternativa que **NÃO** está relacionada ao parto vaginal.

- A) Incontinência urinária por esforço
- B) Incontinência fecal
- C) Cistite intersticial
- D) Denervação parcial do assoalho pélvico

Questão 25

Entre as seguintes modalidades terapêuticas utilizadas para o tratamento do condiloma acuminado, têm **maior chance** de eliminar a presença do vírus no paciente:

- I. cauterização química com podofilina ou ácido tricloroacético
- II. cauterização com eletrocautério ou criocautério
- III. imunoterapia com imiquimode

Completa(m) **corretamente** o enunciado acima

- A) apenas o item I.
- B) apenas os itens I e III.
- C) apenas os itens II e III.
- D) nenhum dos três itens.

Questão 26

Assinale a classificação de Bosniak de cisto renal com as seguintes características:

- septos ou paredes minimamente espessados, porém regulares
- calcificações espessas ou nodulares
- cistos hiperdensos intrarrenais ≥ 3 cm

- A) Bosniak II
- B) Bosniak IIF
- C) Bosniak III
- D) Bosniak IV

Questão 27

NÃO representam manifestações paraneoplásicas do carcinoma renal:

- A) hipertensão, anemia e perda de peso, miopatia.
- B) febre, neuropatia e amiloidose, disfunção hepática.
- C) hipercalemia, caquexia, eritrocitemia e hemossedimentação elevada.
- D) insuficiência pancreática, hipotireoidismo e hipopotassemia.

Questão 28

Paciente de 54 anos, sexo feminino, apresenta nódulo hipercaptante de 3,5 cm no terço inferior do rim direito.

Nesse caso, a modalidade de tratamento com o **PIOR** resultado oncológico seria

- A) nefrectomia radical aberta.
- B) nefrectomia parcial aberta.
- C) nefrectomia parcial laparoscópica.
- D) ablação com radiofrequência.

Questão 29

A operação denominada *Índiana Pouch* é uma derivação

- A) ortotópica e incontinente.
- B) interna e permanente.
- C) heterotópica e continente.
- D) externa e incontinente.

Questão 30

As metástases nos tumores germinativos de testículo ocorrem preferencialmente em

- A) linfonodos inguinais profundos.
- B) linfonodos retroperitoniais.
- C) linfonodos inguinais superficiais.
- D) mediastino.

Questão 31

Assinale o tumor germinativo de testículo para o qual a radioterapia pode estar indicada após a orquiectomia radical.

- A) Seminoma
- B) Tumor de células de Sertoli
- C) Teratoma
- D) Coriocarcinoma

Questão 32

Com relação às complicações da ureteroscopia é **INCORRETO** afirmar que

- A) a perfuração ureteral pode ocorrer devido à hiperdistensão do sistema coletor causada pelo líquido de irrigação.
- B) a avulsão ureteral ocorre mais frequentemente durante extração de um cálculo grande com basket, sem prévia fragmentação.
- C) a avulsão ureteral geralmente ocorre no terço distal do ureter.
- D) a perfuração do ureter é mais comum que a estenose ureteral.

Questão 33

Sobre o mecanismo causador da dor durante obstrução ureteral por litíase, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Obstrução do fluxo urinário e conseqüente distensão da capsula renal.
- B) Lesão da mucosa ureteral pelo cálculo.
- C) Peristaltismo ureteral excessivo devido a obstrução.
- D) Extravasamento de urina pelo cálice renal.

Questão 34

Assinale a causa **mais comum** de hematúria macroscópica em pacientes com idade acima de 50 anos.

- A) Litíase renal
- B) Infecção do trato urinário
- C) Câncer de bexiga
- D) Trauma

Questão 35

Assinale a alternativa que **NÃO** representa causa de anejaculação.

- A) Agentes farmacológicos
- B) Cirurgia prostática
- C) Deficiência androgênica
- D) Acidente vascular cerebral

Questão 36

Assinale a patologia primariamente associada com o priapismo.

- A) Doença de Peyronie
- B) Anemia Falciforme
- C) Leucemia
- D) Doença de Parkinson

Questão 37

Com relação ao câncer renal (CCR), assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O rastreamento populacional para detecção precoce do CCR é justificável, pelo crescente aumento na prevalência desses tumores.
- B) A radiografia simples de tórax é usada de rotina no estadiamento do CCR.
- C) Cintilografia óssea é indicada nos casos de tumores localmente avançados, presença de dor óssea, hipercalcemia ou elevação de fosfatase alcalina.
- D) O diagnóstico por imagem de acometimento linfonodal em pacientes com CCR baseia-se na identificação de linfonodos maiores que 1 cm no seu menor diâmetro.

Questão 38

Com relação aos fatores prognósticos do câncer renal (CCR), assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O prognóstico do CCR depende do tamanho do tumor primário, sendo que aqueles menores de 4,5 a 5,5 cm apresentam a maior sobrevida livre da doença.
- B) Comparado com tumores restritos ao rim, aqueles com invasão da gordura perirrenal associam-se a diminuição de sobrevida câncerespecífica em cinco anos de 15 a 20 pontos percentuais.
- C) Aproximadamente 50% dos pacientes com acometimento de suprarenal ipsilateral apresentam evidências de doença sistêmica à época desse diagnóstico.
- D) Pacientes com trombo tumoral na veia cava sem acometimento linfonodal, cujo trombo é cirurgicamente extraído, apresentam sobrevida semelhante àquela encontrada nos pacientes com tumores que somente comprometem a gordura perirrenal.

Questão 39

Representa complicação da biopsia prostática pró-via transretal:

- I. sepse urinária
- II. episódios vasovagais
- III. sangramento retal

Completa(m) **corretamente** o enunciado acima

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas os itens I e III.
- D) todos os três itens.

Questão 40

Em homens idosos com hiperplasia prostática, a ocorrência de trabeculações vesicais está associada à

- A) hiperplasia da musculatura lisa vesical.
- B) hipertrofia da musculatura lisa vesical.
- C) evidência de bexiga neurogênica associada.
- D) deposição de colágeno no detrusor.

Questão 41

Em relação ao local de origem da hiperplasia prostática benigna, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Zonas de transição e periférica
- B) Zona de transição
- C) Zona periférica
- D) Glândulas periuretrais

Questão 42

Paciente de 65 anos, com história de jato urinário fino, sensação de esvaziamento vesical incompleto e episódios frequentes de infecção urinária. Foi realizado urofluxometria que mostrou fluxo urinário máximo de 6 ml/seg.

Esse resultado sugere:

- I. obstrução pós-vesical.
- II. deficiência detrusora.
- III. obstrução pós-vesical ou deficiência detrusora.

Completa(m) **corretamente** o enunciado acima

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item III.
- C) apenas os itens II e III.
- D) todos os três itens.

Questão 43

Assinale a alternativa que apresenta a medicação utilizada no tratamento da hiperplasia prostática que está associada à maior incidência de ejaculação retrógrada.

- A) Tamsulosina
- B) Doxazosina
- C) Finasterida
- D) Dutasterida

Questão 44

Assinale a alternativa que apresenta indicação absoluta de tratamento cirúrgico em pacientes com hiperplasia prostática benigna.

- A) Volume urinário residual > 300 ml
- B) Pressão detrusora no fluxo máximo > 100 cm H₂O
- C) Impossibilidade de terapia medicamentosa devido a intolerância
- D) Infecções urinárias recorrentes

Questão 45

Sobre o câncer de bexiga é **CORRETO** afirmar que

- A) cerca de 30% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados inicialmente como doença superficial.
- B) sintomas irritativos do trato urinário inferior, quando presentes, estão associados a *carcinoma in situ* ou tumores invasivos.
- C) o carcinoma de células escamosas é responsável por menos de 2% dos casos de câncer de bexiga e está associado à irritação crônica, como em extrofia vesical, podendo também se originar no úraco.
- D) o transplantado renal tem a mesma chance de desenvolver câncer vesical que a população normal.

Questão 46

Sobre o câncer de bexiga, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a possibilidade de se encontrar tumor transicional concomitante no trato urinário superior em casos de câncer de bexiga, situa-se em torno de 11 a 14%.
- B) que uma segunda RTU deve ser realizada em casos de câncer de bexiga estágio T1, com alto grau histológico.
- C) que a taxa de sobrevida livre de doença em 10 anos para pacientes com tumor T1 de alto grau submetidos à cistectomia radical, pode chegar a mais de 90%.
- D) que, no diagnóstico, a citologia urinária apresenta a especificidade elevada, em torno de 94%.

Questão 47

Com relação ao câncer de bexiga invasor, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Confirmada a invasão muscular após a ressecção transuretral, a cistectomia deve ser realizada o mais breve possível.
- B) A cistectomia com preservação da próstata (cápsula) e vesículas seminais tem sido proposta, recentemente, como alternativa de tratamento
- C) A cistectomia parcial pode ser uma alternativa de tratamento, quando biópsias randomizadas sugerirem acometimento focal.
- D) Nos casos em que há acometimento da uretra prostática, está indicada uretrectomia total e derivação externa.

Questão 48

Com relação ao câncer de pênis, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O exame físico apresenta elevado valor preditivo positivo, sensibilidade e especificidade, sendo o principal método para avaliação da extensão local.
- B) A ausência de acometimento linfonodal detectável à palpação praticamente afasta a possibilidade de acometimento metastático.
- C) Aproximadamente 20% dos linfonodos palpáveis não apresentam comprometimento neoplásico.
- D) Em casos de linfonodos palpáveis, a biopsia do linfonodo sentinela de *Cabanas* deve ser realizada de rotina.

Questão 49

Em relação às afirmações referentes ao tratamento cirúrgico do câncer de pênis, analise as seguintes afirmativas.

- I. Em pacientes que não querem realizar a cirurgia padrão, a radioterapia é uma alternativa.
- II. Durante a ressecção peniana, recomendam margens negativas de 1 cm para tumores graus I e II e de 1,5 cm para tumores grau III.
- III. Em pacientes com tumores de alto grau, está indicada a realização da linfadenectomia inguinal bilateral.
- IV. Pacientes com carcinoma verrucoso não necessitam de linfadenectomia.

A análise nos permite concluir que

- A) somente a afirmativa III está correta.
- B) somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- C) somente a afirmativa I está incorreta.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 50

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **INCORRETA**.

- A) O valor preditivo positivo do PSA na detecção do câncer de próstata é estimado em 30% a 42% em homens com PSA entre 4,1 ng/ml e 10 ng/ml.
- B) O emprego isolado do PSA na detecção do câncer de próstata tem sensibilidade maior do que o toque retal e a ultrassonografia transretal.
- C) A análise de variações do PSA, como densidade, velocidade e ajuste à idade, mostrou considerável vantagem na detecção do câncer da próstata, quando comparados ao valor limite do PSA de 4 ng/ml isolado.
- D) A indicação atual para rastreamento do câncer da próstata é controversa.

Questão 51

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **INCORRETA**.

- A) O bloqueio androgênico é o tratamento padrão para o câncer de próstata metastático.
- B) Não há evidências de diferenças em eficácia entre os agonistas LHRH (goserelina, buserelina e leuprolide) no tratamento do câncer de próstata metastático.
- C) Em 15% a 30% dos pacientes com câncer de próstata em progressão bioquímica, a suspensão do antiandrógeno está associada a uma boa resposta clínica.
- D) O bloqueio androgênico máximo está associado a melhor resposta terapêutica que a monoterapia.

Questão 52

A ocorrência de litíase urinária composta por INDINAVIR está associada ao tratamento de:

- A) glomerulonefrite por IgA.
- B) infecção pelo HIV.
- C) leucemia mieloide crônica.
- D) doença de Crohn.

Questão 53

Indica-se, após o primeiro episódio de infecção urinária em uma criança de dois anos de idade,

- A) DMSA.
- B) leucograma e teste de nitrato.
- C) terapia com antibióticos por sete dias.
- D) profilaxia antibiótica até a realização de estudos de imagem.

Questão 54

Assinale a anormalidade mais comumente encontrada em estudo urodinâmico de pacientes com refluxo vesico – ureteral.

- A) Complacência vesical aumentada
- B) Fluxo urinário diminuído
- C) Hiperatividade detrusora
- D) Elevada pressão de enchimento

Questão 55

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **INCORRETA**.

- A) Durante o primeiro ano de vida a ITU ocorre com maior frequência nos meninos, sendo que os não-circuncidados apresentam de 5 a 20 vezes mais probabilidade de adquirir infecção urinária, quando comparados com os circuncidados.
- B) Ocorre resolução espontânea em aproximadamente 50% dos refluxos vesico - ureteral de grau III.
- C) A enurese noturna é mais frequente em meninas do que em meninos.
- D) A enurese é chamada de polissintomática e está associada a sintomas diurnos, micções infrequentes, polaciúria, urgência, incontinência de urgência e jato miccional fraco.

Questão 56

Faz parte de medidas importantes em pacientes portadores de litíase urinária, **EXCETO**

- A) aumento da ingestão hídrica e diminuição da ingestão de proteínas.
- B) a ingestão de 800 a 1200 mg de cálcio ao dia, na forma de alimentos.
- C) aumento da ingestão de fibras.
- D) restrição da ingestão de sódio e aumento da ingestão de potássio.

Questão 57

Com relação à ocorrência de litíase urinária durante a gravidez, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A urolitíase é a causa mais comum de dor e de admissão hospitalar não obstétrica durante a gravidez.
- B) A ressonância magnética não deve ser usada em casos em que o ultrassom não esclarecer o diagnóstico de litíase, devido a emissão de ondas magnéticas.
- C) O uso de urografia venosa limitada apresenta riscos para o feto, mesmo após a 22ª semana de gestação e não deve ser utilizada.
- D) A ultrassonografia apresenta elevada acurácia na detecção de litíase ureteral na gravidez, devido a dilatação ureteral importante comumente encontrada.

Questão 58

Analise as seguintes afirmativas sobre as infecções do trato urinário e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Os germes causadores mais comuns são as enterobactérias, principalmente a *Escherichia coli*.
- () O achado de bacteriúria assintomática em idosos é muito frequente e, em geral, não tem significado clínico importante.
- () Devido à baixa imunidade, pacientes idosos com bacteriúria assintomática, geralmente necessitam de tratamento com antibióticos.
- () Atualmente, clones de *E. coli*, responsáveis por aproximadamente 50% das infecções, são resistentes às associações trimetoprim-sulfametoxazol.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (F)

Questão 59

Em relação às infecções do trato urinário, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O espectro de agentes etiológicos é semelhante tanto nas infecções do trato urinário baixo como nas do trato urinário alto, quando agudas, não complicadas e de origem comunitária.
- B) Em infecções de origem hospitalar, os germes mais frequentes são: *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter sp*, enterococos e *stafilococos*.
- C) No sexo masculino, taxas de ITU são bem menores nos indivíduos circuncidados.
- D) É rara a ocorrência de cistite prévia em pacientes com quadro de pielonefrite aguda.

Questão 60

A urografia excretora (EU) frequente é utilizada na avaliação de pacientes com suspeita de acometimento do sistema genitourinário pela tuberculose.

NÃO representa um achado típico dessa patologia na EU:

- A) estenose infundibular.
- B) refluxo vesico-ureteral.
- C) estenose ureteral.
- D) calcificações renais.

Questão 61

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando os cálculos urinários às respectivas propriedades físico-químicas.

COLUNA I		COLUNA II
1. Cálculo radiopaco	()	cristalização
2. Cálculo de ácido úrico	()	infecção urinária
3. Estruvita	()	citrato e magnésio
4. Supersaturação	()	urina ácida
5. Inibidores da cristalização	()	oxalato de cálcio

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (5) (2) (1)
- B) (4) (5) (3) (2) (1)
- C) (5) (2) (1) (3) (4)
- D) (2) (4) (1) (3) (4)

Questão 62

Na avaliação de paciente com quadro de incontinência urinária aos esforços, assinale o instrumento **mais importante** para o diagnóstico.

- A) Diário miccional
- B) Estudo urodinâmico
- C) Teste do absorvente
- D) Cistoscopia

Questão 63

Com relação aos distúrbios miccionais de origem neurogênica, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) As manifestações do diabetes no trato urinário inferior são de aumento da sensibilidade vesical.
- B) As lesões suprapontinas desencadeiam, caracteristicamente, hiperatividade detrusora.
- C) Na esclerose múltipla, as lesões medulares são as principais responsáveis pelos sintomas miccionais.
- D) Geralmente, há dificuldade de esvaziamento vesical nas fases iniciais da mielite transversa.

Questão 64

Com relação aos distúrbios miccionais de origem neurogênica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O cateterismo intermitente é a primeira opção de tratamento nos pacientes com disfunção de armazenamento.
- B) O cateterismo de demora pode ser um método seguro para esvaziar a bexiga e evitar incontinência urinária na fase aguda de uma doença neurológica.
- C) Antibioticoprofilaxia é recomendada enquanto houver a necessidade de cateterismo vesical.
- D) O uso de coletores urinários a longo prazo pode causar bacteriúria, mas não aumenta o índice de infecção do trato urinário, comparado a outros métodos.

Questão 65

Assinale o neurotransmissor **mais importante** na fisiologia da ereção peniana.

- A) Óxido Nítrico
- B) Prostaglandina E2
- C) Acetilcolina
- D) Neuropeptídeo P

Questão 66

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em um quadro de escroto agudo, até que se prove o contrário, deve ser considerado como torção do cordão espermático.
- B) A presença do reflexo cremastérico exclui a hipótese de torção do testículo.
- C) A maioria dos casos de torção de testículo é do tipo extravaginal.
- D) Idealmente os casos de torção de testículo devem ser tratados durante as seis primeiras horas de evolução.

Questão 67

Paciente de 35 anos apresentando quadro de epididimite aguda.

Nesse caso, o agente causador **mais provável** é

- A) *N. gonorrhoeae*.
- B) *C. trachomatis*.
- C) *Escherichia coli*.
- D) *Staphylococcus saprophyticus*.

Questão 68

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O rim é lesado em aproximadamente 10% dos traumatismos abdominais.
- B) A instabilidade hemodinâmica e/ou sangramento persistente são indicações absolutas de exploração cirúrgica após trauma renal.
- C) Na suspeita de lesão uretral, a melhor conduta é o cateterismo uretral, que permite uma melhor avaliação da extensão do trauma pelos métodos de imagem.
- D) As principais complicações a longo prazo do trauma uretral são a estenose e a disfunção erétil.

Questão 69

Paciente com quadro de estenose de uretra após RTU de próstata foi submetido a dilatação uretral. A medida do último dilatador foi 36 *French*.

Assinale o diâmetro, em milímetros, desse dilatador.

- A) 9.
- B) 12.
- C) 7,2.
- D) 18.

Questão 70

Em relação ao *estudo urodinâmico*, analise as seguintes afirmativas.

- I. Durante o *Estudo fluxo/pressão* é realizada medida simultânea da pressão vesical durante a micção, associada com a fluxometria.
- II. *Capacidade cistométrica máxima* refere-se ao volume no qual os pacientes sentem que não podem mais retardar a micção.
- III. A demonstração de fluxo urinário baixo durante *estudo fluxo/pressão* indica quadro de obstrução infravesical.
- IV. *Pressão de perda do detrusor* é definida como a menor pressão do detrusor na qual ocorre perda de urina na ausência tanto de contração do detrusor quanto de aumento da pressão abdominal.

A análise permite concluir que

- A) todas as alternativas estão corretas.
- B) apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
- C) apenas as alternativas II e III estão corretas.
- D) apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	65	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	66	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	67	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	69	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	52	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	54	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	58	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.