

# SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS

Edital n. 01/2009

# **OFTALMOLOGIA**

Código 132

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.

### Ao receber a Folha de Respostas:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

01	A	В	c	D	<ul> <li>Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:</li> <li>use apenas caneta esferográfica azul ou preta;</li> <li>preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;</li> </ul>
02					<ul> <li>assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma</li> </ul>
03					alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
04					NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.  A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.  CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas.** 

**ATENÇÃO:** Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, "Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]." (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

# **DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS**



# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 (quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e 4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe *imediatamente* ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, *não lhe* caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.

# > Conhecimentos Gerais

### CIRURGIA GERAL

### Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

### Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa *INCORRETA*.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

### Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa *INCORRETA*.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa *INCORRETA*.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

# **CLÍNICA MÉDICA**

### Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

### Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonary, é *INCORRETO* afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

### Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

### **COLUNA I**

- 1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
- 2. Bloqueadores do canal de cálcio
- 3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
- 4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

### **COLUNA II**

- Agravamento de insuficiência arterial periférica
- ( ) Edema
- ( ) Menor efeito em negros
- ( ) Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

# GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

### Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o

- A) 3°.
- B) 14°.
- C) 20°.
- D) 26°.

### Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptação de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve.** 

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

### Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

(	)	O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de
		contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de
		10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.

( )	O segundo período começa com	a dilatação do colo completa	(10 cm) e se encerra
	com a expulsão total do feto.		

4	,	•		, ,			. ~		
ı		1 (	) tarcaira	narinda	com	preende a	AVNIIICAN	വാ	niacanta
۱		,		periodo	COIL	procriae a	CAPUISAU	ua	piacerita

(	( )	O quarto	período	compreende	а	fase	de	observação	е	visa	identificar	qualquer
		anormalidade.										

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

### > PEDIATRIA

### Questão 13

Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

### Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

### Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

### Questão 16

Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

# SAÚDE PÚBLICA

### Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I			COLUNA II
1. Ecológico	(	)	Odds Ratio
2. Caso-Controle	(	)	Risco Relativo
3. Seccional	(	)	Razão de Médias
4. Coorte	(	)	Razão de Prevalência
Assinale a alternativa que apresenta A) (2) (4) (1) (3)	a sed	quêr	ncia de números <i>CORRETA</i> .
B) (4) (2) (3) (1)			

### Questão 18

C) (3) (4) (2) (1)

D) (3) (1) (2) (4)

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
- B) caso-controle.
- C) coorte histórica.
- D) ecológico.

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

### Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

# > Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Na fossa patelar, o corpo vítreo está separado do cristalino pelo espaço de

- A) Berger.
- B) Erggelet.
- C) Hannover.
- D) Petit.

### Questão 22

Entre as duas raízes da asa menor do osso esfenoide situa-se

- A) a fissura orbitária inferior.
- B) a fissura orbitária superior.
- C) o canal óptico.
- D) o forame etmoidal posterior.

### Questão 23

A circunferência média, em milímetros, de um olho adulto normal é de

- A) 25.
- B) 35.
- C) 55.
- D) 75.

### Questão 24

O tubérculo lacrimal é um acidente ósseo localizado

- A) na fossa da glândula lacrimal.
- B) na fossa do saco lacrimal.
- C) no osso maxilar.
- D) no osso zigomático.

A linha imaginária circunferencial equidistante dos polos oculares anterior e posterior é o

- A) equador anatômico.
- B) equador geométrico.
- C) meridiano anatômico.
- D) meridiano geométrico.

### Questão 26

Os nervos, abaixo listados, atravessam o ânulo tendíneo comum, EXCETO

- A) o nervo abducente.
- B) o nervo frontal.
- C) o nervo nasociliar.
- D) o nervo oculomotor.

### Questão 27

A esclera é mais espessa na região:

- A) abaixo dos tendões dos músculos retos.
- B) do equador.
- C) do limbo.
- D) do polo posterior.

### Questão 28

As seguintes camadas histológicas fazem parte da retina, EXCETO

- A) camada de células ganglionares.
- B) membrana de Bruch.
- C) membrana limitante externa.
- D) membrana limitante interna.

A glândula lacrimal **principal** é classificada como

- A) sebácea tubulosa simples.
- B) sebácea acinosa composta.
- C) serosa tubuloacinosa composta.
- D) serosa tubulosa ramificada simples.

### Questão 30

A membrana de Descemet é a

- A) lâmina própria do estroma da córnea.
- B) lâmina própria das células epiteliais da córnea.
- C) membrana basal das células endoteliais da córnea.
- D) membrana basal das células epiteliais da córnea.

### Questão 31

O epitélio subcapsular de um cristalino adulto está presente nas seguintes regiões, **EXCETO** 

- A) anterior central.
- B) anterior intermediária.
- C) equatorial.
- D) posterior central.

### Questão 32

As vesículas ópticas se originam dos divertículos laterais do

- A) diencéfalo.
- B) mesencéfalo.
- C) metencéfalo.
- D) telencéfalo.

A catarata polar posterior espúria corresponde ao

- A) anel de Vossius.
- B) anel menor de Merkel.
- C) cristaloide de Kolmer.
- D) ponto de Mittendorf.

### Questão 34

As pálpebras mostram-se completamente separadas no

- A) 5º mês gestacional.
- B) 6º mês gestacional.
- C) 7º mês gestacional.
- D) 8º mês gestacional.

### Questão 35

Morfologicamente, o início da formação do cristalino - placoide ou placa lenticular - ocorre a partir de

- A) duas semanas de gestação.
- B) cinco semanas de gestação.
- C) oito semanas de gestação.
- D) dez semanas de gestação.

### Questão 36

O reflexo lacrimal possui como via aferente o nervo

- A) facial.
- B) maxilar.
- C) oftálmico.
- D) vestibulococlear.

Em um olho adulto normal, a produção aproximada de humor aquoso é de

- A) 0,5 -1,0 μl/min.
- B) 1,5 4,5 µl/min.
- C) 5,0 9,5 µl/min.
- D) 12,0 14,5 μl/min.

### Questão 38

Entre as discromatropias abaixo relacionadas, a mais frequente é a

- A) deuteranomalia.
- B) protanomalia.
- C) protanopia.
- D) tritanopia.

### Questão 39

Na síndrome de Horner, o teste farmacológico mais adequado para se identificar uma lesão pós-ganglionar é o que utiliza

- A) atropina.
- B) cocaína.
- C) hidroxianfetamina.
- D) pilocarpina.

### Questão 40

A catarata relacionada à corticoterapia é inicialmente

- A) capsular anterior.
- B) cortical anterior.
- C) nuclear.
- D) subcapsular posterior.

A linha que une o ponto de fixação, o ponto nodal e a fóvea é o eixo

- A) geométrico.
- B) óptico.
- C) pupilar.
- D) visual.

### Questão 42

Um olho com acuidade visual de 20/40 (Snellen) possui a seguinte percentagem de eficiência visual central

- A) 30%.
- B) 45%.
- C) 60%.
- D) 85%.

### Questão 43

Um paciente hígido, de 24 anos de idade, apresenta, em média, uma amplitude de acomodação de

- A) 6 dioptrias.
- B) 10 dioptrias.
- C) 16 dioptrias.
- D) 18 dioptrias.

### Questão 44

Em um olho adulto normal, o poder óptico do cristalino, em estado não-acomodado, é de aproximadamente

- A) 9 dioptrias.
- B) 12 dioptrias.
- C) 19 dioptrias.
- D) 27 dioptrias.

A transposição correta da prescrição -2,00 +5,25 X 180º é

- A) +2,00 -5,25 X 90°.
- B) +2,00 -5,25 X 180°.
- C) +3,25 -5,25 X 90°.
- D) +3,25 +3,25 X 180°.

### Questão 46

As muscae volitantes fazem parte, por definição conceitual, do quadro de

- A) sinérese.
- B) sínquise.
- C) vitreodonese.
- D) vitreosquise.

### Questão 47

A sinonímia de synchisis scintillans é

- A) cholesterosis bulbi.
- B) hemossiderose ocular.
- C) hialose asteroide.
- D) phthisis bulbi.

### Questão 48

Do ponto de vista etimológico, carúncula significa o diminutivo de

- A) carne.
- B) flor.
- C) larva.
- D) semente.

As ações de elevação, abdução e extorção são realizadas pelo músculo

- A) oblíquo inferior.
- B) oblíquo superior.
- C) reto inferior.
- D) reto superior.

### Questão 50

Ao depósito localizado de ferro, presente no epitélio corneano em associação com o pterígeo, dá-se o nome de

- A) anel de Fleischer.
- B) linha de Hudson-Stähli.
- C) linha de Stocker.
- D) verruga de Hassall-Henle.

### Questão 51

O comprometimento da metade inferior da radiação óptica direita resulta em

- A) hemianopsia heterônima binasal.
- B) hemianopsia heterônima bitemporal.
- C) quadrantanopsia heterônima superior direita.
- D) quadrantanopsia homônima superior esquerda.

### Questão 52

A paralisia do nervo troclear direito afeta o músculo

- A) oblíquo inferior direito.
- B) oblíquo inferior esquerdo.
- C) oblíquo superior direito.
- D) oblíquo superior esquerdo.

Entre as seguintes técnicas de imagem, a que melhor possibilita o estudo do buraco macular em olhos com meios transparentes é

- A) biomicroscopia ultrassônica.
- B) interferometria com luz branca coerente.
- C) tomografia de coerência óptica.
- D) ultrassonografia de 20 MHz.

### Questão 54

Na ultrassonografia ocular, o "sinal em T" é caracteristicamente encontrado

- A) no descolamento total de retina.
- B) na esclerite posterior.
- C) na hemorragia sub-hialóidea.
- D) no melanoma uveal difuso.

### Questão 55

Drusas do nervo óptico têm como sinonímia

- A) corpos amiloides.
- B) corpos citoides.
- C) corpos coloides.
- D) corpos psamomatosos.

### Questão 56

No quadro de vítreo primário hiperplásico persistente é menos comum o achado de

- A) artéria hialóidea persistente.
- B) buftalmia.
- C) leucocoria.
- D) processos ciliares alongados.

A negação da cegueira, em um paciente reconhecidamente cego, é conhecida como

- A) fenômeno de Riddoch.
- B) fenômeno de Uhthoff.
- C) síndrome de Anton.
- D) síndrome de Gradenigo.

### Questão 58

Entre as doenças que promovem leucocoria, a que possui predileção pelo sexo masculino é

- A) Doença de Coats.
- B) Retinoblastoma.
- C) Retinopatia da prematuridade.
- D) Vítreo primário hiperplásico persistente.

### Questão 59

A retinopatia serosa central cursa com

- A) hipermetropia, macropsia, discromatopsia.
- B) hipermetropia, micropsia, metamorfopsia.
- C) miopia, macropsia, hemeralopia.
- D) miopia, micropsia, discromatopsia.

### Questão 60

Indiferentemente à faixa etária, o tumor primário do nervo óptico mais frequente é o

- A) astrocitoma pilocítico juvenil.
- B) meduloepitelioma.
- C) meningioma.
- D) neurilemoma.

O sítio primário mais comum do neuroblastoma metastático orbitário é

- A) a adrenal.
- B) a hipófise.
- C) a pineal.
- D) o timo.

### Questão 62

Em relação à retinosquise degenerativa (senil) típica, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A fenda ocorre usualmente na camada plexiforme externa.
- B) Ela é particularmente prevalente nos míopes.
- C) Na grande maioria dos casos a condição é inócua.
- D) Nos estágios iniciais, ela interessa à periferia distante temporal inferior.

### Questão 63

São possíveis efeitos colaterais sistêmicos do timolol, EXCETO

- A) alopécia.
- B) bradicardia.
- C) hiperglicemia.
- D) impotência.

### Questão 64

São prováveis efeitos colaterais do latanoprost, **EXCETO** 

- A) aumento da pigmentação da íris.
- B) edema macular cistoide.
- C) hipertricose dos cílios.
- D) poliose dos cílios.

A droga de ação antagonista ß 1 - seletiva é

- A) o betaxolol.
- B) a brimonidina.
- C) o levobunolol.
- D) a brinzolamida.

### Questão 66

Taxonomicamente, o agente etiológico da toxocaríase pertence à mesma família

- A) do Ascaris lumbricoides.
- B) do Schistosoma mansoni.
- C) da Taenia solium.
- D) do Toxoplasma gondii.

### Questão 67

Na doença de Graves, a retração da pálpebra superior é conhecida como sinal de:

- A) Dalrymple.
- B) Gifford.
- C) Rosenbach.
- D) von Graefe.

### Questão 68

Opacidades lenticulares subcapsulares bilaterais, promovendo um aspecto em tapete de poeira policromática, principalmente vermelha e verde, podem ser identificadas na

- A) distrofia miotônica.
- B) rubéola.
- C) síndrome de Down.
- D) toxoplasmose.

Calcose lenticular ocorre na

- A) dermatite atópica.
- B) doença de Wilson.
- C) galactosemia.
- D) retinite pigmentosa.

### Questão 70

O que caracteriza a forma proliferativa da retinopatia diabética é o achado de

- A) exsudatos algodonosos.
- B) exsudatos lipofílicos.
- C) microaneurismas.
- D) neovasos.

### **FOLHA DE RESPOSTAS**

# (RASCUNHO)

01 A B C D	21 A B C D	41 A B C D	61 A B C D
02 A B C D	22 A B C D	42 A B C D	62 A B C D
03 A B C D	23 A B C D	43 A B C D	63 A B C D
04 B C D	24 B C D	44 A B C D	64 A B C D
05 A B C D	25 A B C D	45 A B C D	65 A B C D
06 A B C D	26 A B C D	46 A B C D	66 A B C D
07 A B C D	27 A B C D	47 A B C D	67 A B C D
08 A B C D	28 A B C D	48 A B C D	68 A B C D
09 A B C D	29 A B C D	49 A B C D	69 A B C D
10 A B C D	30 A B C D	50 A B C D	70 A B C D
11 A B C D	31 A B C D	51 A B C D	
12 A B C D	32 A B C D	52 A B C D	
13 A B C D	33 A B C D	53 A B C D	
14 A B C D	34 A B C D	54 A B C D	
15 A B C D	35 A B C D	55 A B C D	
16 A B C D	36 A B C D	56 A B C D	
17 A B C D	37 A B C D	57 A B C D	
18 A B C D	38 A B C D	58 A B C D	
19 A B C D	39 A B C D	59 A B C D	
20 A B C D	40 A B C D	60 A B C D	

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

# **ATENÇÃO:** AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.