



SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009
OTORRINOLARINGOLOGIA
Código 134

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

➤ Conhecimentos Gerais

CIRURGIA GERAL

Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

CLÍNICA MÉDICA

Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

COLUNA II

- () Agravamento de insuficiência arterial periférica
- () Edema
- () Menor efeito em negros
- () Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptção de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- () O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- () O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- () O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

➤ PEDIATRIA

Questão 13

Em crianças, a téttrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

SAÚDE PÚBLICA

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

COLUNA II

- () Odds Ratio
() Risco Relativo
() Razão de Médias
() Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.

Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

➤ **Conhecimentos Específicos**

Questão 21

Em relação ao implante coclear, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) O implante coclear em menores de 01 ano é dificultado pela menor dimensão da cavidade timpânica e suas estruturas.
- B) Em pacientes com perdas auditivas progressivas não há limite para o implante em relação ao tempo de surdez.
- C) Em pacientes com perda auditiva súbita o tempo de perda não deve ultrapassar o número de anos sem deficiência auditiva.
- D) O implante é indicado para adultos com perda auditiva pós-lingual com limiares auditivos com AASI pior que 90dBNa e percepção da fala inferior a 30%.

Questão 22

Sobre as infecções do espaço profundo do pescoço, as seguintes afirmativas estão corretas, **EXCETO**

- A) os germes mais comuns são estreptococos alfa hemolíticos, estafilococos, bacteroides e peptoestreptococos.
- B) infecções do espaço parafaríngeo pós-estiloide cursam com trismo tardio e potenciais complicações de vasos e nervos.
- C) a maior parte das infecções do espaço submandibular tem origem nas glândulas mandibulares e o restante tem foco odontogênico ou de linfonodos.
- D) infecções do espaço retrofaríngeo tem maior incidência na população pediátrica.

Questão 23

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **CORRETA**.

- A) Na tireoide ectópica, o tecido tireoidiano é não funcional, permitindo sua remoção cirúrgica.
- B) Anomalias do segundo arco branquial são as mais comuns e são comumente visíveis ao nascimento.
- C) Cerca de 50% das massas cervicais em crianças têm como causa alterações do desenvolvimento embrionário.
- D) Os hemangiomas, tumores de cabeça e pescoço, mais comuns na infância, predominam no sexo feminino.

Questão 24

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os principais agentes da rinossinusite fúngica invasiva são aspergillus e zigomicetos.
- B) A bola fúngica caracteriza-se pela ausência de invasão tecidual e os seios mais acometidos são o maxilar e frontal.
- C) Pacientes com rinossinusite fúngica alérgica apresentam teste de hipersensibilidade tipo I positivos. O muco é eosinofílico e contém cristais de Charcot Leyden.
- D) Papilomas invertidos são tumores raros da cavidade nasal.

Questão 25

Paciente portador de polipose nasossinusal extensa foi submetido à cirurgia endoscópica nasossinusal. Após a cirurgia, foi detectada amaurose à esquerda.

Assinale em qual momento da cirurgia, **provavelmente**, ocorreu lesão do nervo óptico.

- A) Na abordagem da parede lateral do seio esfenoidal
- B) Durante a remoção da lamela basal
- C) Na abordagem das células esfenoidais
- D) Durante abordagem da lâmina papirácea

Questão 26

Paciente evoluindo no pós-operatório de cirurgia endoscópica nasossinusal com hematoma e edema periorbitário e diminuição da capacidade visual.

Nesse caso, a conduta **mais apropriada** e o tempo **máximo** de abordagem são, respectivamente,

- A) descompressão da órbita via endoscópica de urgência; 120 minutos.
- B) descompressão da órbita via endoscópica de urgência; 90 minutos.
- C) cantotomia medial; 120 minutos.
- D) cantotomia lateral; 90 minutos.

Questão 27

Sobre as lesões de mucosa oral, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O penfigoide cicatricial raramente envolve a pele. Tem como diagnóstico diferencial o pênfigo vulgar, porém com bolhas mais resistentes.
- B) A histologia do pênfigo vulgar mostra células de Tzanck, além de bolhas separando a camada espinhosa da lâmina basal.
- C) As lesões orais do eritema multiforme acometem preferencialmente o lábio. Lesões de pele (forma de alvo) acometem principalmente regiões extensoras dos membros.
- D) A maior parte dos pacientes com pênfigo vulgar apresenta apenas lesão oral inicialmente. As lesões de pele podem surgir até um ano depois.

Questão 28

Analise as seguintes afirmativas.

- I. A granulomatose de Wegner acomete principalmente homens. A apresentação otorrinolaringológica mais comum é a sinusite crônica com rinorreia sanguinolenta.
- II. O nariz é o local mais acometido no escleroma. Células de Mikulicz podem estar presentes na biópsia. O TTO se faz com antifúngico por tempo prolongado.
- III. A Leishmaniose pode causar necrose nasal anterior e perfuração septal. O controle de cura se faz pelo Teste de Montenegro.
- IV. Na cabeça e pescoço, a sarcoidose manifesta-se como adenopatia cervical, mucosa nasal com nódulos amarelados e acometimento subglótico.

A partir dessa análise, pode-se concluir que apenas

- A) as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) as afirmativas II e III estão corretas.
- D) a afirmativa I está correta.

Questão 29

Em relação às complicações das rinossinisites, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) O acometimento intracraniano na maior parte das vezes se dá pela extensão direta da infecção pela dura *máter*.
- B) A rinossinusite frontal é a que apresenta maior propensão à disseminação para o SNC.
- C) Em crianças menores, o *Haemophilus Influenza tipo B* é o principal agente das infecções orbitárias.
- D) Trombose do seio cavernoso caracteriza-se pelo acometimento do III, IV e VI pares cranianos e é causada principalmente pelo pneumococo.

Questão 30

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na RNM, o colesteatoma se apresenta isoíntenso em T1, e hiperíntenso em T2. Apresenta boa captação de contraste.
- B) Hemorragia de ouvido interno apresenta imagem hiperíntensa em T1 (pré-contraste) e T2. O mesmo padrão é observado no granuloma de colesterol.
- C) No trauma temporal com otoliquorreia, o cenário mais comum é de fratura transversal e lesão do *tegmen timpani*.
- D) Schwannoma do facial é melhor observado na RNM e atinge preferencialmente a região do gânglio geniculado.

Questão 31

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **CORRETA**.

- A) O VEMP analisa de forma objetiva a integridade funcional da mácula utricular e as vias descendentes.
- B) Paciente com acometimento do nervo auditivo apresenta como principal alteração no BERA o aumento do intervalo entre as ondas III e IV.
- C) As emissões otoacústicas transientes utilizam estímulo de banda larga. Sua presença será indicada quando ocorrer um índice de reprodutibilidade maior que 30%.
- D) Paciente com otosclerose, perda condutiva e limiar de 35 dB não apresenta EOA por produto de distorção.

Questão 32

Sobre a otosclerose, as seguintes afirmações estão corretas, **EXCETO**

- A) na ocorrência de *gusher* após perfuração da platina, deve-se interromper a cirurgia e ocluir o orifício. O risco de lesão neurossensorial é alto.
- B) paciente que apresenta perda mista rapidamente progressiva e mancha de Schwartze ao exame, deve ter o procedimento cirúrgico postergado.
- C) o efeito *on-off* é característico da otosclerose e ocorre em fases avançadas da doença.
- D) o tratamento medicamentoso diminui a progressão, estabiliza a perda condutiva e estabiliza ou reverte as alterações neurossensoriais.

Questão 33

Sobre as fraturas do osso temporal, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a laceração da membrana timpânica e pele do CAE geralmente ocorrem nas fraturas longitudinais.
- B) que, nas fraturas com lesão da cápsula óptica e otoliquorreia, adota-se conduta conservadora pelo alto índice de resolução espontânea.
- C) que a disjunção incudo estapediana é a lesão ossicular mais frequente na fratura temporal.
- D) que, na fratura longitudinal, a paralisia facial ocorre em 10 a 15% dos casos e o local mais acometido é o gânglio geniculado.

Questão 34

Analisar as seguintes afirmações e assinalar a alternativa **CORRETA**.

- A) A paralisia facial ocorre em cerca de 70 a 90% dos casos na Síndrome de Melkersson Rosenthal, sendo a característica típica da síndrome.
- B) Na síndrome de Hamsay Hunt, cerca da metade dos pacientes permanecem com seqüela da paralisia facial.
- C) Doença de Lyme cursa frequentemente com paralisia bilateral. O tratamento consiste na descompressão do nervo facial.
- D) A cirurgia de descompressão do nervo facial, em casos de otite média aguda, deve incluir o gânglio geniculado, porção timpânica, mastóidea e abertura da bainha do nervo.

Questão 35

Analise as seguintes afirmativas.

- I. O diagnóstico da laringomalácia pode ser feito com laringoscopia sob sedação em que se observa epiglote em ômega e ligamento ariepiglótico curto.
- II. O tratamento cirúrgico da laringomalácia consiste na secção do ligamento ariepiglótico, sendo necessário em cerca de 50% dos casos.
- III. Os hemangiomas de cabeça e pescoço acometem preferencialmente a subglote.
- IV. Em quase metade dos casos de paralisia vocal congênita, não se descobre a causa. O TTO na maioria dos casos é expectante.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II, III.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

Questão 36

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **CORRETA**.

- A) O *situs inversus* é patognomônico da Dacriose Ciliar Primária (DCP) e ocorre em cerca de 80% dos casos.
- B) O início dos sintomas na DCP se dá após o primeiro ano de vida.
- C) Na S. de Young, observa-se imobilidade dos espermatozoides e consequente infertilidade.
- D) A alteração estrutural mais comum na DCP está nos braços de dineína.

Questão 37

Perda auditiva neurosensorial com início na segunda década de vida e hematuria ocorrem na seguinte doença:

- A) Síndrome de Usher.
- B) Síndrome de van der Hoove.
- C) Síndrome de Alport.
- D) Síndrome de Wandenburg.

Questão 38

Sobre as lesões de mucosa oral, podemos afirmar que

- A) o leucoedema é lesão encontrada na mucosa jugal principalmente de pacientes negros e deve ser acompanhada pelo risco de malignização.
- B) a afta maior (de Sutton) é a mais comum entre os tipos de afta e dura entre 7 e 14 dias.
- C) o carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma epidermoide que apresenta alto grau de malignidade.
- D) o granuloma piogênico tem predileção pela gengiva, é mais comum em mulheres e o tratamento é a excisão cirúrgica.

Questão 39

Sobre os tumores de cabeça e pescoço, é **INCORRETO** afirmar

- A) que os tumores benignos de oro e hipofaringe são extremamente raros, quando comparados aos tumores malignos.
- B) que, na orofaringe, quanto mais posterior mais agressivo é o tumor.
- C) que os tumores de orofaringe são agressivos localmente, porém as metástases cervicais são tardias.
- D) que o tratamento preconizado para pacientes com tumor de hipofaringe T2N0M0 é a ressecção cirúrgica, esvaziamento cervical e radioterapia pós-operatória.

Questão 40

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A mesma origem embriológica torna comum a associação da malformação ossicular e da cápsula ótica.
- B) O primeiro arco branquial dá origem ao martelo, bigorna, músculos da mastigação e ventres anterior e posterior do músculo digástrico.
- C) Na malformação do pavilhão auditivo e atresia de meato acústico externo unilateral, a primeira intervenção cirúrgica visa a correção da atresia meatal.
- D) Estruturas do ouvido médio e amígdalas palatinas surgem respectivamente da 1ª e 2ª bolsa faríngea.

Questão 41

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os nódulos vocais causam fixação da mucosa e áreas de silêncio vibratório.
- B) Na presença de nódulo vocal unilateral, deve-se investigar lesão na prega vocal contra lateral.
- C) O tratamento do pólipso vocal é essencialmente cirúrgico. Fonoterapia apresenta resultados insatisfatórios.
- D) O edema de Reinke é tipicamente bilateral com predomínio no sexo feminino.

Questão 42

As seguintes afirmativas estão corretas, **EXCETO**

- A) no órgão de Corti, as células ciliadas internas estão presentes em um número cerca de 4 vezes maior que as células ciliadas externas e recebem 95% da inervação aferente do gânglio espiral.
- B) a corrente endolinfática que estimula o canal lateral é ampulípeta e nos canais verticais é ampulífuga.
- C) a mácula utricular detecta movimentos no plano horizontal e o sáculo no plano vertical.
- D) a ausência de irrigação colateral torna o labirinto altamente susceptível à isquemia.

Questão 43

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A rinite atrófica é mais comum em mulheres e manifesta-se na primeira infância.
- B) Na rinite idiopática (vasomotora), a citologia nasal mostra infiltrado inflamatório não eosinofílico.
- C) A imunoterapia para rinite alérgica apresenta melhores resultados para antígenos inalatórios e deve ser realizada por tempo prolongado.
- D) Medicamentos anticolinérgicos apresentam ótimo controle da rinorreia e obstrução nasal e pouca ação sobre espirros e prurido.

Questão 44

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O músculo cricótireóideo innervado pelo nervo laríngeo superior é responsável pela produção de sons de baixa frequência.
- B) A paralisia de prega vocal é uma das principais anomalias congênitas da laringe e em até 50% das vezes a causa não é descoberta.
- C) A tireoplastia tipo 1 de Ishiki é a técnica mais utilizada para paralisias em abdução apesar do seu caráter irreversível.
- D) Paciente com paralisia de prega vocal unilateral em abdução tem como diagnóstico diferencial lesão do nervo laríngeo recorrente, fixação interaritenóidea e lesão na região motora do córtex cerebral.

Questão 45

Sobre a hipoacusia autoimune, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a positividade de anticorpo anti 68 Kd indica melhor resposta a corticoterapia.
- B) o tratamento consiste no uso de corticoide (1 a 2 mg / Kg / dia) por longo período.
- C) é comum o aparecimento de doença sistêmica concomitante, ocorrendo em mais de 50% dos casos.
- D) ocorre hipoacusia de início rápido, flutuante e bilateral que progride em semanas a meses.

Questão 46

Analise as seguintes afirmativas.

- I. A comissura anterior age como barreira, impedindo a disseminação anterior e vertical dos tumores.
- II. A drenagem linfática da região glótica é escassa o que justifica o baixo índice de metástases nas fases iniciais.
- III. A glote é a localização mais comum do CCE de laringe.
- IV. Nos tumores da glote e supra glote o sintoma inicial é a rouquidão.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) todas as afirmativas.
- B) apenas as afirmativas I, II e III.
- C) apenas as afirmativas I e IV.
- D) apenas as afirmativas II e III.

Questão 47

Em relação ao carcinoma espinocelular da laringe, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Em pacientes com tumor de supraglote invadindo o espaço pré-epiglótico, a laringectomia horizontal supraglótica é o tratamento cirúrgico de escolha.
- B) Pacientes idosos e pneumopatas com tumores de supraglote devem ser submetidos à laringectomia horizontal, pelo maior risco de aspiração.
- C) Em um paciente com tumor glótico T2N0M0, o procedimento cirúrgico deve incluir o esvaziamento cervical ipsilateral.
- D) No caso de tumor glótico T1bN0M0, o controle com radioterapia é de praticamente 100%.

Questão 48

Em relação aos tumores de glândulas salivares, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O carcinoma mucoepidermoide é o tumor maligno mais comum das glândulas salivares menores.
- B) A falta de encapsulação e multicentricidade do adenoma pleomorfo contribuem para o alto índice de recidiva do tumor.
- C) O tumor de Warthin acomete preferencialmente homens e tende a bilateralidade.
- D) O carcinoma adenoide cístico apresenta crescimento lento, porém mau prognóstico a longo prazo, o que justifica cirurgias agressivas.

Questão 49

As seguintes afirmações estão corretas, **EXCETO**

- A) a principal origem do colesteatoma adquirido é o epítimpano posterior.
- B) o local mais comum de erosão ossicular no colesteatoma é o ramo longo da bigorna.
- C) o septo de Korner divide o epítimpano em anterior e posterior.
- D) o patógeno mais comumente isolado na otite média crônica é o pseudomonas.

Questão 50

Paciente com lesão de tronco acometendo vias auditivas centrais — leminisco lateral e colículo inferior.

Em relação a esse paciente, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Não apresenta reflexos estapedianos.
- B) Apresenta discriminação vocal incompatível com limiares audiométricos tonais.
- C) Apresenta aumento do intervalo I-V no BERA.
- D) Emissões otoacústicas estão presentes.

Questão 51

Em relação à Doença de Ménière, podemos afirmar que

- A) a eletrococleografia é um bom indicador da hidropsia endolinfática. Sua alteração típica é o aumento da relação potencial de ação/potencial de somação.
- B) alteração do VEMP sugere doença em fase avançada.
- C) prova calórica normal exclui o diagnóstico.
- D) crise otolítica de Tumarkin ocorre em fases precoces da doença.

Questão 52

As seguintes estruturas têm a mesma origem embriológica, **EXCETO**

- A) corneto médio.
- B) corneto inferior.
- C) processo unciforme.
- D) corneto superior.

Questão 53

Sobre a atresia coanal, é **CORRETO** afirmar

- A) que a atresia coanal ocorre isoladamente na maioria das vezes. Outras malformações ocorrem em 10 a 15% dos casos
- B) que a forma mais comum da atresia de coana é a membranosa, seguida do tipo misto (osseamembranosa)
- C) que o quadro respiratório da atresia de coana bilateral melhora com o choro e a tosse e piora durante a amamentação
- D) que, no procedimento cirúrgico, é importante remover toda a placa atrésica, preservando o máximo possível do septo posterior.

Questão 54

Sobre as malformações de linha média, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Os gliomas são predominantemente extranasais.
- B) O cisto dermoide deve ser acompanhado pelo risco de malignização.
- C) Sinal de Furstenberg positivo é sugestivo de encefalocele.
- D) A presença de gliomas intranasais implica defeito embrionário na fossa anterior do crânio e forame cego.

Questão 55

São características da fissura submucosa de véu palatino, **EXCETO**

- A) entalhe na borda posterior do palato duro.
- B) úvula bífida.
- C) palato ogival.
- D) diastase muscular no véu palatino.

Questão 56

Analise as seguintes afirmativas.

- I. Na suspeita diagnóstica de paralisia de Bell, testes elétricos devem ser realizados entre o 1º e 3º dia, após o início da paralisia.
- II. Na paralisia facial da S. Hamsay Hunt, o paciente apresenta diminuição de lacrimejamento, alteração do paladar e reflexo estapédico negativo.
- III. Pacientes com paralisia facial central apresentam paralisia de toda hemiface contralateral.
- IV. Após reparo cirúrgico do nervo facial, espera-se que sua função comece a retornar em 3 a 6 meses.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS** apenas

- A) as afirmativas I, II e III.
- B) as afirmativas I e III.
- C) as afirmativas II e IV.
- D) a afirmativa II.

Questão 57

Sobre o zumbido pulsátil, assinale a sua causa **mais prevalente**.

- A) Paragangliomas
- B) Malformações arteriovenosas durais
- C) Hemangiomas
- D) Patologias do seio sigmoide e bulbo da jugular

Questão 58

Sobre o traumatismo do osso temporal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A fratura do osso esferoide é mais frequente do que a do osso temporal nos traumatismos cranianos.
- B) Os adultos jovens são os mais atingidos em frequência maior nos homens do que nas mulheres, na proporção de 3:1.
- C) Nas fraturas longitudinais, a paralisia facial ocorre em 10 a 20% dos casos e a surdez de condução em cerca de 60% dos casos.
- D) A perda auditiva em crianças é essencialmente neurosensorial e a incidência de paralisia facial é menor do que no adulto.

Questão 59

Na Actinomicose, o agente etiológico é um(a)

- A) fungo.
- B) bactéria Gram-negativa.
- C) bactéria Gram-positiva.
- D) micobactéria.

Questão 60

Sobre o Schwannoma do VIII Nervo Craniano, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Corresponde a cerca de 80% dos tumores que acometem o ângulo pontocerebelar.
- B) A vertigem rotatória é o sintoma vestibular mais comum.
- C) O Sinal de Hitselberg é um sinal precoce do neurinoma.
- D) Em cerca de 10% dos pacientes, a surdez súbita é o sintoma inicial.

Questão 61

Sobre os tumores das glândulas salivares, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Cerca de 75% dos tumores das glândulas salivares menores é maligno.
- B) O mioepitelioma é um tumor maligno bastante raro.
- C) O tumor de Warthin ocorre exclusivamente na glândula parótida.
- D) O carcinoma adenoide cístico apresenta, muitas vezes, infiltração perineural.

Questão 62

Assinale o músculo intrínseco da laringe responsável pela abdução das pregas vocais.

- A) Músculo tireoaritenóideo
- B) Músculo cricotireóideo
- C) Músculo cricoaritenóideo posterior
- D) Músculo critenóideo

Questão 63

Sobre as paralisias laríngeas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre aumento da pressão subglótica em pacientes com paralisia laríngea uni e bilateral em comparação com indivíduos normais.
- B) A eletromiografia diferencia sobretudo as paralisias das fixações.
- C) A paralisia laríngea unilateral é mais comum do lado direito.
- D) A preservação do nervo laríngeo superior mantém a sensibilidade da parte superior da laringe.

Questão 64

Sobre a Patologia Bucal, é **CORRETO** afirmar que

- A) a leucoplasia pilosa é uma lesão oportunista causada pelo EBV e ocorre exclusivamente em pacientes HIV positivos.
- B) o vírus do herpes simples (HSV) é um RNA vírus que faz parte da família do herpesvírus humano.
- C) a doença de Behçet, mais comum no sexo masculino, caracteriza-se por úlceras na cavidade bucal e genital.
- D) a leucoplasia verrucosa é considerada um tipo mais benigno de leucoplasia, podendo-se postergar a biópsia.

Questão 65

Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A epiglote é mais encontrada em adultos.
- B) A etiologia da laringite catarral aguda é principalmente bacteriana, sendo os germes mais comuns *Branhamella catarrhalis* e *Haemophilus influenzae*.
- C) A crupe viral caracteriza-se por um quadro de tosse rouca, estridor inspiratório e angústia respiratória. Trata-se de uma síndrome de obstrução subglótica.
- D) A laringite estridulosa apresenta como principal achado à fibronasolaringoscopia o edema das pregas vocais.

Questão 66

Em relação aos papilomas laríngeos, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A traqueostomia deve ser evitada pelo risco de disseminação da doença.
- () A forma juvenil apresenta menor risco de malignização e melhor controle a longo prazo.
- () As localizações mais frequentes são as regiões supra e subglóticas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V)
- B) (F) (V) (F)
- C) (V) (F) (F)
- D) (V) (F) (V)

Questão 67

Em relação à epistaxe, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () As artérias palatina descendente e nasopalatina têm origem na artéria carótida externa.
- () As epistaxes superiores são provenientes das artérias etmoidais anterior e posterior, ramos da artéria oftálmica do sistema da artéria carótida externa.
- () As epistaxes posteriores são provenientes do sistema da artéria carótida interna, através dos ramos nasais da artéria maxilar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F)
- B) (F) (V) (V)
- C) (V) (V) (V)
- D) (F) (V) (F)

Questão 68

Em relação à hidropisia endolinfática, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Caracteriza-se pela distensão progressiva do espaço endolinfático, acometendo inicialmente, o sáculo e as ampolas dos canais semicirculares.
- () A estria vascular tem papel fundamental na fisiologia da orelha interna, sendo responsável pela geração do potencial endococlear e contribuindo na secreção de endolinfa.
- () É frequente o caráter flutuante da hipoacusia, havendo queda da audição durante as crises e posterior recuperação, que pode ser total ou parcial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F)
- B) (F) (V) (V)
- C) (V) (V) (V)
- D) (F) (V) (F)

Questão 69

Sobre a Mucoviscidose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O íleo meconial é a manifestação gastrointestinal mais precoce.
- B) *Pseudomonas aeruginosa* é o patógeno mais frequentemente encontrado nos primeiros anos de vida do paciente.
- C) A doença pulmonar evolui em praticamente 100% dos casos para *cor pulmonale*.
- D) O acometimento sinusal é rotineiramente encontrado de forma precoce nesses pacientes, porém os sintomas clínicos referentes à sinusite ou polipose são pouco observados antes dos cinco anos de idade.

Questão 70

Analise as seguintes afirmativas.

- I. Angina de Plaut-Vicent é uma infecção ulceronecrosante causada pela associação de um bacilo fusiforme e um espiralar.
- II. O microrganismo isolado mais comumente no abscesso periamigdaliano é o *Staphylococcus aureus*.
- III. A eritroplasia oral é mais rara que a leucoplasia e apresenta menor risco de malignização.
- IV. O líquen plano erosivo é mais comum que o reticular e apresenta sintomatologia dolorosa importante.

A partir dessa análise, pode-se concluir que apenas

- A) as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) as afirmativas II e III estão corretas.
- D) a afirmativa I está correta.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	65	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	66	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	67	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	69	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	52	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	54	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	58	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.