



SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009
GERIATRIA
Código 119

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS



ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

➤ **Conhecimentos Gerais**

CIRURGIA GERAL

Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

CLÍNICA MÉDICA

Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

COLUNA II

- () Agravamento de insuficiência arterial periférica
- () Edema
- () Menor efeito em negros
- () Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptção de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- () O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- () O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- () O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

➤ PEDIATRIA

Questão 13

Em crianças, a tétrede clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

SAÚDE PÚBLICA

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

COLUNA II

- () Odds Ratio
() Risco Relativo
() Razão de Médias
() Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.

Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

➤ Conhecimentos Específicos

Questão 21

Durante a aplicação do Minimental de Folstein (1975) adaptado por Brucki et al. (2003), uma idosa com 15 anos de alfabetização acertou todas as respostas, **EXCETO** as que avaliam a memória de evocação. Quantos pontos ela marcou?

- A) 21.
- B) 23.
- C) 25.
- D) 27.

Questão 22

Diante de um caso de demência, são características que falam a favor do diagnóstico de Demência Frontotemporal, **EXCETO**

- A) comportamentos compulsivos e/ou repetitivos.
- B) comprometimento precoce das habilidades visuoespaciais.
- C) hiperoralidade.
- D) mudanças precoces na personalidade e comportamento.

Questão 23

Com relação aos sintomas psicológicos e comportamentais na doença de Alzheimer, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Embora infrequente, a apatia se assemelha à depressão.
- B) Irritabilidade é um sintoma precoce e comum.
- C) Nenhum sintoma psicológico ou comportamental é patognomônico da doença.
- D) Paranoia e alucinações são comuns em algumas fases da doença.

Questão 24

Em relação à importância real dos exames de imagem na avaliação dos pacientes com déficit cognitivo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Atrofia cerebral difusa não sugere a doença de Alzheimer.
- B) Atrofia assimétrica frontal e temporal não sugere demência frontotemporal.
- C) Hiperintensidade da substância branca não sugere demência vascular.
- D) Pelo menos um exame de imagem é necessário para o diagnóstico diferencial das demências.

Questão 25

Diante de um paciente com quadro de demência ainda sem diagnóstico claro, assinale o fato que **reduz a probabilidade** de se tratar da Demência com Corpos de Lewy.

- A) Ausência de resposta aos anticolinesterásicos.
- B) Flutuação na cognição ou atenção ao longo de algumas horas.
- C) História de sono agitado, há vários anos.
- D) Memória episódica quase normal na avaliação neuropsicológica.

Questão 26

De acordo com os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) IV da Associação Americana de Psiquiatria, diante de um idoso com confusão mental, **NÃO** sugere que o diagnóstico seja *delirium*:

- A) a comprovação de que ele está com infarto agudo do miocárdio em andamento.
- B) o diagnóstico confirmado previamente de doença de Alzheimer.
- C) sintomas flutuantes, de início insidioso.
- D) um estado de letargia.

Questão 27

Com relação à doença de Parkinson em idosos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A ausência de tremor sugere outro diagnóstico.
- B) A taxa de progressão é variável, não linear.
- C) Disartria, disfagia e hipofonia são as principais indicações da fonoterapia.
- D) A instabilidade postural é um sinal precoce.

Questão 28

Dos medicamentos abaixo, assinale o que apresenta o **melhor** perfil de risco/benefício no tratamento da doença de Parkinson em pacientes muito idosos.

- A) Amantadina
- B) Anticolinérgicos
- C) Pramipexol
- D) Selegilina

Questão 29

Entre as opções de tratamento com neurolépticos, assinale a que está com a dose **bastante diferente** das preconizadas habitualmente.

- A) 0,25 mg de risperidona duas vezes ao dia.
- B) 2,5 mg de olanzapina duas ao dia.
- C) 25 mg de quetiapina duas vezes ao dia.
- D) 250 mg de clozapina duas vezes ao dia.

Questão 30

Entre as opções de tratamento com antidepressivos, assinale a que está com a dose **bastante diferente** das preconizadas habitualmente.

- A) 5 mg de trazodona diariamente.
- B) 15 mg de mirtazapina diariamente.
- C) 75 mg de nortriptilina diariamente.
- D) 150 mg de venlafaxina diariamente.

Questão 31

Uma idosa com osteoporose e incontinência urinária de urgência vem se queixando de *falta de energia* há algumas semanas, coincidindo com seu aniversário de 85 anos. A anamnese e exame clínico não revelaram nenhuma causa que possa justificar o quadro, exceto pela história de um irmão, que faleceu também aos 85 anos, no ano anterior. Os resultados dos exames pedidos são:

Hemograma: sem alterações;
Glicemia: 93 mg/dL;
TSH basal: 4,5 mU/L;
Sódio: 122 mEq/L;
Potássio: 3,9 mEq/L;
Cálcio: 9,0 mg/dL;
Albumina: 4,0 mg/dL.
Fosfatase alcalina: 120 u/L.
Creatinina: 0,7 mg/dL;
TGO e TGP: 27 u/L;

A conduta ***mais adequada*** para essa consulta seria

- A) indicar psicoterapia breve.
- B) iniciar um inibidor seletivo da recaptção de serotonina.
- C) orientar sobre o quadro de somatização relacionado ao aniversário e à perda do irmão e propor uma reavaliação em algumas semanas.
- D) restrição hídrica.

Questão 32

Com relação às quedas de idosos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Aproximadamente 10% dos idosos sofrem uma ou mais quedas a cada ano.
- B) A maior frequência de quedas entre idosos frágeis ocorre quando eles tentam se engajar em atividades mais vigorosas do que aquelas para as quais estão capacitados.
- C) Embora a minoria das quedas tenha como causa uma condição aguda subjacente como uma pneumonia ou arritmia, esta possibilidade sempre deverá ser investigada.
- D) A maioria dos casos de hematoma subdural crônico resultante de uma queda se manifestará com cefaleia, mas em alguns casos só haverá confusão mental.

Questão 33

Considerando a fisiopatologia da instabilidade do detrusor, qual dos medicamentos abaixo deverá trazer **MENOS** benefício?

- A) Darifenacina
- B) Duloxetina
- C) Oxibutinina
- D) Tolterodina

Questão 34

Qual é o sinal **mais precoce** das úlceras de pressão?

- A) Abrasão superficial.
- B) Descamação furfurácea.
- C) Eritema persistente.
- D) Hipoestesia localizada.

Questão 35

Com relação ao glaucoma primário de ângulo aberto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Essa doença crônica corresponde a mais de 90% dos casos de glaucoma.
- B) A discreta perda de visão que ocorre nas fases precoces da doença, muitas vezes, é considerada *um problema da idade*.
- C) Nos pacientes idosos, classicamente, a perda de visão se inicia no campo visual nasal.
- D) O quadro de visão borrada, cefaleia, náuseas e vômitos não sugere o diagnóstico.

Questão 36

Com relação à presbiacusia, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É a causa mais comum de perda auditiva sensorial.
- B) É caracterizada pela perda bilateral assimétrica.
- C) Predomina a perda de sons de alta frequência.
- D) Diante da suspeita clínica, o paciente deve realizar uma audiometria.

Questão 37

Com relação à labirintite, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É uma das causas mais comuns de vertigem de origem periférica em idosos.
- B) O quadro clínico pode ser acompanhado por zumbido e perda auditiva.
- C) O comprometimento da audição pode ser definitivo no ouvido acometido.
- D) Pacientes muito sintomáticos devem utilizar meclizina ou cinarizina.

Questão 38

Analise as seguintes estratégias para prevenção secundária de angina.

1. Reduzir a homocisteína utilizando ácido fólico.
2. Utilizar ácido acetilsalicílico para reduzir a agregação plaquetária.
3. Utilizar o efeito antioxidante da vitamina E.

Já demonstrou(aram) benefícios, **inequivocamente**, apenas

- A) a estratégia 1.
- B) as estratégias 1 e 2.
- C) a estratégia 2.
- D) as estratégias 2 e 3.

Questão 39

Assinale a associação **INCORRETA** entre um medicamento e seus efeitos adversos que, por não serem raros, devem ser considerados com muita atenção ao serem utilizados em monoterapia.

- A) Atenolol, 50 mg/dia – exacerbar broncoespasmo em pacientes predispostos
- B) Espironolactona, 50 mg/dia — hipercalcemia
- C) Losartan, 50 mg/dia — angiodema
- D) Verapamil, 180 mg/dia — constipação intestinal

Questão 40

Um idoso vem apresentando, há alguns meses, episódios de angina em suas caminhadas diárias matinais (6 km em 60 minutos, no plano). Ele se recusa a fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica.

Nesse caso, a estratégia de tratamento clínico **mais adequada** seria

- A) reduzir, moderadamente, a duração e/ou velocidade das caminhadas.
- B) manter as caminhadas, mas utilizar nitrato sublingual cinco minutos antes.
- C) utilizar atenolol e, se preciso para evitar angina, associar um bloqueador de canal de cálcio como o verapamil ou anlodipino.
- D) utilizar um inibidor da enzima de conversão da angiotensina e betabloqueador. Se necessário, para controlar as crises de angina, associar um bloqueador de canal de cálcio como anlodipino ou um nitrato de ação prolongada.

Questão 41

Com relação à insuficiência cardíaca (IC) no idoso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Diuréticos são o meio mais eficiente de trazer alívio sintomático na IC moderada.
- B) Sempre que possível, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina devem ser titulados até a dose eficaz definida pelos ensaios clínicos (captopril 50 mg 3x/dia, enalapril 10 mg 2x/dia, lisinopril 20 mg/dia).
- C) Todos os pacientes com IC estável devem ser tratados com betabloqueadores, a menos que haja uma contraindicação não-cardíaca à sua utilização.
- D) Digoxina é indicada a todos os pacientes que permaneçam sintomáticos, apesar do uso de doses adequadas de diuréticos e betabloqueadores.

Questão 42

Um idoso tem insuficiência cardíaca com baixa fração de ejeção. Ele apresentava retenção hídrica, há alguns meses atrás, na fase de titulação dos medicamentos, no início do tratamento, mas atualmente, está assintomático.

O esquema terapêutico **mais adequado** para o tratamento atual seria

- A) diurético + betabloqueador + digoxina.
- B) diurético + inibidor da enzima de conversão da angiotensina + betabloqueador.
- C) inibidor da enzima de conversão da angiotensina + betabloqueador + digoxina.
- D) inibidor da enzima de conversão da angiotensina + digoxina + espironolactona.

Questão 43

Com relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É a mais comum das arritmias crônicas, mas — exceto por suas complicações — raramente ameaça a vida.
- B) A maioria dos pacientes retorna espontaneamente ao ritmo sinusal, nas primeiras 24 horas, após um episódio inicial de fibrilação atrial.
- C) Entre algumas das suas complicações podemos citar hipotensão postural, isquemia do miocárdio e insuficiência cardíaca.
- D) Sua complicação mais temida é o tromboembolismo pulmonar, resultante da embolização de trombos atriais.

Questão 44

Com relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes com algum fator de risco para complicações embólicas deverão ser anticoagulados, exceto se a fibrilação atrial ocorrer raramente ou somente em paroxismos.
- B) A cardioversão eletiva — caso seja planejada — poderá ser realizada após uma a três semanas de anticoagulação.
- C) O método de escolha para anticoagulação é a utilização de warfarin e a meta do RNI é 2,0 a 3,0.
- D) Mesmo para idosos com 75 anos ou mais, substituir o warfarin por clopidogrel associado ao ácido acetilsalicílico não é uma alternativa razoável.

Questão 45

Todos os medicamentos abaixo potencializam o efeito do warfarin, **EXCETO**

- A) Alopurinol.
- B) Carbamazepina.
- C) Levotiroxina.
- D) Sinvastatina.

Questão 46

Alguns exames, frequentemente, estão alterados em idosos hígidos. Analise a lista de exames laboratoriais abaixo:

1. Fator reumatoide
2. Velocidade de hemossedimentação
3. Fator antinuclear

A análise permite afirmar **corretamente** que

- A) em idosos hígidos esses exames não se alteram.
- B) somente um desses exames, frequentemente, está alterado em idosos hígidos, mas não o exame 3.
- C) dois desses exames, frequentemente, estão alterados em idosos hígidos, incluindo o exame 2.
- D) todos os três exames, frequentemente, estão alterados em idosos hígidos.

Questão 47

Na osteoartrite primária são articulações, frequentemente, acometidas, **EXCETO**

- A) acromioclaviculares.
- B) interfalangianas distais.
- C) interfalangianas proximais.
- D) primeira metacarpofalangiana.

Questão 48

Um idoso com 80 anos veio se consultar com dor no joelho. O quadro iniciou-se há cerca de três dias. Não há febre, mas ele está prostrado e sem apetite. Ao exame você observa edema, rubor, calor e dor no joelho direito, que apresenta derrame articular moderado. O hemograma de hoje revela leucocitose e elevação da velocidade de hemossedimentação.

Nesse caso, a conduta **CORRETA** seria:

- A) fazer uma artrocentese para análise do líquido sinovial.
- B) prescrever repouso + anti-inflamatórios seletivos ou específicos para a Cox-2.
- C) solicitar uma dosagem de ácido úrico. Se elevado, prescrever colchicina.
- D) solicitar uma radiografia do joelho.

Questão 49

Uma senhora branca de 70 anos apresenta astenia, hiporexia, emagrecimento e febre baixa há algumas semanas. Queixa rigidez matinal e dor mal localizada nas regiões posterior do tórax, lombar, cervical, nos ombros, braços, quadril e coxas, com dificuldade para se levantar da cama. Não tem queixas relacionadas às mãos. O exame físico revelou apenas rigidez e dolorimento à movimentação dos ombros. Na avaliação laboratorial, foram detectadas elevação da velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa e anemia de doença crônica. Ela está utilizando, por conta própria, prednisona 20mg, pela manhã, há três dias, com enorme alívio dos sintomas.

O *diagnóstico provável* seria

- A) artrite reumatoide.
- B) fibromialgia.
- C) polimialgia reumática.
- D) uma doença infecciosa subaguda.

Questão 50

Um médico recebeu alguns resultados de densitometria óssea, avaliou a densidade mineral óssea (DMO), o número de desvios padrão (DP) acima ou abaixo da média e emitiu o seguinte parecer:

Paciente A: DMO -0,1 DP daquela faixa etária. Parecer do médico: *Normal*.

Paciente B: DMO -1,5 DP daquela faixa etária. Parecer do médico: *Osteopenia*.

Paciente C: DMO -2,6 DP daquela faixa etária. Parecer do médico: *Osteoporose*.

Considerando as informações disponíveis,

- A) podemos afirmar que está correto apenas o parecer sobre o paciente **C**.
- B) podemos afirmar que estão corretos apenas os pareceres sobre os pacientes **B** e **C**.
- C) podemos afirmar que estão corretos os pareceres sobre os pacientes **A**, **B** e **C**.
- D) não podemos afirmar que algum parecer esteja correto.

Questão 51

Com relação à osteoporose em homens idosos e suas consequências, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Causas secundárias de osteoporose são proporcionalmente menos frequentes em homens que em mulheres.
- B) Homens com osteoporose e história prévia de quedas deverão restringir suas atividades, receber cálcio e vitamina D.
- C) Homens com densidade mineral óssea muito baixa deverão ser tratados com testosterona.
- D) Homens idosos com fratura do quadril têm mortalidade mais elevada que mulheres idosas com fratura do quadril.

Questão 52

Diante de uma idosa com uma densitometria óssea com densidade mineral óssea muito abaixo da esperada, devem ser investigadas as seguintes causas secundárias, **EXCETO**

- A) hiperparatireoidismo.
- B) hipertireoidismo.
- C) hipogonadismo.
- D) osteomalácia.

Questão 53

Com relação à osteoporose em mulheres idosas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria das fraturas vertebrais é assintomática.
- B) A osteoporose sem fraturas é assintomática.
- C) A radiografia da coluna torácica e lombar é um exame barato, seguro e sensível para o diagnóstico da osteoporose em mulheres muito idosas.
- D) Dor lombar intensa, que surge subitamente em uma atividade de rotina e persiste leve, por semanas, é uma manifestação típica da osteoporose.

Questão 54

No hiperparatireoidismo primário, frequentemente, são observados os seguintes sinais e sintomas, **EXCETO**

- A) depressão.
- B) diarreia.
- C) hipertensão arterial.
- D) poliúria.

Questão 55

No hiperparatireoidismo primário, frequentemente, são observadas as seguintes alterações laboratoriais, **EXCETO**

- A) cálcio elevado.
- B) fosfatase alcalina elevada.
- C) fósforo elevado.
- D) paratormônio elevado.

Questão 56

Analise as três afirmativas sobre o hipertireoidismo subclínico em idosos:

1. É caracterizado por valores anormalmente baixos de TSH e anormalmente altos de T4 livre.
2. Pode ser de origem iatrogênica.
3. Aumenta o risco de morte cardiovascular.

A análise permite concluir que apenas

- A) a afirmativa 1 é verdadeira.
- B) as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- C) a afirmativa 2 é verdadeira.
- D) as afirmativas 2 e a 3 são verdadeiras.

Questão 57

Assinale o sintoma de hipertireoidismo **mais frequente** em idosos do que em adultos.

- A) Arritmias
- B) Palpitações
- C) Sudorese excessiva
- D) Tremor

Questão 58

Com relação ao hipotireoidismo em idosos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sintomas como constipação, pele seca, parestesias, astenia e fraqueza devem levantar a suspeita de hipotireoidismo em idosos, embora sejam comuns nos pacientes eutireoideos.
- B) O melhor exame para confirmar o diagnóstico é a dosagem do TSH. O mesmo exame é utilizado para monitorar a resposta ao tratamento.
- C) Lítio e amiodarona podem provocar hipotireoidismo em idosos.
- D) Idosos cardiopatas devem iniciar a levotiroxina com doses baixas (50 mcg) e aumentar, lentamente (25mcg), a cada 4 a 6 semanas, até a dose adequada.

Questão 59

Analise as três afirmativas abaixo sobre doenças da tireoide em idosos:

1. O hipotireoidismo subclínico é relativamente frequente em idosos, mas só uma pequena proporção de casos evolui para hipotireoidismo franco a cada ano.
2. Valores de TSH entre 5 e 10 mU/L são considerados anormais em idosos.
3. Pacientes com TSH superior a 10 mU/L devem utilizar doses de levotiroxina suficientes para reduzir o TSH para valores inferiores a 10 mU/L.

A análise permite concluir que apenas

- A) a afirmativa 1 é verdadeira.
- B) as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- C) a afirmativa 2 é verdadeira.
- D) as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

INSTRUÇÃO – As questões 60 e 61 se referem ao seguinte caso clínico.

O Sr. Juvenal, de 83 anos, compareceu ao consultório médico com quadro de poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento. Trouxe exames pedidos por outro médico, que se mudou para outra cidade. Os exames realizados, ontem, revelam:

Glicemia de jejum = 99 mg/dL

Glicemia 2h após o almoço = 189 mg/dL

Glicohemoglobina = 5,9%

Questão 60

Nesse momento, em relação ao caso do Sr. Juvenal,

- A) pode-se firmar o diagnóstico de Diabetes mellitus.
- B) pode-se firmar o diagnóstico de Pré-diabetes, na categoria *tolerância reduzida aos carboidratos*.
- C) pode-se firmar o diagnóstico de Pré-diabetes, na outra categoria (não é a *tolerância reduzida aos carboidratos*).
- D) não é possível firmar nenhum diagnóstico.

Questão 61

Se a avaliação clínica no consultório não revelar nenhuma informação adicional, a conduta **mais correta** para o Sr. Juvenal nesse momento seria:

- A) prescrever dieta para diabetes (com atenção especial à quantidade de proteínas), hidratação adequada e atividade física, incluindo musculação com baixa intensidade, para ganho de massa muscular.
- B) prescrever uma droga para controlar a hiperglicemia pós-prandial.
- C) solicitar mais exames.
- D) tranquilizar o paciente e agendar um retorno eletivo para alguns meses.

Questão 62

Assinale a associação **INCORRETA** entre um medicamento e seus efeitos adversos que, por não serem raros, devemos considerar com muita atenção ao utilizá-lo em monoterapia.

- A) Acarbose – hipoglicemia.
- B) Metformina – deficiência de vitamina B12.
- C) Pioglitazona – retenção hídrica.
- D) Repaglinida – ganho de peso.

INSTRUÇÃO – As questões 63 a 67 se referem ao seguinte caso clínico.

O Sr. Aristides, 68 anos, é gerente de supermercado. Ele está aparentemente hígido, sem queixas, e comparece ao consultório para fazer um exame periódico de saúde (*check-up*). O único medicamento que ele utiliza é uma dose diária de 100mg de ácido acetilsalicílico.

Questão 63

Com relação ao rastreamento de neoplasia de próstata, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Como o câncer de próstata progride lentamente, o Sr. Aristides não deverá submeter-se ao rastreamento, pois as complicações da prostatectomia radical são superiores à chance de progressão significativa de uma doença localizada.
- B) O Sr. Aristides deverá realizar a dosagem do PSA. Se alterado, deverá fazer o toque retal.
- C) O PSA não é específico para o câncer de próstata; um exame alterado, isolado, tem baixo valor preditivo.
- D) O ultrassom transretal da próstata – embora mais dispendioso – é o método de rastreamento mais sensível e específico.

Questão 64

Ao conferir os exames recentes do Sr. Aristides, o médico encontrou diversos resultados.

Assinale a alternativa cujo resultado **umenta** a probabilidade de ele já estar com câncer de próstata.

- A) PSA total = 4,4 ng/mL.
- B) Fração de PSA livre = 8%.
- C) Aumento de 0,5 ng/mL entre as dosagens realizadas neste mês e há 12 meses.
- D) Densidade de PSA baixa.

Questão 65

O Sr. Aristides indagou sobre o risco de neoplasia colorretal.

Assinale a resposta que **NÃO** poderia ser dita a ele.

- A) *“O uso do ácido acetilsalicílico deve estar reduzindo seu risco de desenvolver a neoplasia colorretal”.*
- B) *“Nesta idade, mesmo sem sintomas e sem história familiar, você realmente precisa se preocupar com rastreamento”.*
- C) *“Você deve realizar, anualmente, a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a dosagem do antígeno carcinoembrionário (CEA)”.*
- D) *“A melhor opção para você ficar tranquilo é fazer uma colonoscopia”.*

Questão 66

O Sr. Aristides indagou ainda, se poderia estar com neoplasia colorretal, mesmo sem sintomas. O médico respondeu a ele com as seguintes afirmativas:

- I. *“O adenocarcinoma do intestino cresce lentamente e pode surgir vários anos antes de qualquer sintoma.”*
- II. *“Os sintomas de obstrução intestinal são incomuns, se a neoplasia se localiza no cólon ascendente.”*
- III. *“Já a cólica abdominal e modificação dos hábitos intestinais são manifestações da neoplasia no cólon descendente.”*
- IV. *“Por este motivo, devemos manter um alto índice de suspeição e fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, se qualquer um destes sintomas surgir.”*

Está **INCORRETA** a afirmativa contida no item

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.

Questão 67

O Sr. Aristides também quer saber se a imunização contra a gripe, realmente, funciona. Ele disse que *“nunca se gripa e já viu muita gente adoecer depois da vacina”*. O médico que estava razoavelmente atualizado nesse assunto, respondeu com as seguintes afirmativas:

- I. *“Na sua idade, a vacina realmente não protege mais de 2/3 das pessoas contra a infecção pelo vírus influenza.”*
- II. *“Mesmo aquelas com uma boa resposta imunológica podem ter o azar de se infectar, nas primeiras duas ou três semanas, após a imunização, quando os anticorpos ainda não atingiram o pico.”*
- III. *“Há também pessoas que desenvolvem sintomas gripais mais leves provocados pelo vírus atenuado presente na vacina.”*
- IV. *“De qualquer modo, mesmo se não evitar a gripe, a vacina reduz o risco de morrer, e vale a pena se vacinar todo ano”.*

Está **INCORRETA** a afirmativa contida no item

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.

Questão 68

Com relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É uma doença caracterizada pela hiperreatividade das vias aéreas, secundária à bronquite crônica e/ou enfisema, cuja causa mais comum é o tabagismo.
- B) A bronquite crônica é um diagnóstico clínico, definido pela produção excessiva de secreção brônquica, com tosse produtiva crônica durante pelo menos três meses, em dois anos consecutivos.
- C) O enfisema é um diagnóstico patológico, que denota o alargamento permanente e anormal dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição de suas paredes e sem fibrose evidente.
- D) Nas fases iniciais, pode haver ausência completa de achados clínicos.

Questão 69

Com relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Broncodilatadores não alteram o declínio inexorável da função pulmonar, que é uma das principais características da doença.
- B) A teofilina é um agente de 1ª linha para pacientes com desordens respiratórias, relacionadas ao sono.
- C) Pacientes com piora da dispneia, associada ao aumento da quantidade e mudança da cor da expectoração, deverão utilizar antibioticoterapia.
- D) Oxigenioterapia suplementar, por pelo menos 15h/dia, não modifica a história natural da doença, mas melhora a qualidade de vida e reduz a necessidade de internações hospitalares.

Questão 70

Com relação ao Herpes zoster, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Idade elevada é um fator de risco, mesmo na ausência de qualquer doença.
- B) Em idosos mais velhos, frequentemente, a dor sobre o dermatomo afetado é a única manifestação clínica.
- C) A utilização de antivirais reduz o processo inflamatório, a dor e a duração da neuralgia pós-herpética.
- D) A dor da neuralgia pós-herpética pode durar mais de um ano em idosos mais velhos.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	65	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	66	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	67	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	69	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	52	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	54	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	58	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.