



MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS BÁS. MED. e LEG. SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 25	1,0	31 a 40	1,0
6 a 10	3,0					26 a 30	3,0	41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



Continua



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afinando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.

15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.

17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:

- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na lei 8.080 do 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

O tabagismo continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As grávidas fumantes correm riscos de:

- (A) parto prematuro.
- (B) rotura prematura de bolsa das águas.
- (C) pré-eclâmpsia.
- (D) Síndrome de Hellp.
- (E) coagulação intravascular disseminada.

27

Um paciente adulto com um nível tensional de 160x100 mm Hg deve ser considerado:

- (A) normotenso.
- (B) normotenso limítrofe.
- (C) hipertenso moderado.
- (D) hipertenso grave.
- (E) hipertenso muito grave.

28

A cefaléia é um sintoma habitual no atendimento médico primário. Na população em geral, o tipo mais freqüente é a cefaléia:

- (A) secundária.
- (B) de tensão.
- (C) das doenças febris.
- (D) em salvas.
- (E) pós-traumática.

29

Entre as vantagens do aleitamento materno **NÃO** se inclui a:

- (A) melhoria do desenvolvimento infantil.
- (B) redução da mortalidade infantil.
- (C) redução de alergias no recém-nato.
- (D) prevenção de lesões neurológicas na criança.
- (E) promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho.

30

Todo médico deve orientar o paciente com Ansiedade Generalizada, ao lhe prescrever um benzodiazepínico, para risco de:

- (A) convulsões.
- (B) perda de peso.
- (C) possível aparecimento de estado eufórico.
- (D) prática de atividades que exijam atenção.
- (E) possibilidade de confusão mental e comportamento bizarro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Um paciente do sexo masculino, com 38 anos de idade, apresentou crise de hipertensão arterial durante o início de uma anestesia para a realização de colecistectomia, o que obrigou à suspensão do ato operatório. O paciente informa que há dois anos vem apresentando surtos de cefaléia, sudorese e palpitações. Por várias vezes procurou serviço de emergência, tendo sido constatada crise hipertensiva. O diagnóstico mais provável é:

- (A) hipertensão arterial essencial mal controlada.
- (B) hiperaldosteronismo.
- (C) feocromocitoma.
- (D) estenose de artéria renal.
- (E) Doença de Cushing.

32

Paciente é consultado por suspeita clínica de acromegalia. O teste considerado padrão ouro para confirmação diagnóstica é a:

- (A) estimulação do GH pelo ADH.
- (B) estimulação do GH pelo ACTH.
- (C) estimulação do GH pela glicose.
- (D) supressão do GH pelo TRH.
- (E) supressão do GH pela glicose.

33

De acordo com as categorias de tolerância à glicose e segundo os novos critérios estabelecidos pela Sociedade Americana de Diabetes (ADA-97), assinale a afirmativa **INCORRETA** quanto aos resultados das glicemias (valores em mg/dl).

- (A) Valores de glicemia de jejum maiores ou iguais a 110 e menores que 126 mg% identificam a categoria glicemia de jejum alterada.
- (B) Valores de 2h no TOTG abaixo de 140 mg% identificam a categoria de tolerância normal à glicose.
- (C) Valores de 2h no TOTG maiores ou iguais a 140 e menores que 200 mg/dl diagnosticam intolerância à glicose.
- (D) Valores de 2h no TOTG iguais ou superiores a 200 mg/dl diagnosticam *Diabetes mellitus*.
- (E) Glicemia ao acaso maior que 200 mg/dl, em paciente assintomático, diagnostica *Diabetes mellitus*.

34

Os fibratos são as drogas mais eficazes para:

- (A) reduzir colesterol.
- (B) reduzir triglicerídeos.
- (C) aumentar a LDL pequena e densa.
- (D) aumentar a LDL-colesterol.
- (E) aumentar a VLDL.

35

No seguimento do carcinoma diferenciado de tireóide, o marcador tumoral utilizado é:

- (A) CEA.
- (B) alfa-feto proteína.
- (C) tireocalcitona.
- (D) tireoglobulina.
- (E) hormônios tireoideanos.

36

Uma mulher com 40 anos queixa-se de perda de peso, irregularidade menstrual, intolerância ao calor, fadiga, nervosismo e cefaléia. Ao exame físico, apresenta aspecto emagrecido, pulso de 110 bpm, PA de 150/60 mmHg, tremores finos nas mãos, pele quente e fina. A palpação tireoideana mostra um nódulo firme, de 4 cm, no lobo direito, e a cintilografia tireoideana mostra imagem com captação somente na região nodular. Este quadro é compatível com o diagnóstico de:

- (A) tireotoxicose por Doença de Basedow-Graves.
- (B) adenoma hiperfuncionante autônomo de tireóide.
- (C) hipersecreção de tireotrofina, possivelmente por adenoma hipofisário, simulando função tireoideana autônoma.
- (D) produção ectópica de tireotrofina (TSH), possivelmente por coriocarcinoma, simulando uma função tireoideana autônoma.
- (E) carcinoma de tireóide, produzindo uma iodoproteína anormal.

37

Paciente com 67 anos, hipertenso, diabético, tabagista, com relato de infarto agudo do miocárdio há dois anos, encontra-se em tratamento dietético para hipercolesterolemia há cerca de 3 meses. Apresenta nos últimos exames laboratoriais: colesterol total: 280 mg%, LDL: 180 mg/dl, HDL: 25 mg/dl, VLDL: 23 mg/dl, triglicerídeos: 159 mg/dl. Este paciente deverá manter o seu nível máximo de LDL-colesterol menor que:

- (A) 100 (B) 130 (C) 140 (D) 160 (E) 190

38

Uma mulher de 40 anos notou, ao longo dos anos, alterações somáticas acompanhadas de artralguas (consideradas como artrite degenerativa), sudorese excessiva, voz rouca, hiperostose frontal, espessamento dos lábios, macroglossia, prognatismo e hipertensão arterial. Com este quadro clínico a hipótese diagnóstica mais provável é de:

- (A) hipotireoidismo.
- (B) hipoparatiroidismo.
- (C) hiperparatiroidismo.
- (D) acromegalia.
- (E) feocromocitoma.



39

A droga anti-hipertensiva que tem demonstrado efeito benéfico na redução da proteinúria e retardo da progressão da nefropatia diabética é:

- (A) alfa-metildopa.
- (B) propranolol.
- (C) minoxidil.
- (D) clonidina.
- (E) captopril.

40

Paciente de 45 anos de idade, sexo masculino, diabético tipo 2 e com passado de infarto de agudo, apresenta em exames laboratoriais, após 6 meses de dieta regular, níveis de colesterol total = 325 mg/dl, HDL-col = 27 mg/dl, LDL-col = 148 mg/dl e de triglicerídeos = 132 mg/dl. Para esse caso, qual a conduta mais adequada?

- (A) Tentar dieta mais 3 meses.
- (B) Terapia medicamentosa com fibratos.
- (C) Terapia medicamentosa com vastatinas.
- (D) Terapia medicamentosa com vastatinas + fibratos.
- (E) Terapia medicamentosa com ácido ômega – 3.

41

Procurou atendimento médico um menino com 13 anos de idade queixando-se de baixa estatura. Durante o segundo ano de vida, seu crescimento foi lento, seguido de velocidade de crescimento normal, atraso de idade óssea (de 2 anos) e da puberdade, com história familiar positiva de baixa estatura. Este menino é provavelmente portador de:

- (A) hipotireoidismo.
- (B) deficiência idiopática de GH.
- (C) retardo constitucional do crescimento.
- (D) nanismo hipofisário.
- (E) Nanismo de Laron.

42

Um diabético em tratamento ambulatorial toma duas doses diárias de insulina de ação intermediária (NPH), às 6 horas e às 18 horas, e freqüentemente apresenta hiperglicemia nas amostras de jejum colhidas às 7 horas e glicemia normal nas amostras das 11, 18 e 22 horas. A conduta correta é:

- (A) aumentar a dose de insulina das 18 horas.
- (B) aumentar a dose de insulina de jejum.
- (C) diminuir a refeição noturna.
- (D) dosar a glicemia às 3 horas.
- (E) dosar a hemoglobina glicosada.

43

Uma mulher obesa, 38 anos, hirsuta, com pletora facial, oligomenorréia e hipertensão arterial desenvolveu fraqueza muscular, estrias violáceas no abdômen, acne, polidipsia e poliúria, além de hiperpigmentação cutânea, cálculos renais e sintomas psicológicos (depressão e euforia). Nos exames complementares, observou-se discreta poliglobulia, leucocitose, linfo e eosinopenia. A glicemia foi de 180 mg/dl. O teste de supressão com 8 mg de dexametasona por dia, durante 2 dias, reduziu em mais de 50% o valor basal do cortisol plasmático. Tais evidências indicam o diagnóstico de:

- (A) tumor de supra-renal.
- (B) adenoma hipofisário.
- (C) síndrome dos ovários policísticos.
- (D) produção ectópica de ACTH em metástases de tumor de ovário.
- (E) diabetes do tipo 2, associado à síndrome dos ovários policísticos.

44

Na avaliação de baixa estatura, qual dos seguintes procedimentos **NÃO** é útil na pesquisa diagnóstica?

- (A) Avaliação radiológica da idade óssea.
- (B) Cariotipagem cromossômica.
- (C) Concentração sérica de tiroxina.
- (D) Medida da IGF-1 e IGFBP-3.
- (E) Medida aleatória da concentração plasmática do hormônio do crescimento.

45

Após um trauma craniano, um homem de 24 anos de idade, desenvolve subitamente poliúria importante com noctúria e sede excessiva. Os exames laboratoriais demonstraram: volume urinário de 9.000 ml; osmolaridade plasmática = 298 mOsm/kg; sódio plasmático = 145 mEq/l; osmolaridade urinária = 90 mOsm/kg, sem resposta ao teste de restrição hídrica, mas com aumento da osmolaridade urinária para 180 mOsm/kg após administração de vasopressina subcutânea. O diagnóstico mais provável é de:

- (A) *Diabetes mellitus*.
- (B) *Diabetes insipidus* nefrogênico.
- (C) *Diabetes insipidus* central.
- (D) polidipsia psicogênica.
- (E) insuficiência renal aguda.



46

Uma mulher de 18 anos de idade em amenorréia primária, com história de convulsões desde criança e tomando anticonvulsivantes, apresenta ao exame físico baixa estatura, obesidade, face de lua cheia, 4^o e 5^o metacarpianos curtos, nódulos subcutâneos sugestivos de calcificação, defeitos de formação dentária e catarata, além de ser predisposta a candidíase vaginal, segundo informações colhidas. A bioquímica mostra hipocalcemia, hiperfosfatemia e o PTH i muito alto. A hipótese diagnóstica é:

- (A) pseudo-hipoparatiroidismo.
- (B) Síndrome de Turner.
- (C) síndrome de ovários policísticos.
- (D) Síndrome de Cushing.
- (E) hipoparatiroidismo.

47

Um homem de 47 anos de idade sofre de dor abdominal intermitente e relata pancreatite aguda. Nega alcoolismo. Apresenta níveis de triglicerídeos de 3.900 mg/dl e hiperlipoproteinemia do tipo V. Neste caso, espera-se encontrar os sinais abaixo, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) Obesidade.
- (B) Plasma leitoso.
- (C) Lipemia retiniana.
- (D) Xantomas eruptivos.
- (E) Xantomas tendinosos.

48

Paciente de 17 anos de idade queixa-se de crises paroxísticas de hipertensão arterial e diarreia crônica. Em sua história familiar, refere uma tia materna com feocromocitoma. Ao exame físico, apresenta nódulo tireoideano, sólido e indolor. O diagnóstico mais provável é:

- (A) adenoma folicular de tireóide.
- (B) sarcoma tireoideano.
- (C) carcinoma anaplásico de tireóide.
- (D) carcinoma medular de tireóide.
- (E) carcinoma papilífero de tireóide.

49

A reposição de hormônios tireoideanos é procedimento fundamental no tratamento do coma mixedematoso. Esta medida, entretanto, requer cuidados terapêuticos adicionais visando a prevenir a ocorrência de:

- (A) *Diabetes insipidus* nefrogênico.
- (B) insuficiência adrenal aguda.
- (C) coma hiperosmolar não cetoacidótico.
- (D) ovulações múltiplas.
- (E) priapismo.

50

Uma mulher com 22 anos, normotensa, apresenta hirsutismo, virilização progressiva e alterações menstruais. As dosagens hormonais de sulfato de deidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona e 17OH-progesterona mostram-se muito elevadas. A tomografia computadorizada mostrou adrenais aumentadas. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- (A) Síndrome de Cushing.
- (B) doença dos ovários policísticos.
- (C) uso crônico de corticosteróides.
- (D) hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase.
- (E) hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 17 α -hidroxilase.