

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**PROCESSO SELETIVO**

PROVA PARA CARGO DE:

**MÉDICO - PSF**

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 14 questões ESPECÍFICAS
- 06 questões de PORTUGUÊS

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/01/2010, no final da tarde.

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

**Data: 10 de Janeiro de 2010.**

## **PARTE I - MÉDICO**

01 - Quanto ao paracetamol, uma das alternativas abaixo não está correta:

- A) Em doses terapêuticas tem excelente eficácia antiinflamatória;
- B) O antídoto para uma intoxicação por esta droga é a N-acetilcisteína.
- C) É considerada o agente de escolha como antipirético, sendo seguro em doses terapêuticas.
- D) A hepatotoxicidade é rara em doses terapêuticas.
- E) pode ser usado em todas as faixas etárias sendo o mais indicado em puérperas.

02 - Quanto à dipirona todas as afirmativas estão corretas, exceto:

- A) Sonolência, cansaço e cefaléia constituem possíveis efeitos adversos.
- B) A solução de dipirona sódica pode ser administrada, com segurança, juntamente com outros medicamentos injetáveis sendo praticamente inexistente a possibilidade de incompatibilidade.
- C) Reduz a eficácia terapêutica anti-hipertensiva e o efeito diurético de diuréticos tiazídicos.
- D) Aumenta o risco de hipoglicemia das sulfoniluréias.
- E) A combinação de dipirona com antiespasmódicos não melhora sua eficácia.

03 - As penicilinas cobrem o tratamento específico da maioria das infecções correntes. Quanto a estes antibióticos está correto afirmar que:

- A) O medicamento de escolha para a profilaxia oral da endocardite infecciosa em procedimentos dentários é a ampicilina.
- B) A ampicilina oral tem absorção oral mais completa e atinge o pico sérico mais rapidamente que a amoxicilina.
- C) Distribuem-se amplamente no organismo, exceto no sistema nervoso central; exceto quando as meninges estão inflamadas, quando então há penetração.
- D) Quando houver melhora dos sintomas infecciosos após as primeiras doses o tratamento pode ser encurtado e interrompido antes do final.
- E) O uso concomitante de contraceptivos orais com ampicilina não diminui a efetividade do contraceptivo.

04 - Não está correto indicar a benzilpenicilina benzatina:

- A) Na profilaxia da febre reumática, por via intramuscular profunda, a cada quatro semanas.
- B) Na sífilis primária, 2.400.000 UI, por via intramuscular profunda, dose única. Aplicar em dois sítios.
- C) Nas faringites estreptocócicas - 1.200.000 UI, por via intra-muscular profunda em dose única.
- D) Na sífilis tardia - 1.200.000 UI, por via intramuscular profunda, uma vez por semana, durante seis semanas.
- E) Na sífilis tardia, 2.400.000 UI - aplicar em dois sítios - uma vez por semana - por via intramuscular profunda durante três semanas.

05 - Quando se prescreve um medicamento a uma gestante, deve-se ter em mente que o feto é um potencial receptor do mesmo. Pelo risco de poder causar dano ou morte ao feto, em qualquer fase da gravidez o uso é contra-indicado:

- A) Cloridrato de amitriptilina.
- B) Cloridrato de prometazina.
- C) Mebendazol.
- D) Praziquantel.
- E) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

06 - Uma das principais vantagens da azitromicina é ser captada em grandes quantidades pelos tecidos e depois liberada, lentamente, nos dias subsequentes. Assim, um período de tratamento de cinco dias, por via oral resulta em nível sanguíneo terapêutico por até:

- A) cinco dias;
- B) uma semana;
- C) dez dias;
- D) 20 dias;
- E) nenhuma resposta está correta.

07 - Constituem sintomas e sinais de hipertireoidismo, exceto:

- A) Palpitações; tremores; perda de cabelo.
- B) Aumento do número de evacuações; sede e poliúria; osteoporose.
- C) Dispnéia; perda de peso; aumento do apetite.
- D) Constipação; derrame pleural; menorragia; insuficiência cardíaca congestiva.
- E) Fadiga; intolerância ao calor; psicose.

08 - No tratamento empírico das PAC - pneumonias adquiridas na comunidade - podem ser utilizados, ambulatorialmente, beta-lactâmicos ou macrolídeos ou fluorquinolonas respiratórias. Uma das escolhas abaixo não está correta:

- A) Quando houver forte suspeita de atípicos-macrolídeos ou fluorquinolona.
- B) Quando houver forte suspeita de pneumococo-fluorquinolona.
- C) Quando houver forte suspeita de co-morbidade-amoxicilina com clavulanato ou fluorquinolona.
- D) Quando houver forte suspeita de S. pneumoniae-amoxicilina com clavulanato ou quinolona.
- E) Quando houver forte suspeita de resistência elevada do S. pneumoniae - fluorquinolona respiratória.

09 - Para esquemas terapêuticos da cistite na mulher idosa e no paciente diabético constitui(m) alternativa(s) terapêutica(s) de menor eficácia:

- A) cefalexina; amoxicilina.
- B) norfloxacin.
- C) ciprofloxacino; lomefloxacino.
- D) cotrimoxazol; levofloxacino.
- E) nitrofurantoína.

10 - No tratamento empírico da cistite comunitária não complicada na mulher jovem, não é verdadeiro afirmar que:

- A) O ácido pipemídico tem boa eficácia e mínimos efeitos colaterais mas deve ser mantido por dez dias.
- B) Em mulher jovem com episódio ocasional de infecção urinária não complicada, o tratamento rápido em dose única com ciprofloxacino, proporciona índice de cura acima de 90%.
- C) O moxifloxacino não é recomendado por não atingir concentrações adequadas nas vias urinárias.
- D) O tratamento com duração de três dias tem eficácia inferior ao emprego das drogas por tempo mais prolongado, seja de cinco, de sete ou de dez dias.
- E) Se houver suspeita de gravidez não usar quinolonas.

11 - Constitue complicação purulenta da faringoamigdalite por *S.pyogenes*:

- A) febre reumática.
- B) eritema nodoso.
- C) coréia.
- D) púrpura de Henoch-Shoenlein.
- E) abscesso retrofaringeo.

12 - No tratamento da erisipela está contra-indicado(a) por não haver concentração no tecido linfático e na derme profunda :

- A) penicilina benzatina.
- B) penicilina procainada.
- C) amoxicilina oral.
- D) macrolídeo
- E) cefalosporina.

13 - O hemograma é um exame indispensável na leishmaniose visceral. Entre suas alterações, nesta afecção, não se encontra (m):

- A) todas as respostas estão corretas.
- B) leucocitose com neutropenia.
- C) eosinofilia.
- D) plaquetas ,geralmente, acima de 150.000 por mm
- E) anemia hipocromica e macrocítica.

14 - Em predispostos: broncoespasmo e bradiarritmias são riscos de emprego mais importantes relacionados com o uso de:

- A) antagonistas do sistema renina-angiotensina.
- B) antagonistas adrenérgicos beta-bloqueadores não seletivos.
- C) diuréticos tiazídicos.
- D) antagonistas do cálcio.
- E) diuréticos de alça.

## PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte:

A noção dos Direitos Humanos está totalmente ligada ao contexto de cada época. Quando não havia escrita e a fala humana ainda se estruturava com sons guturais, primitivos, os “direitos humanos” eram inexistentes como conceito e como prática: a luta pela sobrevivência era bruta, dura, e favorecia os mais fortes. E assim foi, durante séculos.

O princípio cristão do amor ao próximo, nesse processo, representou uma revolução cultural, uma radical novidade (o que não impediu que seu arauto terminasse condenado à morte, e morte na cruz, a mais terrível!). Mas a idéia mais elaborada, doutrinária, dos seres humanos como iguais e, portanto, com os mesmos direitos, é um resultado da luta da burguesia contra o obscurantismo dos senhores feudais e da aristocracia absolutista. Já na Declaração de Independência Norte-Americana, de 1776, os seres humanos eram considerados “naturalmente iguais, livres e independentes”. Uma novidade!

Essas idéias novas, afirmativas de direitos e de um original entendimento do humano, foram elaboradas teoricamente com mais detalhes pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, lançada em 26 de agosto de 1789. Em síntese, ela reafirma que “todos os homens são iguais perante a lei” e que “a lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão daqueles que governam” – o que o Absolutismo considerava impensável!

(Chico Alencar. **Direitos mais humanos**. Rio de Janeiro: Garamond, p. 21, com adaptações.)

15 - Das afirmações seguintes com relação as idéias do texto:

I – A construção dos Direitos Humanos foi lento e decorreu da luta da burguesia contra a opressão.

II – A noção de Direitos Humanos é universal e imutável.

III – Os senhores feudais e a aristocracia elaboraram a doutrina dos Direitos Humanos.

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas o item I está correto.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

16 - Das afirmações referentes ao texto:

I – Contextualmente, a palavra “humano” (3º parágrafo) é um substantivo.

II – A palavra “arauto” (2º parágrafo) está sendo utilizada no texto com o sentido de “portador de mensagens”.

III – A expressão “nesse processo” (2º parágrafo) refere-se a uma idéia implícita no parágrafo anterior.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Estão corretas apenas I e II.
- D) Está correta apenas a III.
- E) Estão corretas apenas I e III.

17 - Marque a opção em que o fonema /Z/ é representado pela letra X em todas as palavras.

- A) e\_\_ecutante, de\_\_erção, apra\_\_ível
- B) resc\_\_ão, ra\_\_oável, ane\_\_ação
- C) e\_\_oneração, e\_\_orbitante, e\_\_iguidade
- D) e\_\_igibilidade, e\_\_tinto, cláu\_\_ula
- E) má\_\_imo, e\_\_clusão, pre\_\_unção

18 - Assinale a alternativa em que o elemento grifado Q é vogal de ligação.

- A) faço
- B) cerebrozinho
- C) opor
- D) alunos
- E) cartografia

19 - Nas três orações do período seguinte, os predicados são, respectivamente:

“É possível que cheguemos cansados, mas isso não impossibilitará a realização do encontro”.

- A) nominal / verbo-nominal / verbal
- B) nominal / verbal / verbal
- C) verbal / verbo-nominal / nominal
- D) nominal / nominal / verbal
- E) verbo-nominal / verbo-nominal / verbal

20 - Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

“Maria estava \_\_\_\_\_ irritada e, à \_\_\_\_\_ voz, porém com \_\_\_\_\_ razões, dizia \_\_\_\_\_ desaforos”.

- A) meia – meia – bastantes – bastante
- B) meio – meia – bastantes – bastantes
- C) meio – meia – bastante – bastante
- D) meia – meia – bastantes – bastantes
- E) meia – meia – bastante – bastante