

Caderno de Prova

E11

Médico (Terapia Intensiva)

Dia: 21 de fevereiro de 2010 • Horário: das 15 às 18 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://hu.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Texto

O extraordinário sucesso do programa criado por Zilda Arns, em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella, é inversamente proporcional à complexidade de seus métodos. O trabalho da Pastoral da Criança, pelo qual ela recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel, se baseia na adoção, por parte das mães, de medidas simples, mas que podem salvar a vida de seus filhos. A aplicação do soro caseiro (duas colheres de sopa de açúcar e uma de sal dissolvidas em 1 litro de água limpa) em crianças desidratadas e a ingestão da multimistura (farinha que aproveita folhas e grãos) para combater a desnutrição, por exemplo, são métodos de eficácia comprovada há muito tempo. O mérito da Pastoral foi fazer com que **chegassem** a quem precisa. Para isso, o programa se vale do trabalho voluntário – **que** elimina a logística e os gastos envolvidos em pagamentos e outras burocracias – e de uma metodologia antiassistencialista, que ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que **o** faça. O baixo custo da ação é outro dado surpreendente. O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real. A representante do Unicef no Brasil, Marie-Pierre Poirier, avalia: “O Brasil foi um dos países que tiveram maior redução na mortalidade infantil nos últimos vinte anos. O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”.

Simple, barato e eficiente. *Veja*, São Paulo: Abril, ed. 2148, ano 43, nº 3, p. 87, 20 jan. 2010.

Com base no texto e, principalmente, em seu primeiro período, transcrito abaixo, resolva as questões 1, 2, 3 e 4, que seguem, assinalando a alternativa **correta** para cada uma.

“O **extraordinário** sucesso do programa criado por Zilda Arns, **em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella**, é inversamente proporcional à complexidade de **seus** métodos.”

1. Assinale a alternativa que interpreta **corretamente** este primeiro período.
 - a. () Somente um programa com a alta complexidade metodológica daquele criado por Zilda Arns poderia obter sucesso.
 - b. (X) A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito menor do que o sucesso por ele alcançado.
 - c. () O programa criado por Zilda Arns é tão complicado metodologicamente quanto o tamanho do sucesso por ele alcançado.
 - d. () O programa criado por Zilda Arns tem enorme sucesso devido à alta complexidade de seus métodos.
 - e. () A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito maior do que o sucesso por ele alcançado.

2. Analise o texto abaixo:

O adjetivo “extraordinário”, destacado no período, poderia ser substituído por sem prejuízo gramatical ou de sentido.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () mágico
- b. () inaceitável
- c. () inexplicável
- d. (X) excepcional
- e. () superestimado

3. O pronome “seus”, em “à complexidade de seus métodos”, refere-se a:

- a. () sucesso.
- b. (X) programa.
- c. () Zilda Arns.
- d. () complexidade.
- e. () o arcebispo de Salvador.

4. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O programa desenvolvido por Zilda Arns mostra que ela foi uma cientista renomada.
- b. () Zilda Arns e dom Geraldo Majella foram indicados ao Prêmio Nobel.
- c. () Zilda Arns desenvolveu sozinha o programa da Pastoral da Criança.
- d. () Zilda Arns foi agraciada com o Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.
- e. (X) Zilda Arns recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.

5. Com relação à regência verbal e à regência nominal, assinale com (C) as frases corretas e com (E) as erradas.

- () Garoto, ajude a seu pai, por favor!
- () A mãe da moça pediu permissão para assistir ao parto.
- () A enfermeira assistiu o cirurgião durante o procedimento.
- () O Papa atendeu os peregrinos.
- () Aquele médico é contrário ao aborto.
- () Aquele empresário tem bens avaliáveis de 3 milhões.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () C – C – E – E – C – C
- b. () C – E – C – C – E – E
- c. () C – E – C – E – C – C
- d. (X) E – C – C – C – C – E
- e. () E – C – E – C – E – C

6. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- 1. O programa criado por Zilda Arns se baseia na adoção de medidas simples para combater a desidratação e a desnutrição.
- 2. Para combater a desnutrição, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão do soro caseiro.
- 3. Para combater a desidratação, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão da multimistura.
- 4. Na frase, sublinhada no texto, “mas que podem salvar a vida de **seus** filhos”, o pronome **seus** refere-se a “mães”.
- 5. A eficácia do programa criado por Zilda Arns é sustentada por dois pilares: trabalho voluntário e metodologia antiassistencialista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () Estão corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

7. Com base no texto, assinale a alternativa **correta**.

Em “O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por:

- a. (X) isso.
- b. () nós.
- c. () ele.
- d. () aquilo.
- e. () as crianças.

8. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente.

- a. () porisso –paralisia – calterização– chapéis
- b. () anorecsia – pedestre – ximpanzé – assepcia
- c. (X) assepsia – acefalia –poluição – mercurocromo
- d. () hidropisia –húmido – paíz – beneficente
- e. () excessão – ultravioleta – diaguinóstico – cancerígeno

9. Escreva (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () O verbo “**chegassem**” refere-se a (ou tem como sujeito) “métodos de eficácia comprovada”.
- () O pronome relativo **que**, em “ – **que** elimina a logística e os gastos...” refere-se a (ou substitui) “programa”.
- () Na frase “em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que o faça”, a forma pronominal **las** está substituindo “as mães”.
- () Na oração “que **o** faça”, **o** é um pronome que está substituindo “cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos”.
- () Na oração “**que** ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos...”, o pronome relativo **que** refere-se (ou substitui) “metodologia antiassistencialista”.
- () As palavras **extraordinário**, **eficácia** e **água** são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – V – V
- b. () F – V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – V – F
- d. () F – F – V – F – F – F
- e. (X) V – F – V – V – V – V

10. Assinale a alternativa **correta**.

Se na frase “O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real” substituíssemos **gasto** por **gastos** e **1,70** por **3,00**, a frase ficaria assim:

- a. () Os gastos mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.
- b. () Os gastos mensais com cada crianças das Pastorais é de apenas 3.00 real.
- c. (X) Os gastos mensais com cada criança da Pastoral são de apenas 3,00 reais.
- d. () Os gastos mensais com cada criança das Pastorais é de apenas 3,00 reais.
- e. () Os gastos por mês com uma só criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.

11. Com relação à concordância nominal, assinale com (C) as frases corretas e com (E) as erradas.

- () Vossa Excelência está certa. (dirigindo-se a um homem)
- () As cópias seguem anexas.
- () Os alunos estavam quite com a tesouraria da escola.
- () Juliana adora vestidos salmão.
- () Paulo prefere ternos azul-marinho.
- () A garota chegou meia cansada da viagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) E – C – E – C – C – E
- b. () E – E – C – E – C – C
- c. () E – E – E – C – C – C
- d. () C – C – C – C – E – C
- e. () C – C – C – E – E – E

12. Assinale a alternativa em que as opções 1. e 2. são igualmente **corretas** em relação à concordância verbal.

- a. () 1. O autor do livro é eu.
2. O que se procurava eram livros raros.
- b. () 1. É proibido fumar neste recinto.
2. Ginástica matinal é boa para a saúde.
- c. (X) 1. Eu e Paula chegamos muito cedo.
2. Pediatras são exemplo de paciência.
- d. () 1. Passear, ler e dormir era tudo o que planejava para as férias.
2. Rir e chorar faz parte da vida.
- e. () 1. Somente 10% das ruas da cidade não ficaram alagadas.
2. Dos funcionários, 20% não conseguiu chegar ao trabalho.

13. Leia atentamente as proposições abaixo.

1. A relação dos aprovados
no anexo.
2. O preço dos cereais sofrer
novo aumento.
3. As encomendas para a grande festa já
..... chegando.
4. Foi para julho o início das
férias de inverno.
5. Prometemos encontrar no bar do
clube.
6. O governador deixou a
sua discordância.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. (X) está ; deve ; estão ; marcado ; nos ; clara
- b. () estão ; devem ; está ; marcada ; se ; claro
- c. () estão ; deve ; está ; marcadas ; lhe ; claramente
- d. () consta ; deverão ; vão ; estabelecido ; lhes ; óbvia
- e. () aparece ; vão ; estão ; marcado ; a ; evidente

14. Assinale a alternativa **correta** em relação ao uso da crase.

- a. () A chegada estava prevista para às 20 horas.
- b. () Chegou à Brasília, vindo de Roma.
- c. () Apesar de gostar de andar à pé, preferiu pegar um ônibus.
- d. () Apesar do grande tumulto, a polícia ficou à distância.
- e. (X) Foi a Washington e não fez uma visita à Casa Branca!

15. Ordene numericamente (de 1 a 4) os fragmentos abaixo, de forma que constituam um texto coeso e coerente.

Adaptado de Terapia do Riso. *Seleções*. Reader's Digest, jan. 2010, pg 33.

- () Todos os participantes do estudo tomaram os medicamentos comuns da diabete, mas os que também assistiram a 30 minutos de comédia por dia apresentaram melhora dos fatores de risco cardiovascular.
- () Portanto, comece a praticar as gargalhadas.
- () De acordo com um estudo americano, assistir a filmes engraçados pode ajudar as pessoas com diabete a reduzir o estresse e a reação inflamatória e a melhorar o nível de colesterol.
- () Embora vários outros estudos tenham sido muito pequenos, sabemos com certeza que rir não faz mal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4
- b. () 1 – 4 – 2 – 3
- c. () 2 – 3 – 1 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 1 – 4 – 2

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Um paciente com queixa de cefaleia há dois dias dá entrada no hospital por apresentar nas últimas horas sonolência, diminuição de força à direita, náuseas e vômitos. Na admissão apresentava GCS = 2 + 1 + 5 = 8, hemiparesia direita, pupilas mióticas, puntiformes e ausência de rigidez de nuca. TC de crânio realizada 20 horas após a admissão não mostrou anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- a. () Síndrome de Menière.
- b. () Aneurisma de carótica interna direita.
- c. (X) Acidente vascular encefálico, isquêmico de tronco cerebral.
- d. () Acidente vascular encefálico, hemorrágico de hemisfério cerebral direito.
- e. () Acidente vascular encefálico, isquêmico de hemisfério cerebral direito.

17. Em qual das situações abaixo estão indicados, inquestionavelmente, hemoderivados?

- a. () Plaquetopenia com plaquetas de 55.000/mm³, mesmo sem evidência de sangramento.
- b. (X) Anemia, com hemoglobina sérica < 7,0 g% em paciente com instabilidade hemodinâmica.
- c. () Anemia, com hemoglobina sérica < 9,0 g% em paciente sob ventilação mecânica e instabilidade hemodinâmica.
- d. () Anemia com hemoglobina < 10,0 g% em paciente hemodinamicamente estável e cardiopata.
- e. () Leucopenia com leucócitos < 2.000/mm³, em paciente febril.

18. Qual distúrbio fisiopatológico é característico da síndrome cardiopulmonar no paciente com hantavirose?

- a. () Atelectasia difusa.
- b. () Fibrose pulmonar aguda.
- c. (X) Hipertensão pulmonar severa.
- d. () Derrame pleural bilateral precoce.
- e. () Diminuição da resistência vascular pulmonar.

19. Paciente de 45 anos dá entrada na emergência em coma, sem história clínica disponível; teria saído de casa para o trabalho pela manhã e é encontrado inconsciente, com rigidez de nuca e sem sinais de lateralização.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável.

- a. () AVC hemorrágico.
- b. () Meningite tuberculosa.
- c. () Glioblastoma multiforme.
- d. (X) Hemorragia subaracnoidea.
- e. () Meningoencefalite herpética.

20. Num paciente asmático, sob ventilação mecânica, com resistência das vias aéreas elevadas (>60 cmH₂O/L/s), não responsivo à terapia habitual, incluindo sedação com propofol e ketamina, qual medida pode ser implementada?

- a. () Drenagem pericardica.
- b. () Drenagem pleural bilateral.
- c. () Bloqueio radicular com marcaina.
- d. () Sedação com morfina e uso de BNM (atracúrio).
- e. (X) Broncoscopia e lavagem bronquica com N-acetilcisteína.

21. Nas infecções graves em pacientes instáveis hemodinamicamente, o uso de antibióticos de amplo espectro pode ser necessário, antes mesmo da comprovação do sítio da infecção ou do agente etiológico.

Neste contexto, qual dos antibióticos abaixo **não** está indicado quando a suspeita recair sobre bactérias gram positivas?

- a. (X) aztreonam
 - b. () penicilina
 - c. () linezolida
 - d. () teicoplanina
 - e. () vancomicina
-

22. Qual medicação está indicada, em caráter de urgência, em paciente com choque anafilático em consequência de alergia a medicamentos?

- a. () lanexate
 - b. () nalorfina
 - c. () fenilefrina
 - d. (X) adrenalina
 - e. () meperidina
-

23. Qual a meta terapêutica, relacionada à ventilação mecânica nos pacientes previamente hígidos, com insuficiência respiratória, consequente à pneumonia comunitária grave e instabilidade hemodinâmica?

- a. () saturação arterial maior que 80%, saturação venosa central maior que 60% e paO_2 maior que 90 mmHg.
 - b. () saturação arterial maior que 80%, saturação venosa central maior que 80 e paO_2 maior que 80 mmHg.
 - c. (X) saturação arterial maior que 92%, saturação venosa central maior que 70% e paO_2 maior que 70 mmHg.
 - d. () saturação arterial maior que 92%, saturação venosa central maior que 85% e paO_2 maior que 50 mmHg.
 - e. () saturação arterial maior que 95%, saturação venosa central maior que 75% e paO_2 maior que 90 mmHg.
-

24. Em relação ao desmame da ventilação mecânica, é **incorreto** afirmar:

- a. () Nos pacientes com DPOC, a extubação deve ser precedida da normalização do pH, mas não necessariamente do nível arterial de CO_2 .
 - b. (X) A aplicação de protocolos de desmame sempre garante o sucesso na extubação, evitando falhas no desmame e reintubação.
 - c. () Nos pacientes asmáticos, com frequência a extubação deve ser tentada assim que resolvida a fase aguda da "crise de broncoespasmo", ainda que o paciente não se encontre totalmente compensado.
 - d. () Nos pacientes neurológicos, mesmo aqueles que não apresentam grande demanda de oxigênio e estando com diminuição do nível de consciência, a extubação precoce habitualmente não resulta exitosa.
 - e. () A extubação não deve ser realizada nos pacientes que mantenham arritmias graves, instabilidade hemodinâmica, necessitando de altas doses de drogas vasoativas e acidose metabólica severa, ainda que o índice de oxigenação tenha melhorado nas últimas horas.
-

25. São métodos utilizados para monitorização do DC:

- a. (X) Termodiluição com cateter de artéria pulmonar, bioimpedância elétrica torácica, PiCCO.
- b. () Termodiluição com cateter de artéria pulmonar, bioimpedância elétrica torácica, medida da pressão venosa central.
- c. () Termodiluição com cateter de artéria pulmonar, bioimpedância elétrica torácica, medida da pressão arterial média.
- d. () Termodiluição com cateter de artéria pulmonar, bioimpedância elétrica torácica, cálculo da resistência vascular sistêmica.
- e. () Termodiluição com cateter de artéria pulmonar, bioimpedância elétrica torácica, medida da variação da pressão de pulso.

26. Que porcentagem da superfície corporal está afetada em um paciente adulto com queimaduras de II e III graus em ambos os braços e região anterior do tronco?

- a. () 18%
 - b. () 20%
 - c. (X) 36%
 - d. () 50%
 - e. () 60%
-

27. Quanto ao afogamento, é **correto** afirmar:

- a. () A reposição volêmica deve ser feita com coloides.
 - b. () A alteração fisiopatológica mais importante é a aspiração de líquido.
 - c. () A lesão pulmonar é semelhante a da SARA, mas o tempo de recuperação é mais prolongado.
 - d. () A antibioticoterapia profilática está indicada para prevenção de pneumonia.
 - e. (X) A alteração fisiopatológica mais importante é a hipoxia.
-

28. A causa mais frequente de trombocitopenia no paciente crítico é:

- a. (X) Sepses.
 - b. () Perda sanguínea maciça.
 - c. () Trombocitopenia autoimune.
 - d. () Trombocitopenia induzida por heparina.
 - e. () Trombocitopenia induzida por medicamentos.
-

29. A transfusão de plaquetas está indicada em:

- a. () Síndrome hemolítico urêmica.
- b. () Plaquetopenia induzida por heparina.
- c. () Púrpura trombocitopênica idiopática.
- d. () Púrpura trombocitopênica trombótica.
- e. (X) Hemorragia ativa com plaquetas < 50.000/mm³.

30. Com relação ao suporte nutricional do doente grave com DPOC, é **correto** afirmar:

- a. () Os pacientes devem sempre receber dieta hipercalórica, pois são desnutridos e as calorias não interferem com a função respiratória.
 - b. (X) Os pacientes devem receber uma proporção menor de carboidratos como fonte de energia, devido à maior produção de CO₂ no processo de oxidação desse substrato e ao consequente aumento do trabalho respiratório.
 - c. () Os pacientes devem receber uma proporção menor de lipídios como fonte de energia, devido à maior produção de CO₂ no processo de oxidação desse substrato e ao consequente aumento do trabalho respiratório.
 - d. () Os pacientes devem receber uma proporção menor de proteínas como fonte de energia, devido à maior produção de CO₂ no processo de oxidação desse substrato e ao consequente aumento do trabalho respiratório.
 - e. () Os pacientes devem sempre receber dieta hiperproteica, pois são desnutridos e as proteínas não interferem com a função respiratória.
-

31. Um paciente masculino de 29 anos, agricultor, é trazido à emergência com história de crise convulsiva. Ao exame apresenta-se comatoso (ECG-7), miótico, sudoreico, com PA 110/70 mmHg, FC 51bpm e secreção esbranquiçada abundante no TOT após entubação.

Assinale a alternativa que indica o provável diagnóstico e a terapêutica adequada.

- a. () Intoxicação por opioides, tratar com naloxone.
- b. () Intoxicação por benzodiazepínico, tratar com flumazenil.
- c. () Intoxicação por paracetamol, tratar com N-acetilcisteína.
- d. (X) Intoxicação por organofosforado, tratar com atropina e contrathion.
- e. () Intoxicação por digitálico, tratar com fragmento FAB antidigoxina.

32. Com relação à insuficiência renal aguda (IRA), é **correto** afirmar:

- a. () A incidência de IRA na sepse é baixa, sendo devida geralmente a necrose tubular aguda.
- b. () Anúria ou oligúria são fundamentais para a suspeita diagnóstica de IRA.
- c. () Nos pacientes de UTI a principal causa de IRA pré-renal é o uso de medicação nefrotóxica.
- d. () As principais causas de IRA renal são doença prostática em homens e neoplasias ginecológicas em mulheres (pelve congelada).
- e. (X) A perda da função renal não é necessariamente acompanhada de anúria ou oligúria. Assim, apenas o aumento da creatinina plasmática em 50% ou o aumento absoluto de 0,3mg/dL é suficiente para o diagnóstico de IRA.

33. Considere um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica sob ventilação mecânica prolongada. Apresenta estabilidade hemodinâmica e critérios de desmame. Está recebendo midazolam 0.2 mg/kg/h e fentanil 1.5 ug/kg/h. Ao exame o Ramsay é de 3 com momentos 2 e 1, principalmente durante a fisioterapia, quando apresenta junto com agitação, sinais de desconforto, picos hipertensivos e taquicardia.

Assinale a alternativa que indica a melhor opção terapêutica no que concerne à sedoanalgesia desse paciente.

- a. () Fazer bolus de midazolam.
- b. () Aumentar a dose do fentanil.
- c. () Aumentar a dose do midazolam.
- d. (X) Associar clonidina e tentar diminuir progressivamente a dosagem de midazolam.
- e. () Associar ketamina e manter as demais dosagens das medicações sedoanalgésicas.

34. No que concerne aos sedoanalgésicos utilizados em UTI, pode-se afirmar:

- a. () O midazolam não possui metabólitos ativos.
- b. (X) A ketamina inibe a recaptação da noradrenalina circulante sendo, por esse motivo, uma excelente opção para os casos de choque.
- c. () A metadona causa síndrome de abstinência menos prolongada e mais acentuada que a morfina.
- d. () A síndrome de infusão do propofol é uma complicação frequente, sem relação direta com concentração plasmática da droga.
- e. () O fentanil é mais lipofílico e libera mais histamina que a morfina.

35. No que concerne ao tratamento do paciente com sepse grave, pode-se afirmar:

- a. (X) O controle da glicemia deve ser mantido abaixo de 150 mg/dl.
- b. () A infusão de coloides mostra vantagens em relação à de cristaloides.
- c. () A administração de antibióticos deve ser baseada exclusivamente no resultado das culturas.
- d. () A drotrecogina alfa comprovadamente diminui a mortalidade e está indicada para o tratamento dos pacientes com sepse.
- e. () A administração de corticosteroides é indicada para o controle da insuficiência adrenal relativa em todos os casos.

36. No que concerne ao tratamento de pacientes críticos terminais, pode-se afirmar:

- a. () As condutas de suspensão ou retirada de medicamentos são consideradas diferentes do ponto de vista ético-legal.
- b. () O médico intensivista pode recusar, mas jamais suspender, terapias fúteis.
- c. () O desmame terminal não é procedimento ético.
- d. (X) É ética a suspensão de medicamentos considerados fúteis.
- e. () A retirada de dieta enteral jamais pode ser considerada como ação paliativa na UTI.

37. No caso de parada cardiorrespiratória (PCR), pode-se afirmar:

- a. () Primeiro desfibrilar está indicado para até 7 minutos pós PCR.
 - b. (X) A avaliação do ritmo cardíaco deve ser efetuada a cada 5 ciclos (3-5 minutos).
 - c. () O uso de Amiodarona para a reanimação cardiorrespiratória (RCR) de PCR em fibrilação ventricular comprovadamente diminui a mortalidade.
 - d. () No caso da administração de medicação pelo tubo orotraqueal, a dose indicada é 1/3 da endovenosa.
 - e. () A dose máxima da amiodarona para a manutenção pós PCR é de 1.2 gr/24 h.
-

38. Sobre transplantes, é **correto** afirmar:

- a. () A legislação no Brasil obriga que os dois exames clínicos sejam efetuados por médico neurologista ou neurocirurgião.
- b. () A presença de atividade reflexa medular contraindica a abertura de protocolo.
- c. (X) A vasopressina é um fármaco promissor para a manutenção da pressão arterial de potenciais doadores.
- d. () A avaliação da atividade elétrica cerebral com doppler transcraniano é um dos exames complementares obrigatórios.
- e. () Em paciente potencial doador, sedado com midazolam, o primeiro exame clínico deve ser efetuado 3 horas após a suspensão da droga.

39. Sobre síndromes coronarianas agudas, é **correto** afirmar:

- a. (X) A troponina sérica é o marcador mais sensível e específico de necrose miocárdica.
 - b. () A elevação da mioglobina é mais precoce e mais específica para o diagnóstico de necrose miocárdica.
 - c. () Dosagens de CK total, aspartato-amino-transferase e desidrogenase láctica são importantes como marcadoras de necrose do miocárdio.
 - d. () As troponinas são importantes para o diagnóstico de reinfarto precoce.
 - e. () O aumento das troponinas, além de específico, é exclusivo de aterosclerose coronariana e infarto.
-

40. Assinale os critérios mais importantes para a avaliação da gravidade dos quadros de pancreatite aguda:

- a. () RX de abdômen, Proteína C reativa, Tomografia, APACHEII.
- b. () Proteína C reativa, RX de abdômen, APACHE II, Critérios de Ranson.
- c. () Critérios de Ranson, níveis séricos elevados de amilase, Tomografia, Proteína C reativa.
- d. () Critérios de Ranson, APACHE II, níveis séricos elevados de amilase, Tomografia.
- e. (X) Critérios de Ranson , APACHE II, Proteína C reativa, Tomografia.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.ufsc.br>