



acaplam®

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

CIR.DENTISTA-PSB

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

acaplam

PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA - PSB

01 - A Política a Política Nacional de Atenção à Saúde no Brasil, cujo princípio geral envolve um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, é corretamente denominada de:

- A) Política Nacional de Atenção Secundária.
- B) Política Nacional de Atenção Terciária.
- C) Política Nacional de Atenção Básica e de Referência.
- D) Política Nacional de Atenção Básica.
- E) Política Nacional de Atenção Básica e de Contra-Referência.

02 - Em relação às Equipes de Saúde Bucal (ESB), farão jus ao recebimento dos incentivos financeiros referentes, quantas equipes estiverem implantadas no SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica, desde que não ultrapassem o número existente de Equipes de Saúde da Família (ESF) e considerem a lógica de organização da Atenção Básica. Segundo este modelo organizacional as ESB são do tipo:

I - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 1: composta por no mínimo 1 cirurgião-dentista e 1 auxiliar de consultório dentário;

II - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 2: composta por no mínimo 1 cirurgião-dentista, 1 auxiliar de consultório dentário e 1 técnico de higiene dental.

III - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 3: composta por no mínimo 2 cirurgião-dentista, 2 auxiliar de consultório dentário e 2 técnico de higiene dental.

- A) Somente a alternativa I está correta.
- B) Somente a alternativa II está correta.
- C) Somente a alternativa III está correta.
- D) As alternativas I, II e III estão corretas, devido ao aumento do número de ESF.
- E) Somente as alternativas I e II estão corretas.

03 - Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal o princípio que requer responsabilidades da unidade ou serviço de saúde, como também de cada membro da equipe na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações eficazes e que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução, é corretamente denominado de:

- A) Vínculo.
- B) Ética.
- C) Acesso.
- D) Acolhimento.
- E) Responsabilidade Profissional Individual.

04 - Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor, recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações:

I - Exposição a flúor na água há menos de 5 anos.

II - CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade.

III - Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.

- A) As alternativas I, II e III estão corretas.
- B) Somente a alternativa I está correta.
- C) Somente a alternativa II está correta.
- D) Somente a alternativa III está correta.
- E) As alternativas I e II estão corretas.

05 - Procedimento cirúrgico onde uma parte da lesão, é removida para posterior estudo de suas características histológicas, sendo mais indicada para lesões de maiores dimensões:

- A) Biópsia Excisional.
- B) Biópsia Excisional interna.
- C) Biópsia Incisional.
- D) Biópsia Excisional externa.
- E) Biópsia Excisional interna ou externa.

06 - Considerando-se a cárie dentária, sabe-se que somente o tratamento restaurador da *cavidade de cárie* não garante o controle do processo da doença, sendo necessário intervir também sobre os seus determinantes para evitar novas cavidades e recidivas nas restaurações. Neste sentido deve-se estar atento a principais fatores de risco relacionados à doença cárie como:

- A) Fatores culturais e sócio-econômicos.
- B) Diabetes.
- C) Fumo.
- D) Etilismo.
- E) Imunodepressão e stress.

07 - Antes de encaminhar o paciente para o CEO, o dentista da UBS deverá verificar o potencial de reversão do processo patológico, realizando proteção pulpar direta ou indireta e/ou pulpotomia, aguardando período para acompanhar e avaliar vitalidade pulpar. Neste sentido, considera-se como Critério de Inclusão ao Tratamento Endodôntico:

- A) Dentes com envolvimento de furca grau 3 ou com doença periodontal severa.
- B) Dentes com perda de inserção que impossibilite sua manutenção na arcada.
- C) Necessidade de pulpotomias, inclusive nos casos de rizogênese incompleta com vitalidade pulpar.
- D) Preparo prévio do dente: remoção de tecido cariado, penetração desinfetante, curativo de demora e restauração provisória.
- E) Terceiros molares sem antagonista e com acesso restrito.

08 - Um paciente em tratamento na unidade básica, para ser encaminhado aos serviços especializados, deverá receber, minimamente, ações para controle da infecção bucal (adequação de meio bucal com remoção dos fatores retentivos de placa, restos radiculares, selamento de cavidades, instruções de higiene bucal, profilaxia, controle da placa supragengival). Como Critérios de Exclusão aos Procedimentos da Atenção Especializada em Periodontia, temos:

- A) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 6 mm.
- B) Necessidade de cirurgia periodontal com acesso.
- C) Necessidade de cirurgia pré-protética.
- D) Pacientes com bolsas periodontais de até 4mm.
- E) As alternativas B, C e D estão corretas.

09 - Condição hereditária clinicamente representada por uma área esbranquiçada difusa na mucosa bucal. É diagnosticado pelo exame físico de rotina, através de manobra clínica, quando ao se distender a mucosa, desaparece quase totalmente, retornando sua coloração normal após seu relaxamento. Corresponde a:

- A) Linha Alba.
- B) Leucoedema.
- C) Nevo Branco Esponjoso.
- D) Leucoplasia.
- E) Estomatite Nicotínica.

10 - Doença inflamatória crônica auto-imune, de causa desconhecida, que pode comprometer múltiplos órgãos e ou tecidos do organismo, principalmente as glândulas exócrinas lacrimais e salivares. Corresponde a:

- A) Xerostomia.
- B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- C) Doença de Chagas.
- D) Síndrome de Sjögren.
- E) Síndrome da Ardência Bucal.

11 - Ainda é o agente de primeira escolha no tratamento das candidoses vaginais, orais, faríngeas, esofágicas e intestinais. É também ativa contra *Trichophyton*, *Histoplasma* e *Microsporium*. Corresponde a:

- A) Nistatina.
- B) Miconazol.
- C) Aciclovir.
- D) Foscarnet.
- E) Fluconazol.

12 - Analgésicos não-opioides modificam mecanismos periféricos e centrais envolvidos no desenvolvimento da dor. Entre estes temos as seguintes opções:

- A) Paracetamol e Nalorfina.
- B) Ibupufreno e Nalorfina.
- C) Paracetamol e Ibupufreno.
- D) Ibupufreno e Naloxona.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

13 - Os fármacos com propriedades antimicrobianas constituíram-se em importante marco da terapêutica medicamentosa. No entanto, seu uso disseminado, muitas vezes desnecessário e impreciso, condicionou a chamada resistência microbiana. Neste sentido, constitui-se causa real e ou aparente de falha da terapia antimicrobiana:

- A) Ineficácia Microbiológica.
- B) Baixos níveis plasmáticos ou teciduais.
- C) Dificuldade de adesão do paciente à prescrição.
- D) Explicações alternativas para a febre e outras manifestações.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

14 - Grupo antimicrobiano bacteriostático capaz de provocar manchas marrons e hipoplasia de esmalte dental, proporcionais à quantidade total administrada. Corresponde a:

- A) Mais de uma das alternativas está correta.
- B) Tetraciclina.
- C) Doxiciclina.
- D) Minociclina.
- E) Clindamicina

15 - Uma anamnese adequada pode detectar pacientes com necessidades especiais. Entre estes, pode ser que um paciente com Endocardite Bacteriana compareça ao consultório odontológico. Este paciente pode então necessitar de uma profilaxia antibiótica, previamente ao seguinte procedimento odontológico:

- A) Aplicação de flúor.
- B) Radiografia.
- C) Esfoliação de dente decíduo.
- D) Anestesia local interligamentar.
- E) Moldagem.

16 - Na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida a imunocompetência do indivíduo diminui, favorecendo o aparecimento de um espectro de patologias orais e paraorais. Estas incluem infecções oportunistas virais, bacterianas e fungicas. Entre as infecções virais pode surgir:

- A) Herpes Simples.
- B) Cândídiase.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Gengivite.
- E) Periodontose.

17 - Em se tratando de cuidados odontológicos ao paciente diabético, deve-se eleger um anestésico sem efeito hiperglicemiante, principalmente quando o paciente não está compensado. Nesse sentido, deve-se evitar o uso de anestésico contendo adrenalina, como no caso de:

- A) Scandicaína a 3%.
- B) Mepivacaina a 3%.
- C) Carbocaina a 3%.
- D) Mepivacaina a 2%.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

18 - Inflamação da gengiva com relação a coroa de um dente com erupção incompleta, ocorrendo com maior frequência na área mandibular do terceiro molar.

- A) Gengivite.
- B) Periodontite localizada.
- C) Pricoronarite.
- D) Gengivoestomatite.
- E) GUNA.

19 - Tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. É composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. Corresponde a:

- A) Atenção Básica em Saúde.
- B) Estratégia Saúde da Família.
- C) Política Nacional de Saúde Bucal.
- D) Atenção Terciária em saúde.
- E) Vigilância em Saúde.

20 - Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Corresponde a:

- A) Vigilância em Saúde.
- B) Vigilância Epidemiológica.
- C) Vigilância Sanitária.
- D) Vigilância ambiental em saúde.
- E) Vigilância da saúde do trabalhador.

21 - Considerando a Norma Regulamentar - NR32 / Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos de Assistência à Saúde, sabe-se que “em todos os locais de trabalho onde se utilizem materiais pérfuro-cortantes, deve ser mantido recipiente apropriado para o seu descarte, conforme o estabelecido na NBR 13853, norma brasileira registrada no INMETRO. Outra Normatização refere-se a:

- A) O limite máximo de enchimento do recipiente deve estar localizado 20 cm abaixo do bocal.
- B) O recipiente deve ser mantido o mais distante possível da realização do procedimento.
- C) Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- D) O recipiente deve ser posicionado de forma que a abertura não possa ser visualizada pelos trabalhadores.
- E) É permitido o reencape de agulhas.

22 - Modelo Assistencial em saúde bucal que priorizou a atenção aos escolares do sistema público, introduzido na década de 50 pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), com enfoque curativo-reparador. Marcou o início da lógica organizativa e de programação para assistência odontológica, mas, com abrangência predominante a escolares de 6-14 anos. Introduz algumas medidas preventivas e, mais recentemente, pessoal auxiliar em trabalho a quatro mãos:

- A) Sistema Incremental.
- B) Odontologia Simplificada
- C) Programa Inversão da Atenção.
- D) Odontologia em Saúde Coletiva.
- E) Odontologia Integral.

23 - As aplicações tópicas de flúor são indicadas para pacientes com cárie ativa nas superfícies lisas e aqueles com alto risco de ocorrência da doença. Para realização deste procedimento um critério que deve ser seguido é:

- A) Adultos com CPO-D alto.
- B) Adolescente sem lesões de cárie ativa.
- C) Idosos com retração gengival.
- D) Crianças cujos molares deveriam, mas não podem ser selados.
- E) Mais de uma das alternativas está correta.

24 - A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de flúor é de 5 mg/kg. Ingestões inferiores a DPT resultam em:

- A) Mal-estar.
- B) Vômitos.
- C) Cólicas.
- D) Dor de cabeça eventual.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

25 - Sobre o uso dos fluoretos é possível concluir-se que:

- A) Os fluoretos presentes na cavidade bucal em pequenas concentrações diárias desempenham para a prevenção da cárie dentária.
- B) Em baixa concentração o fluoreto aumenta o pH da placa inibindo a produção de ácidos pelas bactérias da placa.
- C) A presença de fluoretos não interfere na aderência microbiana ao esmalte dentário.
- D) No contexto brasileiro não há necessidade da manutenção diária mínima de fluoretos na cavidade bucal.
- E) Os fluoretos presentes na cavidade bucal, em pequenas quantidades diárias, são suficientes para reduzir a remineralização do esmalte dentário.

26 - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Entre as seis prioridades pactuadas temos:

- A) Saúde da criança.
- B) Saúde do adulto.
- C) Saúde do adolescente.
- D) Saúde do Idoso.
- E) Saúde do trabalhador.

27 - Um levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal deve observar a seguinte consideração especial:

- A) Dentes não vitais não são codificados da mesma maneira que os dentes com vitalidade.
- B) Dentes com fratura incisal são incluídos como cariados.
- C) Dentes com extração indicada não são classificados como dentes perdidos.
- D) Em casos de dúvidas, o examinador deve utilizar o menor código.
- E) Se a sonda exploradora ficar “presa” em sulco ou fissura de molares, classificar como cariado.

28 - Os índices utilizados para se estudar sobre câncer de boca são os chamados “estudos de cálculos projetados”, baseados na pesquisa de mortalidade por câncer de boca, correlacionados com indicadores sócio-econômicos e Estimativas - Incidência de Câncer no Brasil. Os critérios utilizados para verificação dos índices são:

- A) Os resultados positivos de exames histopatológicos.
- B) A mortalidade e estimativa dos casos da doença para o ano seguinte.
- C) Os Tipos de câncer mais incidentes, estimados para o ano seguinte.
- D) A Distribuição de possíveis casos por quadriênio.
- E) O Número de casos diagnosticados de acordo com a localização da lesão primária.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

Sensatez e diálogo para resolver conflitos

Apesar dos índices assustadores da violência e do sensacionalismo dos meios de informação, os brasileiros têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem conflitos.

Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto, do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites.

A pesquisa intitulada **As Representações Sociais da Violência no DF**, segundo sua coordenadora, professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um progresso em termos do processo de civilização. Porém, Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas respostas, que há uma recusa à violência, mas também detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção bastante significativa, com destaque para a idéia de que, para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são próximos’, então o uso da violência é válido”.

A segurança privada é um fator que pode aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria Stela, “a proliferação da privatização da segurança confunde o que é público e o que é privado. Um segurança particular defende interesses particulares, que podem se opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”.

(Márcio Varela. A banalização da violência. **UnB Revista**, ano 1, nº 2, com adaptações.)

29 – Das afirmações seguintes:

I- De acordo com os meios de informação, a paz, a sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem conflitos.

II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF).

III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais violentos.

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.

30 – Das afirmações seguintes:

I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação justifica o emprego da violência.

II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da segurança privada e os da comunidade como um retrocesso no processo civilizatório.

III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias contidas no primeiro parágrafo do texto.

- A) Estão corretas II e III.
- B) Estão corretas I e III.
- C) Estão corretas II e III.
- D) Apenas I está correta.
- E) Todas estão corretas.

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / referente está incorreta.

- A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a “pesquisa intitulada As Representações Sociais da Violência no DF”.
- B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a “Departamento de Sociologia da UnB”.
- C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a “pesquisa intitulada As Representações Sociais da Violência no DF”.
- D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a “interesses particulares”.
- E) N. D. A.

32 – Assinale a alternativa com palavra grafada incorretamente:

- A) O deputado defendeu a discriminação da maconha.
- B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a todos.
- C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso.
- D) Os deputados não queriam acabar com os próprios privilégios.
- E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser resolvida nos tribunais.

33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da Universidade Católica foi em São Paulo o templo da música brasileira”.

No período acima, corretamente pontuado, há:

- A) 1 vírgula.
- B) 4 vírgulas.
- C) 2 vírgulas.
- D) Não há vírgulas.
- E) 3 vírgulas.

34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do acento grave, indicativo de crase, é:

- A) Preciso ir à Copacabana.
- B) Ele chegou à uma e meia.
- C) Seja rápido na sua ida à França.
- D) Nada mais confere legitimidade à Nação.
- E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à legislação ordinária.

35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao processo de formação, classifica-se como:

- A) derivação regressiva
- B) primitiva
- C) abreviação vocabular
- D) derivação imprópria
- E) hibridismo

36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse período há uma oração:

- A) substantiva predicativa
- B) adjetiva restritiva
- C) substantiva subjetiva
- D) coordenada sindética
- E) adjetiva explicativa

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função sintática do termo destacado na frase seguinte:

“O homem anseia por uma vida de liberdade”.

- A) adjunto adnominal
- B) objeto direto
- C) objeto indireto
- D) adjunto adnominal
- E) objeto direto preposicionado

38 – A alternativa que apresenta erro quanto à concordância verbal é:

- A) Deram quatro horas no relógio da central.
- B) São dificuldades a serem vencidas.
- C) Tudo estava bem, como se não houvessem ameaças.
- D) Eram dois irmãos bem parecidos.
- E) Só eles podem fazer tais exceções.

39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar chorando...”, do ponto de vista estilístico temos:

- A) antítese
- B) polissíndeto
- C) eufemismo
- D) ironia
- E) personificação

40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, respectivamente:

I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.

II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em Curitiba.

- A) a que – de que
- B) de que – cujo
- C) cujo – a que
- D) a que – cujo
- E) N. D. A.