

**QUESTÃO 01**

Sobre o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, analise as seguintes afirmativas:

1. O exame físico completo realizado em todas as consultas de puericultura constitui desperdício de tempo do clínico.
2. Segundo a OMS, é recomendável a realização de antropometria mensalmente nos seis primeiros meses de vida, e a partir daí, de dois em dois meses.
3. O hemograma deve ser realizado anualmente, a partir do primeiro ano de vida, para triagem de anemia ferropriva.

Está (ão) correta(s) apenas:

- A) 1
- B) 2
- C) 1 e 2
- D) 1 e 3
- E) 2 e 3

**QUESTÃO 02**

Em relação aos problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente, assinale a alternativa incorreta:

- A) A maioria das crianças apresenta refluxo gastroesofágico, mas a doença do refluxo só ocorre em menos de 1% destas crianças.
- B) A monilíase oral em crianças saudáveis, em geral, cura espontaneamente em algumas semanas, não necessitando de tratamento medicamentoso.
- C) A miliária deve ser tratada com pomadas locais à base de vaselina.
- D) Toda criança com diagnóstico de hérnia inguinal deve ser encaminhada para cirurgia o mais cedo possível.
- E) O tratamento de lesões de impetigo deve ser feito com antibióticos tópicos.

**QUESTÃO 03**

Sobre doenças próprias da infância, assinale a alternativa incorreta:

- A) O exantema da rubéola aparece inicialmente na face e espalha-se pelo corpo rapidamente no final do primeiro dia, normalmente não durando mais de três dias.
- B) A distribuição das lesões da varicela é normalmente centrípeta (mais no tronco que nas extremidades).
- C) O exantema súbito costuma iniciar com 3 a 4 dias de febre alta, que após este período cai rapidamente e é seguida por erupção cutânea que se inicia no tronco e se estende para o pescoço.
- D) A caxumba se caracteriza por inflamação das glândulas parótidas, que se apresentam edemaciadas, aquecidas e dolorosas à palpação.
- E) Embora seja uma doença com alta prioridade em saúde pública do ponto de vista global, o sarampo no Brasil é uma doença sob controle.

**QUESTÃO 04**

Sobre infecções respiratórias agudas em crianças, analise as seguintes afirmações:

1. O valor preditivo positivo da associação de taquipneia com tiragem subcostal é de aproximadamente 80% para o diagnóstico de pneumonia, o que dispensa a necessidade de investigação radiológica;
2. Os lactentes com menos de dois meses de idade e com diagnóstico de pneumonia devem ser encaminhados para tratamento hospitalar apenas se apresentarem febre associada à taquipneia e tiragem subcostal;
3. Os expectorantes e antitussígenos não demonstraram superioridade em relação ao placebo em estudos controlados.

Está (ão) correta(s) apenas:

- A) 1
- B) 3
- C) 1 e 2
- D) 2 e 3
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 05**

Em relação às doenças diarreicas na infância, assinale a alternativa correta:

- A) O sinal da dobra cutânea é o que mais se correlaciona com o grau de desidratação, seguido por alteração do estado mental, olhos fundos e mucosa oral seca.
- B) Medicamentos que diminuem os movimentos peristálticos, como a loperamida, devem ser utilizados nos casos de diarreia intensa, para prevenir o risco de desidratação.
- C) Como apenas metade dos casos de diarreia costumam ser autolimitados, é importante realizar avaliação diagnóstica para identificar o agente agressor.
- D) Os casos de desidratação leve devem ser tratados com Terapia de Reidratação Oral (TRO), enquanto os casos de desidratação moderada e grave exigem hidratação parenteral.
- E) A presença de vômitos exige interrupção imediata da TRO devido ao risco de broncoaspiração.

**QUESTÃO 06**

Sobre a abordagem da febre em crianças, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A combinação paracetamol-ibuprofeno em alternância a cada duas horas é indicada nos casos de febre resistente ao tratamento com uma só medicação;
- B) Crianças com idade entre 6 meses e 3 anos devem receber tratamento sintomático da febre devido ao risco de convulsão febril;
- C) A incidência de bacteremia aumenta com a magnitude da febre, o que indica necessidade de atenção maior para crianças que atingem temperaturas corporais mais elevadas.
- D) O resfriamento do corpo reduz a temperatura corporal, mas seu efeito não costuma ultrapassar 30 minutos.
- E) A aferição da temperatura axilar deve durar no mínimo cinco minutos para gerar resultados confiáveis.

**QUESTÃO 07**

Sobre a assistência ao pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa **correta**:

- A) A realização de USG a cada trimestre faz parte da rotina de pré-natal, com o objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade perinatal e materna.
- B) Na 10<sup>a</sup>. semana de gestação o útero normalmente é palpável na sínfise púbica.
- C) A presença de pressão arterial diastólica igual ou maior que 100 mmHg em qualquer aferição durante a gestação confirma o diagnóstico de hipertensão arterial na gestação.
- D) A ordenha de pequenas quantidades de leite materno deve ser orientada a partir da 32<sup>a</sup>. semana com o objetivo de preparar a mama para a amamentação.
- E) O ganho de peso de cada gestante é variável, e os limites são determinados individualmente, de acordo com o IMC.

**QUESTÃO 08**

Sobre a assistência ao pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O teste de Coombs indireto deve ser solicitado a todas as gestantes com Rh negativo e parceiro Rh positivo e/ou desconhecido, e resultados positivos devem ser encaminhados ao pré-natal de alto risco.
- B) Gestantes com história de 3 doses de vacinação antitetânica, sendo a última dose há menos de 10 anos não apresentam necessidade de vacinação durante o pré-natal.
- C) A suplementação de ferro (60mg/dia de ferro elementar) está indicada a partir da 20<sup>a</sup>. semana em todas as gestantes independente da presença de anemia.
- D) A presença de cilindros no sumário de urina estabelece indicação de encaminhamento ao pré-natal de alto risco.
- E) Pacientes com história de uso de drogas ilícitas, especialmente cocaína e crack, apresentam maior risco de descolamento prematuro da placenta, e devem ser acompanhadas cuidadosamente.

**QUESTÃO 09**

Sobre a prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **correta**:

- A) A presença de corrimento vaginal no momento da coleta de material para exame citopatológico do colo uterino pode comprometer a análise deste material. Por isso, todas as mulheres que apresentam corrimento no momento da coleta devem ser tratadas e em seguida retornar para nova coleta.
- B) A identificação de alterações inflamatórias no exame citopatológico indica sempre a necessidade de tratamento medicamentoso, de acordo com o agente patogênico identificado.
- C) A vaginose bacteriana, a tricomoníase e a candidíase são as DST mais frequentes entre a população feminina do Brasil.
- D) A ectopia da JEC (junção escamocolunar), ou “JEC visível” indica necessidade de colposcopia.
- E) O exame citopatológico deve ser realizado anualmente em todas as mulheres de 25 a 60 anos de idade, independente dos resultados de exames anteriores.

**QUESTÃO 10**

Sobre a prevenção do câncer de mama, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O exame clínico das mamas deve fazer parte da rotina de atendimento a todas as mulheres acima dos 40 anos de idade, com periodicidade anual.
- B) A mamografia deve ser solicitada para todas as mulheres acima dos 40 anos, de idade, com intervalo máximo de 2 anos entre os exames.
- C) O auto-exame das mamas não vem se mostrando efetivo em reduzir a mortalidade por câncer de mama quando utilizado de forma isolada.
- D) As mamografias que mostram resultado com BI-RADS=3 (provavelmente benigno) indicam necessidade de encaminhamento da paciente à unidade de referência, pois existe um risco de cerca de 2% de malignidade para estes casos.
- E) No exame clínico das mamas, a região da aréola e da papila (mamilo) deve ser apenas palpada, só havendo necessidade de compressão para investigar descarga papilar espontânea.

**QUESTÃO 11**

Sobre abordagem sindrômica das queixas ginecológicas, analise as seguintes alternativas:

1. A primeira opção para tratamento de sífilis é a Penicilina G Benzatina, 2.400.000 UI IM em dose única, sendo 1.200.000 UI em cada nádega.
2. Em mulheres com queixa de corrimento vaginal, a presença de critérios de risco para infecção cervical por clamídia ou gonococo é suficiente para indicar tratamento medicamentoso para estes agentes.
3. Todos os casos de vaginose bacteriana exigem tratamento do parceiro, pois o contato sexual com este pode desencadear recidivas.

Está (ão) correta(s) apenas:

- A) 1
- B) 3
- C) 1 e 2
- D) 2 e 3
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 12**

Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), analise as seguintes afirmações:

1. O diagnóstico de HAS deve ser confirmado quando a pressão arterial apresenta-se elevada em duas ocasiões distintas;
2. A radiografia simples de tórax faz parte da avaliação inicial de todos os pacientes que são diagnosticados com HAS;
3. Pacientes hipertensos com risco moderado pelo escore de Framingham associado à ausência de lesões em órgãos-alvo são classificados como de “risco moderado”.

Está (ão) incorreta(s) apenas

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 1 e 2
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 13**

Sobre o tratamento medicamentoso da HAS, assinale a alternativa incorreta:

- A) Deve ser respeitado um intervalo mínimo de quatro semanas, salvo ocasiões especiais, para alteração da dose de medicamentos, substituição de monoterapia ou mudança da associação de fármacos.
- B) Os diuréticos são a primeira opção de tratamento farmacológico na maioria dos hipertensos, e devem ser usados em monoterapia inicialmente.
- C) O propranolol tem dose mínima diária de 40mg para o tratamento da HAS, e não pode ser usado em pacientes com história de broncoespasmo.
- D) Em indivíduos com risco cardiovascular alto e em tratamento para HAS, está indicado o uso de aspirina profilática após o controle da PA.
- E) Os inibidores da ECA são indicados para os pacientes portadores de HAS associada a nefropatia diabética.

**QUESTÃO 14**

Sobre o Diabetes Mellitus, analise as seguintes afirmações:

1. O TTG (Teste oral de tolerância à glicose) está indicado apenas para os pacientes que apresentam glicemia de jejum alterada
2. A Hemoglobina Glicada (A1C) é um exame importante para o acompanhamento do paciente diabético, e deve ser solicitada a cada 3 meses até o controle glicêmico, e em seguida, a cada 6 meses.
3. O uso de alimentos “diet” isentos de sacarose auxilia a perda de peso nos indivíduos com sobrepeso ou obesos.

Está (ão) incorreta(s) apenas

- A) 1
- B) 3
- C) 1 e 2
- D) 2 e 3
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 15**

Em relação ao tratamento medicamentoso do Diabetes Mellitus, assinale a alternativa correta:

- A) O uso de insulina quando iniciado, não deve ser interrompido, pois está associado a maior redução dos desfechos combinados do diabetes que os hipoglicemiantes orais.
- B) As sulfoniurétricas provocam maior ganho de peso que a insulina.
- C) O uso de metformina em doses acima de 1,5g/dia pode produzir hipoglicemia.
- D) A hiperglicemia grave (>270mg/dl) é indicação para uso de insulina sem passar pela etapa inicial com metformina.
- E) O *clearance* de creatinina é o melhor marcador disponível para identificar indivíduos em risco de desenvolverem insuficiência renal.

**QUESTÃO 16**

Sobre a prevenção clínica das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, analise as seguintes afirmativas:

1. São indicadores de alto risco para estas doenças: infarto do miocárdio prévio, doença renal crônica e diabetes melito.
2. Para determinar o escore de Framingham são coletadas as seguintes informações sobre o paciente: idade, LDL-colesterol, HDL-colesterol, pressão arterial, diabetes e tabagismo.
3. Em indivíduos de menor risco, principalmente os mais jovens, o uso do AAS (Ácido acetil-salicílico) é bastante questionável, pois os benefícios se equiparam aos riscos.

Está (ão) incorreta(s) apenas

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 1 e 2
- E) 2 e 3

**QUESTÃO 17**

Sobre os problemas de pele, assinale a alternativa incorreta:

- A) A administração oral de cetoconazol é efetiva na maioria dos casos de dermatite seborreica.
- B) A remoção mecânica das lesões causadas pelo molusco contagioso está contraindicada, pois aumenta o risco de infecção secundária.
- C) A corticoterapia tópica é a primeira linha de tratamento tópico da dermatite atópica.
- D) É raramente necessário ou justificado o uso de corticoides sistêmicos na urticária crônica.
- E) A permetrina a 5% é o medicamento de primeira escolha para o tratamento da escabiose devido à sua eficácia, comodidade de uso e pouca toxicidade.

**QUESTÃO 18**

Em relação aos problemas digestivos, analise as seguintes afirmativas:

1. Os antiácidos são eficazes no controle dos sintomas da dispepsia funcional, e devem ter seu uso indicado durante o tratamento com inibidores da bomba de prótons.
2. Não há evidências científicas que demonstrem a eficácia de laxativos no manejo da constipação crônica.
3. A desvantagem da endoscopia digestiva alta para o diagnóstico da doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE) é a sua baixa sensibilidade, uma vez que em 40 a 50% dos pacientes com DRGE a endoscopia é normal.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) 1
- B) 2
- C) 1 e 2
- D) 2 e 3
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 19**

Em relação às doenças respiratórias no adulto, assinale a alternativa incorreta:

- A) O uso de anti-histamínicos pode aliviar os sintomas nasais no resfriado comum, especialmente nos pacientes portadores de rinite alérgica.
- B) Na gripe, as manifestações sistêmicas usualmente precedem as manifestações respiratórias.
- C) Os broncodilatadores de curta ação por via inalatória são a base do tratamento sintomático da DPOC.
- D) Na ausência de qualquer alteração dos sinais vitais (temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória) o diagnóstico de pneumonia é altamente improvável.
- E) A utilização precoce de corticoides sistêmicos nas crises asmáticas deve ser evitada.

**QUESTÃO 20**

Sobre problemas músculo-esqueléticos, assinale a alternativa correta:

- A) Na abordagem das lombalgias o exame físico completo deve ser realizado após o controle da dor.
- B) Os exames de imagem em geral não são necessários em pacientes com lombalgia aguda de evolução inferior a seis semanas.
- C) A fase aguda da dor lombar deve ser manejada com repouso no leito, com retorno gradual às atividades normais.
- D) Os benefícios do uso de relaxantes musculares associado aos analgésicos e antiinflamatórios é mais evidente no manejo da dor lombar crônica.
- E) O fator antinuclear (FAN) deve ser solicitado para os pacientes que apresentem dor articular localizada sem resposta ao tratamento com analgésicos/anti-inflamatórios.

**QUESTÃO 21**

Sobre detecção precoce de doenças no adulto, assinale a alternativa incorreta:

- A) Indivíduos com alto risco para câncer de cólon devem passar por pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente;
- B) O rastreamento para dislipidemias deve ser feito em todos os homens com 45 anos ou mais e mulheres com 55 anos ou mais, com dosagem de colesterol total sérico a cada 3 a 5 anos;
- C) O rastreamento de diabetes em indivíduos sem fatores de risco para doença cardiovascular através de glicemia de jejum só deve ser realizado a partir dos 45 anos de idade;
- D) A dosagem do antígeno prostático específico (PSA) deve ser realizada em todos os homens acima de 55 anos anualmente, como forma de reduzir a mortalidade por câncer de próstata.
- E) As medidas de altura, cintura e peso devem ser realizadas a cada 1 ou 2 anos em indivíduos com 18 anos ou mais.

**QUESTÃO 22**

Sobre a abordagem da depressão, analise as seguintes afirmativas:

1. Não há evidências de que os antidepressivos sejam superiores ao placebo nas depressões leves.
2. Embora a depressão seja um fator de risco para suicídio, perguntas sobre ideação suicida devem ser evitadas na abordagem inicial.
3. Não há diferença de eficácia entre as classes de fármacos antidepressivos.

Está(ão) correta(s) apenas

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 1 e 2
- E) 1 e 3

**QUESTÃO 23**

Em relação ao uso abusivo de substâncias, analise as seguintes afirmativas:

1. O aconselhamento em intervenções breves tende a ser tão efetivo quanto outros tipos de psicoterapia mais avançados, como a terapia cognitivo-comportamental.
2. Os benzodiazepínicos possuem ampla margem de segurança para superdosagem; assim, tentativas de suicídio com estas medicações, mesmo em doses elevadas, provocam apenas sonolência, letargia, ataxia, confusão e leve depressão dos sinais vitais.
3. Pacientes em uso abusivo de substâncias que apresentem suspeita de co-morbidade psiquiátrica podem ser encaminhados ao especialista no início do acompanhamento.

Estão corretas:

- A) 1, apenas
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2, apenas.

**QUESTÃO 24**

Sobre os transtornos do sono, assinale a alternativa incorreta:

- A) O uso de antidepressivos tricíclicos é uma alternativa aos benzodiazepínicos na necessidade de tratamentos prolongados da insônia.
- B) São queixas frequentes entre os portadores de insônia crônica: sonolência excessiva, fadiga, dificuldade de concentração e memória, depressão e dores musculares.
- C) A insônia pode ser um dos sintomas iniciais de depressão, por isso está indicada a investigação cautelosa de sinais de depressão em indivíduos com insônia.
- D) O uso por mais de uma semana de benzodiazepínicos para o tratamento da insônia produz apenas melhora dos sintomas e está associado a inúmeros casos de dependência a estas medicações, por isso deve ser evitado.
- E) Os sintomas de dependência de benzodiazepínicos costumam desaparecer entre duas a quatro semanas após a suspensão da medicação.

**QUESTÃO 25**

Sobre violência intrafamiliar, analise as seguintes afirmações:

1. O profissional de saúde é, por lei, obrigado a notificar ao Conselho Tutelar quando da suspeita ou comprovação de um caso de violência contra criança ou adolescente.
2. É importante que o profissional que atende à vítima de violência demonstre sua indignação com o caso, como forma de fortalecer o vínculo profissional-usuário.
3. A conduta frente a um caso de violência intrafamiliar deve ser tomada pelo profissional responsável pelo primeiro atendimento, evitando discussões em equipe, pois estas podem configurar quebra do sigilo do paciente.

Está(ão) incorreta(s) apenas

- A) 2
- B) 1 e 2
- C) 2 e 3
- D) 1 e 3
- E) 3

**QUESTÃO 26**

Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa incorreta:

- A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de saúde estão vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais.
- B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- C) Os estados e municípios devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
- D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
- E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição Federal.

**QUESTÃO 27**

Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica.
- B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública.
- D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados conveniados com o SUS.

**QUESTÃO 28**

“As ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):

- A) Educação permanente para o controle social.
- B) Promoção da equidade.
- C) Mobilização social em saúde.
- D) Educação Popular em Saúde.
- E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

**QUESTÃO 29**

Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 2011, exceto:

- A) Saúde do trabalhador.
- B) Saúde indígena.
- C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
- D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
- E) Saúde do homem.

**QUESTÃO 30**

Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, no Pacto pela Vida 2008, exceto:

- A) Taxa de internação por diabetes *mellitus* e suas complicações na população de 30 anos de idade e mais.
- B) Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.
- C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais e sete ou mais consultas de pré-natal.
- D) Percentual de crianças menores de cinco anos com vacinação em dia.
- E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.

**QUESTÃO 31**

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, exceto:

- A) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios.
- B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
- C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
- D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
- E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade com a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.

**QUESTÃO 32**

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a alternativa **incorreta**:

- A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- B) A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais seguimentos.
- C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- D) Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.
- E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder municipal legalmente constituído.

**QUESTÃO 33**

O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica de quais instrumentos?

- A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e Programação Pactuada Integrada.
- D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano Plurianual.
- E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Plano Plurianual.

**QUESTÃO 34**

Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de saúde do trabalhador abaixo, **exceto**:

- A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente do trabalho.

**QUESTÃO 35**

Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores do SUS?

- A) Municipalização.
- B) Universalização.
- C) Regionalização.
- D) Regulamentação.
- E) Hierarquização.

**QUESTÃO 36**

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do Sistema Único de Saúde:

- ( ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- ( ) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- ( ) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- ( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- ( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência **correta**, de cima para baixo:

- A) V, V, F, V, V, F
- B) F, V, F, V, F, V
- C) V, V, V, V, V, V
- D) F, F, V, F, F, F
- E) V, F, V, F, F, V

**QUESTÃO 37**

Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se constituem como a terceira maior causa de mortalidade na população geral.
- B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
- C) No conjunto da população, entre as causas externas, as principais causas de óbito foram por agressões, seguidas dos acidentes de transporte e quedas.
- D) Dentre as causas externas as agressões são as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os acidentes de transporte são predominantes entre crianças e idosos.
- E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro anos, os afogamentos.

**QUESTÃO 38**

Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de trabalho básicos da ação regulatória, **exceto**:

- A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos realizados pelos estabelecimentos executantes para os estabelecimentos solicitantes.
- B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
- C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou serviço de saúde.
- D) A execução da ação regulatória feita por profissional competente, capaz de análise crítica e discernimento que o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
- E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um sistema informatizado.

**QUESTÃO 39**

Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso da Atenção Básica?

- A) Norma Operacional Básica/1996.
- B) Norma Operacional Básica/1993.
- C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
- D) Norma Operacional Básica/1991.
- E) Pacto pela Saúde.

**QUESTÃO 40**

De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Participação Popular.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.

RAASCUNHO