Cargo: Plantonista SAMU / Nível Superior

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Para qual dos pacientes abaixo está indicado o uso de imunoglobulina antitetânica?

- A) Mulher de 30 anos que sofreu ferimento por arma de fogo em coxa direita e referia esquema vacinal completo durante pré-natal há 4 anos.
- B) Criança de 8 anos que foi mordida por um colega portador de retardo mental, sua mãe referia esquema vacinal no primeiro ano de vida.
- C) Homem de 50 anos que sofreu ferimento em mucosa oral após agressão física e não se recordava de vacinação antitetânica prévia.
- D) Mulher de 42 anos que sofreu ferida incisa na mão esquerda com faca de cortar carne e negava esquema vacinal prévio.
- E) Homem de 32 anos que sofreu esmagamento da perna esquerda por trator enquanto trabalhava na agricultura, com esquema vacinal atrasado, referindo último reforço há 12 anos.

QUESTÃO 02

Um paciente foi trazido para a emergência com quadro de intensa agitação psicomotora. Seus familiares suspeitam de intoxicação exógena. Ao exame físico está taquicárdico, hipertenso, febril, sudoréico, com pupilas dilatadas e mucosa oral ressecada. Das drogas abaixo, qual mais provavelmente está implicada neste caso?

- A) Cocaína
- B) Barbitúricos
- C) Meperidina
- D) Etanol
- E) Inseticida organofosforado.

QUESTÃO 03

Você é chamado para atender uma intercorrência na enfermaria e encontra o paciente em parada cardiorrespiratória com diagnóstico de atividade elétrica sem pulso. Ao exame físico chama a atenção estase jugular importante. Qual das medidas abaixo seria mais eficaz neste caso?

- A) Reposição volêmica vigorosa
- B) Bicarbonato de sódio
- C) Entubação orotraqueal e oxigenioterapia
- D) Infusão de solução de glicose hipertônica
- E) Pericardiocentese

QUESTÃO 04

Um paciente de 60 anos foi atendido na emergência com diarréia muco-sanguinolenta e febre há 3 dias. Negava vômitos, mas referia calafrios. Qual a droga mais adequada para o caso?

- A) Sulfametoxazol-trimetoprim
- B) Ampicilina
- C) Amoxicilina
- D) Ciprofloxacin
- E) Cefalexina

QUESTÃO 05

Em um paciente com cólica renal, qual das situações abaixo não é considerada indicação para litotripsia extracorpórea?

- A) Cálculos maiores que 10mm
- B) Cálculos em pelve renal ou ureter proximal
- C) Cálculo que não foi expelido após seis semanas
- D) Hidronefrose volumosa
- E) Cálculo de ácido úrico

QUESTÃO 06

Um paciente de 80anos, no segundo dia pós-operatório de artroplastia de quadril por fratura de colo de fêmur desenvolveu estado confusional agudo com déficit de atenção, desorganização do pensamento, flutuação do nível de consciência e episódios de agitação psicomotora. Dentre as medidas abaixo, qual *não* é adequada para este caso?

- A) Investigar a presença de retenção urinária e impactação fecal.
- B) Estimular a saída precoce do leito
- C) Administrar diazepam VO para controle da agitação psicomotora
- D) Administração de haloperidol em doses baixas.
- E) Realizar screening para infecção.

QUESTÃO 07

Um paciente portador de insuficiência cardíaca grave foi admitido em franco edema agudo de pulmão. Ao exame ele está consciente, com fácies de angústia, sudoreico, com cianose de extremidades e estase jugular. PA = 85x60mmHg e FC 100bpm. Qual das medicações abaixo seria adequada neste momento?

- A) Caverdilol
- B) Nitroglicerina
- C) Captopril
- D) Losartan
- E) Dobutamina

QUESTÃO 08

São medidas recomendadas para a fase precoce do tratamento da sepse grave todas as abaixo, *exceto*:

- A) Coleta de culturas
- B) Início precoce de antibioticoterapia de amplo espectro
- C) Dosagem de lactato
- D) Reposição de bicarbonato de sódio
- E) Uso de drogas vasoativas

Cargo: Plantonista SAMU / Nível Superior

QUESTÃO 09

Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, é *correto* afirmar que:

- A) A infusão endovenosa de insulina regular deve ser interrompida quando a glicemia alcançar valores abaixo de 250mg/dl.
- B) A infusão de bicarbonato de sódio só deve ser indicada quando o pH estiver abaixo de 7,0.
- C) Deve ser feita reposição de potássio desde o início, independente dos níveis séricos.
- D) A reposição volêmica é essencial e deve ser sempre realizada com soro fisiológico a 0,9%.
- E) A reposição de fosfato deve ser realizada sempre que os níveis séricos estiverem abaixo do limite inferior da normalidade.

QUESTÃO 10

Qual das drogas abaixo está associada à redução da mortalidade em pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta?

- A) Octreotide
- B) Omeprazol
- C) Propranolol
- D) Terlipressina
- E) Caverdilol

QUESTÃO 11

Em um paciente com insuficiência respiratória aguda são contra-indicações para a ventilação não-invasiva todas as abaixo, *exceto*:

- A) Coma
- B) Deformidade facial
- C) Acidose respiratória
- D) Edema agudo de pulmão
- E) Cirurgia esofágica recente

QUESTÃO 12

Qual dos pacientes abaixo <u>não</u> apresenta um choque distributivo?

- A) Paciente de 25 anos que sofreu traumatismo raquimedular após mergulho em piscina.
- B) Paciente de 40 anos que desenvolveu pneumotórax hipertensivo após trauma torácico em acidente automobilístico.
- C) Paciente de 50 anos que sofreu ataque por enxame de abelhas, com mais de 500 picadas.
- D) Paciente de 18 anos que desenvolveu choque e edema de glote após ingestão de crustáceo.
- E) Paciente de 38 anos em curso de pancreatite aguda grave.

QUESTÃO 13

Um adolescente foi trazido para a emergência com dispnéia intensa, iniciada após uso de ácido acetilsalicílico. Ao exame ele está consciente, acianótico, normotenso, com estridor laríngeo evidente. Qual a medicação de escolha neste momento?

- A) Adrenalina
- B) Prometazina
- C) Cimetidine
- D) Aminofilina
- E) Hidrocortisona

QUESTÃO 14

Em qual dos casos de insuficiência renal aguda a bioquímica urinária revelaria fração de excreção de uréia acima de 50% e sódio urinário maior que 40mEq/1?

- A) Um paciente cirrótico que evoluiu com oligo-anúria após episódio de peritonite bacteriana espontânea.
- B) Um paciente idoso admitido com vômitos e diarreia profusa há 24 horas.
- C) Um paciente que vinha usando amicacina para tratamento de infecção urinária.
- D) Um paciente no segundo dia de internamento por conta de pancreatite aguda grave.
- E) Um paciente que desenvolveu insuficiência renal aguda após uso de diclofenaco de sódio por três dias.

QUESTÃO 15

Qual a melhor conduta para o tratamento emergencial de um paciente com taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica?

- A) Lidocaína
- B) Cardioversão elétrica
- C) Amiodarona
- D) Verapamil
- E) Digoxina

QUESTÃO 16

Sobre o valor do D-dímero no diagnóstico do Tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa *incorreta*:

- A) Tem baixa especificidade.
- B) É especialmente útil nos casos com alta probabilidade clínica.
- C) Pode estar elevado em gestantes, pós-operatório e neoplasias, na ausência de trombose.
- D) O valor normal em idosos costuma ser maior que na população geral.
- E) Tem alta sensibilidade para o diagnóstico de embolias extensas.

QUESTÃO 17

Um paciente chegou à emergência com trauma fechado de abdome após acidente automobilístico. Assinale a alternativa *incorreta* sobre o caso:

- A) Nos casos em que o aspirado abdominal recupera mais de 10ml de sangue, há probabilidade de hemorragia acima de 90% intraperitoneal.
- B) A presença de mais de 100.000 hemácias/mm³ é indicação de laparotomia de urgência, independente do estado hemodinâmico do paciente.
- C) Pacientes hipotensos com fraturas pélvicas e lavado negativo devem ser investigados para a presença de hemorragia retroperitoneal.
- D) Em casos com ruptura diafragmática geralmente se indica cirurgia de urgência.
- E) Em casos com fratura de bacia, as lesões de bexiga são comuns, com líquido livre na cavidade pertoneal visto à USG.

QUESTÃO 18

Sobre a intubação orotraqueal de urgência, assinale a alternativa *incorreta*:

- A) Deve ser realizada em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, com escala de Glasgow menor que oito, para prevenir broncoaspiração.
- B) Pacientes que foram resgatados de incêndio, com inalação de fumaça, devem ser intubados precocemente.
- C) É essencial realizar radiografia de tórax após o procedimento, para checar o posicionamento do tubo, cuja extremidade deve estar localizada 2 a 6 cm acima da carina.
- D) Pacientes vítimas de overdose opioide com hipercapnia devem ser intubados em caráter de urgência.
- E) É a primeira medida a ser realizada no atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória.

QUESTÃO 19

Um paciente com quadro clínico de síndrome coronariana aguda realizou ECG que evidenciou supradesnivelamento de segmento ST nas derivações DI e aVL. Qual o diagnóstico?

- A) Infarto subendocárdico
- B) Infarto transmural da parede ântero-septal
- C) Infarto transmural da parede inferior
- D) Infarto transmural da parede lateral
- E) Angina instável

QUESTÃO 20

Qual a droga de escolha para tratamento de emergência hipertensiva em uma paciente no curso da 30^a semana de gestação previamente normotensa?

- A) Captopril
- B) Hidralazina
- C) Furosemida
- D) Nitroprussiato de sódio
- E) Losartan

Cargo: Plantonista SAMU / Nível Superior

QUESTÃO 21

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa *correta*:

- A) Os pacientes com colecistite alitiásica devem ser tratados clinicamente com antibióticos, sem indicação cirúrgica.
- B) O sinal de Murphy só é positivo em casos complicados com gangrena e perfuração da vesícula.
- C) Persistência de sintomas de cólica biliar por mais de seis horas é sinal sugestivo de colecisitite aguda.
- Pacientes diabéticos devem ser tratados com antibióticos na fase aguda, postergando a colecistectomia para quatro a oito semanas depois.
- E) O esquema antibiótico deve incluir cobertura para anaeróbios com metronidazol em todos os casos.

QUESTÃO 22

Qual das vitaminas abaixo deve ser administrada em pacientes com estado de mal epiléptico?

- A) Tiamina
- B) Vitamina C
- C) Vitamina B12
- D) Vitamina D
- E) Vitamina K

QUESTÃO 23

São achados sugestivos de ataque de pânico todos os abaixo, *exceto*:

- A) Início abrupto
- B) Pico dos sintomas dez minutos após o início
- C) Dispnéia
- D) Parestesias
- E) Bradicardia

QUESTÃO 24

Um paciente alcoolista foi encontrado desacordado após uma grande libação alcoólica, com estertores difusos em ambos os campos pulmonares. Ele tem os poucos dentes restantes em precário estado de conservação. Após 48 horas desenvolveu febre e persistia com estertoração. Qual o esquema antibiótico *mais adequado* para seu tratamento?

- A) Ceftriaxona
- B) Levofloxacina
- C) Piperacilina-tazobactam
- D) Claritromicina
- E) Ciprofloxacina

QUESTÃO 25

São complicações observadas após acidentes ofídicos todos os abaixo, *exceto*:

- A) Neurotoxicidade com diplopia e ptose
- B) Sangramento gengival e epistaxe
- C) Hipotensão
- D) Rabdomiólise
- E) Insuficiência hepática

CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Tipo 1

QUESTÃO 26

Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa *incorreta*:

- A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de saúde estão vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais.
- B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- C) Os estados e municípios devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
- D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
- E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição Federal.

QUESTÃO 27

Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa *incorreta*:

- A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica.
- B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública.
- Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do cistama
- E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados conveniados com o SUS.

QUESTÃO 28

"As ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde" é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):

- A) Educação permanente para o controle social.
- B) Promoção da equidade.
- C) Mobilização social em saúde.
- D) Educação Popular em Saúde.
- E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

QUESTÃO 29

Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 2011, *exceto*:

- A) Saúde do trabalhador.
- B) Saúde indígena.
- C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
- D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
- E) Saúde do homem.

QUESTÃO 30

Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, no Pacto pela Vida 2008, *exceto*:

- A) Taxa de internação por diabetes *mellitus* e suas complicações na população de 30 anos de idade e mais.
- B) Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.
- C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais e sete ou mais consultas de pré-natal.
- D) Percentual de crianças menores de cinco anos com vacinação em dia.
- Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.

QUESTÃO 31

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, *exceto*:

- A) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios.
- B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
- C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
- D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
- E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade com a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.



QUESTÃO 32

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a alternativa *incorreta*:

- Á) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários
- B) A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais seguimentos.
- C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- D) Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.
- E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder municipal legalmente constituído.

QUESTÃO 33

O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica de quais instrumentos?

- A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e Programação Pactuada Integrada.
- D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano Plurianual.
- E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Plano Plurianual.

QUESTÃO 34

Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de saúde do trabalhador abaixo, *exceto*:

- A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
- B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente do trabalho.

QUESTÃO 35

Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores do SUS?

- A) Municipalização.
- B) Universalização.
- C) Regionalização.
- D) Regulamentação.
- E) Hierarquização.

QUESTÃO 36

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do Sistema Único de Saúde:

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- () O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- () Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- ()É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência *correta*, de cima para baixo:

- A) V, V, F, V, V, F
- B) F, V, F, V, F, V
- C) V, V, V, V, V, V
- D) F, F, V, F, F, F.
- E) V, F, V, F, F, V.



Cargo: Plantonista SAMU / Nível Superior

Tipo 1

QUESTÃO 37

Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa *incorreta*:

- A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se constituem como a terceira maior causa de mortalidade na população geral.
- B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
- C) No conjunto da população, entre as causas externas, as principais causas de óbito foram por agressões, seguidas dos acidentes de transporte e quedas.
- D) Dentre as causas externas as agressões são as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os acidentes de transporte são predominantes entre crianças e idosos.
- E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro anos, os afogamentos.

QUESTÃO 38

Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de trabalho básicos da ação regulatória, *exceto*:

- A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos realizados pelos estabelecimentos executantes para os estabelecimentos solicitantes.
- B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
- C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou serviço de saúde.
- D) A execução da ação regulatória feita por profissional competente, capaz de análise crítica e discernimento que o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
- E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um sistema informatizado.

QUESTÃO 39

Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso da Atenção Básica?

- A) Norma Operacional Básica/1996.
- B) Norma Operacional Básica/1993.
- C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
- D) Norma Operacional Básica/1991.
- E) Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 40

De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Participação Popular.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.

