

CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO S13	PROVA V	ATENÇÃO: VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
MANHÃ		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ÁREA DA SAÚDE
E DO QUADRO GERAL**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - PACIENTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS**

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“É importante perceber que o despertar depende de você.”**Roberto Shinyashiki***A T E N Ç Ã O**

1. O **Caderno de Questões** contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no Cronograma.

Realização:

**BOA PROVA**

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

A AIDS no Brasil e na China

Há trinta anos, os livros de história estavam marcados pelos postulados cientificistas e racionalistas do começo do século XX. Epidemias e fanatismos religiosos apareciam como coisas do passado varridas pelo progresso da ciência, da laicidade e da razão. Assim, retrospectivamente, o alastramento de novas intolerâncias religiosas e de vagas epidêmicas em várias partes do mundo aparece como uma incongruidade histórica. No que concerne às doenças de massa, os acontecimentos recentes continuam a surpreender.

Quando a AIDS começou a se espalhar, muita gente se assustou, achando que o Brasil seria maciçamente atingido por essa nova peste. Veio a AIDS com o seu cortejo de mortes e de sofrimentos, mas o mal não assumiu em nosso país as proporções catastróficas que adquiriu em nações africanas e asiáticas. Todo cuidado é pouco, mas a vigilância da população, dos especialistas e dos serviços de saúde pública parece ter conseguido limitar o desastre. Além disso, o Brasil implementou o tratamento dos aidéticos, desmentindo as correntes conservadoras dos países ricos, ainda ativas no governo Bush, que defendem métodos unicamente preventivos fora da Europa e dos Estados Unidos. Para essas correntes, só as nações ricas poderiam arcar com os custos do tratamento gratuito dos aidéticos no âmbito da saúde pública. Quebrando patentes, fabricando genéricos e obrigando os grandes laboratórios ocidentais a reduzir os preços dos medicamentos, o Brasil não aceitou as imposições dos países ricos (...).

Desse modo, o Brasil pôde apresentar nos foros internacionais resultados de uma política de saúde seriamente efetivada no país, obtendo o apoio de amplos setores da opinião pública mundial (...).

Há um forte contraste entre o combate à AIDS no Brasil, de um lado, e nos países africanos e asiáticos, de outro. Na África, a doença se apresenta como um dos maiores dramas que têm afligido esse continente martirizado. Na Ásia, e em particular na China, a epidemia avança num ritmo assustador. Organismos da ONU calculam que haja um milhão de chineses infectados com HIV atualmente e que o número pode saltar para 20 milhões de casos em 2010. Todos os especialistas concordam quanto ao fato de que grande parte da responsabilidade pelo desastre cabe ao governo de Pequim. Num país onde quase tudo é segredo de Estado, a doença avançou durante muito tempo sem encontrar barreiras. Principal vetor de contaminação, a coleta de sangue para fins comerciais só foi proibida no final de 1998. Na província de Henan, 74% dos habitantes que vendiam sangue estão infectados, o que representa uma cifra de 700 000 casos.

O governo chinês, que não hesita em copiar produtos industriais patenteados, não pensou em fabricar genéricos para tratamento de aidéticos nem desenvolveu políticas preventivas. A primeira prestação de contas de um alto responsável governamental sobre a situação da AIDS na China ocorreu agora, no fim de agosto – ocasião em que vários sites da internet, escapando ao controle chinês, anunciavam o aumento de 67% nos casos de HIV no primeiro semestre de 2001.

Surgirão, decerto, estudos sobre as diferenças históricas, culturais e sociais que explicam a situação diversa da AIDS no Brasil e na China. No entanto, será difícil escapar de uma evidência cristalina: a praga está sendo contida aqui porque o Brasil é uma democracia e a China, uma ditadura.

(Luiz Felipe de Alencastro, VEJA, 5/9/2001)

1. A que “incongruidade” se refere o primeiro parágrafo do texto?

- A) Livros que postulam ideias científicas e racionalistas não podem encontrar leitores num mundo laico.
- B) Um mundo marcado pela ciência, pela laicidade e pela razão não coaduna com novas intolerâncias religiosas e vagas epidêmicas.
- C) O alastramento de epidemias e intolerâncias religiosas não pode ser previsto em livros de história.
- D) Não se podem fazer previsões relativas à religiosidade ou a epidemias de um século para outro.
- E) Trinta anos, no que diz respeito à história, não é distanciamento suficiente para se prever os rumos de uma epidemia.

2. Pela leitura do texto, pode-se inferir que, no que diz respeito ao alastramento da doença, os chineses foram prejudicados:

- A) pelo alto preço dos medicamentos.
- B) pelo baixo poder aquisitivo da população.
- C) por falta de acesso à informação.
- D) pelo fanatismo religioso.
- E) pela proibição da comercialização de sangue.

3. Assinale a afirmativa que tem base no texto.

- A) A aquiescência do Brasil às determinações do governo Bush não impediu que a doença se alastrasse em nosso país como aconteceu com os países africanos e asiáticos.
- B) Os métodos unicamente preventivos adotados pelo governo brasileiro contribuíram para a erradicação da doença no país.
- C) Os números atestam que as medidas preventivas adotadas pelo Brasil tiveram maior efeito na saúde pública que as mesmas medidas adotadas por países africanos e asiáticos.
- D) Desde que o Brasil implementou uma política de ajuda aos países subdesenvolvidos passou a receber o apoio de amplos setores da opinião pública mundial.
- E) No Brasil, a AIDS não assumiu as proporções que atingiu em outras regiões graças ao comprometimento da população e dos órgãos de saúde no combate ao alastramento da doença.

4. Assinale a opção em que a vírgula indica a elipse do verbo.

- A) “Há trinta anos, os livros de história estavam marcados pelos postulados cientificistas e racionalistas do começo do século XX.”
- B) “No que concerne às doenças de massa, os acontecimentos recentes continuam a surpreender.”
- C) “Na África, a doença se apresenta como um dos maiores dramas que têm afligido esse continente martirizado.”
- D) “No entanto, será difícil escapar de uma evidência cristalina: a praga está sendo contida aqui porque o Brasil é uma democracia e a China, uma ditadura.”
- E) “Para essas correntes, só as nações ricas poderiam arcar com os custos do tratamento gratuito dos aidéticos no âmbito da saúde pública.”

5. Em apenas uma alternativa o substantivo apresentado foi formado pelo mesmo processo de formação da palavra grifada em: "Há um forte contraste entre o combate à AIDS no Brasil...". Assinale-o.

- A) Resgate.
- B) Felicidade.
- C) Planalto.
- D) Democracia.
- E) Vinagre.

6. Se substituirmos a conjunção temporal pela condicional SE, no período abaixo, haverá necessidade de adequação verbal. Indique as formas verbais que estariam coerentes com a nova redação.

"Quando a AIDS começou a se espalhar, muita gente se assustou..."

- A) começava - espalhava - assustava.
- B) começasse - espalhar - assustaria.
- C) começaria - espalharia - assustiria.
- D) começar - espalhar - assustara.
- E) começou - espalhar - assustava.

7. Assinale o antecedente do pronome relativo grifado no trecho abaixo.

"Além disso, o Brasil implementou o tratamento dos aidéticos, desmentindo as correntes conservadoras dos países ricos, ainda ativas no governo Bush, que defendem métodos unicamente preventivos fora da Europa e dos Estados Unidos."

- A) correntes conservadoras.
- B) tratamento dos aidéticos.
- C) países ricos.
- D) governo Bush.
- E) Brasil.

8. Marque a única conjunção que substitui a locução grifada abaixo, sem alteração de sentido.

"No entanto, será difícil escapar de uma evidência cristalina..."

- A) Portanto.
- B) Logo.
- C) Entretanto.
- D) Porquanto.
- E) Pois.

9. Em "Organismos da ONU calculam que haja um milhão de chineses infectados com HIV atualmente...", a oração introduzida pela conjunção que exerce função de:

- A) sujeito.
- B) predicativo.
- C) complemento nominal.
- D) objeto direto.
- E) objeto indireto.

10. Assinale a opção que completa, correta e respectivamente, os espaços da frase abaixo.

_____ despeito dos esforços para combater _____ epidemia de AIDS, _____ África Subsaariana ainda se mostra como _____ região do mundo mais afetada pela doença, que atinge cerca de 67% da população, de acordo com dados das Nações Unidas.

- A) À - a - a - à.
- B) À - à - a - a.
- C) À - a - à - a.
- D) A - à - a - à.
- E) A - a - a - a.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

11. A Portaria nº 2.669, de 3 de novembro de 2009 estabelece, entre outras coisas, metas do Pacto pela Saúde para o biênio 2010-2011. No que se refere ao componente Pacto de Gestão, uma das metas estabelecidas para 2010 é:

- A) 70% de municípios com pactuação de ações estratégicas de vigilância sanitária.
- B) redução em 2% da taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur.
- C) reduzir a mortalidade infantil neonatal em 3%.
- D) confirmação por sorologia de, no mínimo, 90% dos casos de hepatite B.
- E) reduzir em 15% o nº de casos de sífilis congênita.

12. Com base em dados fornecidos pelo DATASUS de mortalidade proporcional, segundo grupo de causas (todas as idades) para o município de Vitória/ES no ano de 2004, pode-se afirmar que as principais causas de morte, numa escala de importância decrescente, foram:

- A) doenças do aparelho circulatório, neoplasias, demais causas definidas e causas externas.
- B) doenças do aparelho respiratório, neoplasias, causas externas e demais causas definidas.
- C) neoplasias, doenças do aparelho circulatório, causas externas e algumas doenças infecciosas e parasitárias.
- D) algumas doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho respiratório, neoplasias e causas externas.
- E) doenças do aparelho circulatório, demais causas definidas, neoplasias e causas externas.

13. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde são ações previstas no seguinte princípio:

- A) igualdade da assistência.
- B) universalidade de acesso.
- C) integralidade de assistência.
- D) organização dos serviços públicos.
- E) descentralização político-administrativa.

14. São doenças transmissíveis, monitoradas pela Vigilância Epidemiológica e que fazem parte da Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória:

- A) catapora, raiva humana e malária.
- B) meningite, coqueluche e leptospirose.
- C) peste, doenças exantemáticas e doença diarreica aguda.
- D) doenças transmitidas por alimentos, cólera e catapora.
- E) botulismo, doenças exantemáticas e dengue.

15. Terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde:

- A) conselhos estaduais de saúde.
- B) comissões bipartites.
- C) comissões intersetoriais.
- D) comissões tripartites.
- E) conselhos municipais de saúde.

16. É parte integrante do Plano Estadual de Saúde, pois é por seu intermédio que são efetuadas a organização, regionalização e hierarquização da rede, de forma a garantir o acesso universal e integral da população. A afirmação diz respeito à(ao):

- A) agenda de saúde.
- B) relatório de gestão.
- C) plano de saúde.
- D) programação pactuada e integrada.
- E) plano diretor de regionalização.

17. O esquema da cadeia do processo infeccioso procura integrar e detalhar os conceitos de estrutura epidemiológica, de história natural e de espectro clínico das doenças infecciosas. Nesse processo, os agentes infecciosos apresentam uma série de características dentre as quais está a **infectividade**. No que diz respeito a essa característica, é correto afirmar que é:

- A) a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- B) a capacidade de um agente etiológico alojar-se e multiplicar-se no organismo do hospedeiro e transmitir-se deste para um novo hospedeiro.
- C) a quantidade do agente que penetra no novo hospedeiro suscetível.
- D) o grau de patogenicidade de um agente infeccioso que se expressa pela gravidade da doença.
- E) a capacidade do agente biológico de estimular a resposta imune no hospedeiro.

18. São características gerais do sistema de Vigilância em Saúde, EXCETO:

- A) deve submeter-se a avaliações frequentes, de forma a se adequar às características dos sistemas nacionais de saúde, em cada momento.
- B) deve ser útil para a identificação dos fatores de risco e das populações vulneráveis à exposição ao risco.
- C) deve prevenir e controlar a ocorrência de eventos adversos à saúde.
- D) deve ser entendida como um pré-requisito para a elaboração de programas de saúde e um instrumento para avaliação do seu impacto.
- E) a existência de programas continuados de formação e treinamento de recursos humanos, especialmente de epidemiologistas.

19. Incidência de uma doença refere-se à(ao):

- A) nº de casos novos de uma doença, que iniciaram no mesmo local e período.
- B) conjunto de indivíduos que adquirem doenças, num dado intervalo de tempo e em uma determinada população.
- C) nº total de casos de uma doença, existentes num local e período.
- D) frequência ou probabilidade de ocorrência de casos novos de uma doença na população.
- E) comportamento das doenças e dos agravos da saúde na população.

20. Desencadeou o processo de municipalização da gestão, habilitando os municípios como gestores do SUS e criou a transferência regular e automática dos recursos fundo a fundo. Tais características dizem respeito à:

- A) NOB-SUS/91.
- B) NOAS/01.
- C) NOAS/02.
- D) NOB-SUS/92.
- E) NOB-SUS/93.

21. Entendida como uma forma de pensar e agir, que tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) saúde ambiental.
- C) vigilância sanitária.
- D) vigilância em saúde.
- E) saúde do trabalhador.

22. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às:

- A) instituições privadas sem fins lucrativos.
- B) instituições com fins lucrativos e filantrópicas.
- C) instituições filantrópicas e privadas sem fins lucrativos.
- D) instituições filantrópicas.
- E) instituições com fins lucrativos.

23. O Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde foi inserido na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, através da:

- A) Portaria nº 204/07.
- B) Portaria nº 837/09.
- C) Resolução nº 399/06.
- D) Portaria nº 373/02.
- E) Resolução nº 333/03.

24. Apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde, com vistas ao seu fortalecimento para que os mesmos possam exercer plenamente os seus papéis, é uma das ações que visa fortalecer o processo de participação social no SUS e está prevista no(a):

- A) pacto de gestão do SUS.
- B) programação pactuada integrada.
- C) pacto pela vida.
- D) gestão do trabalho na saúde.
- E) pacto em defesa do SUS.

25. A mortalidade infantil é um indicador de saúde que pode ser classificada de acordo com a idade do óbito. A alternativa que apresenta essa classificação de maneira correta é:

- A) Mortalidade infantil - óbitos de 0 a 25 dias.
- B) Mortalidade pós-neonatal - óbitos de 25 a 364 dias.
- C) Mortalidade neonatal precoce - óbitos de 0 a 10 dias.
- D) Mortalidade infantil tardia - óbitos de 28 dias a 364 dias.
- E) Mortalidade neonatal - óbitos de 0 a 15 dias.

26. Define que todo município seria responsável pela gestão do sistema municipal de saúde na organização e na execução das ações de atenção básica:

- A) Lei nº 8.142/90.
- B) Lei nº 9.961/00.
- C) Portaria nº 399/07.
- D) Lei nº 8.689/93.
- E) Portaria nº 2.023/04.

27. No estudo da História Natural da Doença, a prevenção engloba um conjunto de procedimentos que visam proteger e melhorar a saúde de uma população e, portanto, sua qualidade de vida. São características do nível secundário de prevenção:

- A) ações educativas.
- B) ações saneadoras.
- C) proteção específica.
- D) promoção da saúde.
- E) intervenção imediata.

28. Na construção dos indicadores de saúde, os coeficientes representam o "risco" de determinado evento ocorrer na população. No que se refere ao coeficiente de prevalência é correto afirmar que:

- A) representa o nº de casos presentes em uma determinada comunidade num período de tempo específico.
- B) é a proporção de óbitos entre os casos de uma doença.
- C) representa o risco de óbito na comunidade.
- D) é o risco de ocorrência de casos novos de uma doença na população.
- E) estima o risco de novos casos da doença em uma população.

29. NÃO faz parte das atribuições do Sistema Único de Saúde:

- A) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- B) proteger o trabalhador e a gestante em situação de desemprego.
- C) colaborar na proteção do meio ambiente.
- D) executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
- E) controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde.

30. A participação da sociedade na gestão do SUS foi instituída através da Lei nº:

- A) 8.080/90.
- B) 9.961/00.
- C) 8.142/90.
- D) 9.656/98.
- E) 8.689/93.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A história familiar de um paciente é importante para:

- A) determinar a transmissão genética de uma doença ou uma predisposição a ela.
- B) explicar o estado de cada sistema em relação a possível doença concomitante ou ao tratamento desejado.
- C) refletir a influência que o meio em que vive ou o estilo de vida podem ter sobre a doença.
- D) resumir as condições médicas anteriores como alergias, doenças, medicamentos e hospitalizações.
- E) não tem importância significativa, por isso já não é mais questionada.

32. O exame de palpação é realizado para:

- A) observação visual dos sinais.
- B) através do toque ter noção de consistência, mobilidade e natureza das estruturas.
- C) ter a transmissão diversificada do som através das estruturas.
- D) através do diálogo ter uma ideia da história progressiva da doença.
- E) não é utilizado em odontologia.

33. Com relação à aferição da pressão sanguínea de um paciente, podemos afirmar que:

- A) é importante realizar um bombeamento excessivamente rápido, pois favorece a ausculta.
- B) a pressão é diferente em cada braço, sendo importante anotar em que braço foi realizada a medição.
- C) somente a pressão sistólica deve ser anotada e levada em consideração para a realização de qualquer intervenção.
- D) somente a pressão diastólica deve ser anotada e levada em consideração para realização de qualquer intervenção.
- E) o paciente deve estar com os pulsos cerrados e o braço em posição vertical na hora da realização do exame.

34. O agente causador da sífilis é denominado:

- A) *Treponema pallidum*.
- B) *Streptococcus viridans*.
- C) *Rickettsia*.
- D) *Trypanosoma cruzi*.
- E) *Varicella-Zoster*.

35. A elevação de creatinina no sangue pode ser indicativa de distúrbios:

- A) pulmonares.
- B) neurológicos.
- C) renais.
- D) cerebrais.
- E) motores.

36. Segundo Sonis et al (2006), são procedimentos que devem ser adotados diante do tratamento de um paciente com hipertensão grave:

- A) todos os procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos podem ser realizados.
- B) todos os procedimentos não cirúrgicos e simples podem ser realizados.
- C) submetê-lo apenas a exame e encaminhá-lo ao médico para controle, antes do tratamento dentário.
- D) todos os procedimentos podem ser realizados, exceto tratamentos endodônticos.
- E) todos os procedimentos cirúrgicos podem ser realizados desde que o paciente esteja sedado.

37. Segundo Andrade, E.D.(2001), existem relatos isolados de pacientes com hipertireoidismo que apresentam uma sensibilidade aumentada às catecolaminas. Por esta razão e devido à doença cardíaca subclínica associada a este quadro, NÃO é recomendado o uso de:

- A) soluções anestésicas locais do tipo das aminas simpaticomiméticas (adrenalina, noradrenallina, levonordefrina e fenilefrina).
- B) soluções anestésicas locais do tipo éster (adrenalina, noradrenallina, levonordefrina e fenilefrina).
- C) soluções anestésicas locais do tipo éster (procaína, tetracaína e prilocaína).
- D) soluções anestésicas locais do tipo das aminas simpaticomiméticas (procaína, tracaína e prilocaína).
- E) o uso de soluções anestésicas locais é contraindicação absoluta.

38. O ato anestésico inclui a aspiração leve e injeção lenta da solução, de modo que:

- A) seja evitada a injeção intravascular acidental e a superdosagem relativa.
- B) haja aumento da absorção do anestésico local por injeção intravascular.
- C) haja diminuição da absorção de adrenalina.
- D) haja aumento da absorção de vasoconstrictores.
- E) haja aumento da absorção do bissulfito de sódio.

39. Quanto maior o risco clínico de um paciente, devemos:

- A) nunca fazer uso de anestésicos locais.
- B) estar mais atentos ao controle eficaz da dor e da ansiedade.
- C) não atendê-lo, mesmo em casos de urgência.
- D) atendê-lo sempre sedado.
- E) agir de forma comum, sem cuidados especiais.

40. Para que sejam evitadas reações adversas durante a administração de anestésicos locais em crianças, é necessário:

- A) usar uma solução anestésica sem vasoconstrictor para diminuir a velocidade de absorção e aumentar a duração da ação.
- B) realizar injeção intravascular com aspiração prévia.
- C) injetar a solução anestésica rapidamente.
- D) aumentar a dose habitual para o dobro quando a criança estiver sedada ou debilitada.
- E) usar o menor volume e a menor concentração possíveis de anestésico local que produza anestesia satisfatória.

<p>41. Durante a gravidez, pode surgir uma lesão gengival com características histológicas semelhantes ao granuloma piogênico. Possui a aparência de amora devido ao aspecto granuloso e à cor vermelho escura. Trata-se de:</p> <p>A) tumor gravídico. B) herpes zoster. C) ameloblastoma. D) cementoblastoma. E) gengivite gravídica.</p>	<p>47. No atendimento ao diabético, o cirurgião-dentista deve estar familiarizado com os fatores que podem predispor à cetoacidose. São alguns deles, EXCETO:</p> <p>A) presença de quadro infeccioso. B) infarto do miocárdio. C) distúrbios gastrintestinais com vômito. D) cirurgia. E) baixa taxa de glicose sanguínea.</p>
<p>42. A melhor época para o atendimento odontológico de gestantes é:</p> <p>A) primeiro mês de gestação. B) segundo mês de gestação. C) segundo trimestre de gestação. D) terceiro trimestre de gestação. E) primeiro trimestre de gestação.</p>	<p>48. Representa uma possível consequência do diabetes não compensado:</p> <p>A) aumento da cicatrização tecidual. B) menor risco hemorrágico. C) maior risco de infecção. D) acromegalia. E) não existem consequências relevantes.</p>
<p>43. Diante da necessidade da execução de exames de imagens em pacientes grávidas, são recomendadas algumas normas, EXCETO:</p> <p>A) avaliar a real necessidade de exame radiográfico. B) proteger a gestante com avental de chumbo. C) realizar o maior número possível de tomadas radiográficas, guardando-as para evitar uma eventual necessidade de repetição. D) empregar filmes ultrarrápidos. E) evitar erros técnicos e de processamento do filme.</p>	<p>49. Segundo Lopes & Siqueira Jr.(1999), são sintomas clássicos do diabetes, EXCETO:</p> <p>A) poliúria. B) polidipsia. C) aumento da ingestão de líquidos. D) perda de peso. E) diminuição da ingestão de alimentos.</p>
<p>44. Durante a gravidez, especialmente nos estágios mais avançados, o feto já crescido pode exercer pressão sobre as veias abdominais da mãe. Assim, ocorre a diminuição do retorno venoso dos membros inferiores, predispondo a gestante à:</p> <p>A) hipotensão postural. B) diabetes. C) hemorragias. D) gengivite hormonal. E) herpes.</p>	<p>50. Os problemas resultantes da ação direta de drogas quimioterápicas para tratamento do câncer sobre os tecidos bucais são denominadas formas de estomatotoxicidade direta. Sua forma mais comum é representada por:</p> <p>A) mucosite. B) xerostomia. C) cárie profunda. D) doença periodontal. E) infecções odontogênicas.</p>
<p>45. A taxa normal de glicose sanguínea, após um período mínimo de 8 horas de jejum, situa-se na faixa entre:</p> <p>A) 50 e 70 mg/dL. B) 70 e 110 mg/dL. C) 110 e 130 mg/dL. D) 130 e 150 mg/dL. E) 150 e 170 mg/dL.</p>	<p>51. Segundo Sonis et al (1996), em odontologia, NÃO representa causa comum de parada respiratória:</p> <p>A) resposta idiossincrásica a um medicamento. B) broncoespasmo grave em pacientes asmáticos. C) dose muito baixa de sedativos. D) reação anafilática a um medicamento. E) edema de laringe com obstrução de vias aéreas.</p>
<p>46. Segundo Andrade, E.D. (2001), nas situações de urgência odontológica, em pacientes diabéticos não controlados, devemos optar por soluções anestésicas locais que contenham vasoconstrictores do tipo:</p> <p>A) felipressina. B) catecolaminas. C) adrenalina. D) procaína. E) não devem ser usados anestésicos locais mesmo que o paciente esteja com dor aguda.</p>	<p>52. O agente etiológico de maior incidência nos casos de endocardite bacteriana, encontrado em grande quantidade na cavidade oral é:</p> <p>A) <i>Streptococcus viridans</i>. B) <i>Prevotella Intermedia</i>. C) Lactobacilos. D) <i>Treponema pallidum</i>. E) Aa.</p>

53. No hipertireoidismo, há uma produção excessiva de tiroxina, podendo acarretar principalmente:

- A) aumento de peso.
- B) diminuição do débito cardíaco.
- C) estado mental lento.
- D) aumento da frequência cardíaca.
- E) intolerância à lactose.

54. A rapidez da diminuição da glicose no sangue, com níveis sanguíneos abaixo de 40mg/dL, é, aparentemente, o fator crucial para o desenvolvimento dos sintomas clínicos de:

- A) hipoglicemia.
- B) insuficiência cardíaca congestiva.
- C) AIDS.
- D) cetoacidose.
- E) metemoglobinemia.

55. Afeta de 5 a 10% das mulheres e é caracterizada pela perda do tono do tendão da válvula mitral, podendo causar regurgitação. Além de "síndrome do sopro telessistólico" ou síndrome de Barlow, essa condição congênita recebe o nome de:

- A) prolapso de válvula mitral.
- B) diabetes *mellitus*.
- C) aterosclerose.
- D) tuberculose.
- E) insuficiência cardíaca congestiva.