



Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

Tecnologista em Saúde Pública

Prova Objetiva

Código da prova

C3095

Uroginecologista

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
 - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
FGV PROJETOS

Língua Portuguesa

Texto

A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão ferverilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

07

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

08

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

09

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

10

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

Clínica médica**11**

Com relação ao novo Código de Ética Médica, em vigor a partir de 13 de abril de 2010, analise as afirmativas a seguir.

- I. O capítulo “Direito dos Médicos” estabelece em um de seus artigos que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente.
- II. O capítulo “Responsabilidade Profissional” estabelece em um de seus artigos que por estar essa profissão inserida no contexto da sociedade como um todo, é vedado ao médico, independentemente dos ditames de sua consciência pessoal, deixar de realizar atos médicos permitidos por lei.
- III. O capítulo “Relação com Pacientes e Familiares” estabelece em um de seus artigos que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

12

A Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990 estabelece que o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público constituem o Sistema Único de Saúde – SUS.

A respeito da participação da iniciativa privada no SUS assinale a afirmativa correta.

- (A) É independente e não articulada ao sistema, como garantido na constituição brasileira.
- (B) É complementar e organizada de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Garante as necessidades de maior complexidade do sistema de saúde, sendo as de menor complexidade exclusivas do SUS.
- (D) É prevista apenas em situações emergenciais, definidas pelos conselhos de saúde.
- (E) É prevista apenas em situações emergenciais, definidas pelas secretarias estaduais de saúde.

13

Em estudos epidemiológicos de coorte, a medida de indivíduos que apresentam resposta positiva para o fenômeno estudado (uma doença, por exemplo) durante o período de observação, em relação ao total de indivíduos no início do experimento é denominado(a):

- (A) tendência central.
- (B) prevalência.
- (C) variância.
- (D) incidência.
- (E) desvio padrão.

14

Um paciente com insuficiência coronariana aguda e crise hipertensiva, foi medicado com nitroglicerina venosa em infusão contínua. Por se queixar de dispneia durante o tratamento, foi analisada a oximetria de pulso em um dos dedos da mão, que revelou saturação de O₂ de 86%. As extremidades permaneceram aquecidas, com o tempo de enchimento capilar normal. Com a administração de oxigênio sob máscara não houve mudança na medida da saturação de O₂. O Rx de tórax teve laudo normal e a gasometria arterial revelou pH = 7,4; PaO₂ = 106 mmHg; pCO₂=34mmHg; BE = -3.

O diagnóstico mais provável para explicar o baixo valor da saturação de O₂ na oximetria de pulso nesse caso é:

- (A) a presença de insuficiência ventricular esquerda sistólica.
- (B) a presença de embolia pulmonar.
- (C) a presença de insuficiência ventricular direita.
- (D) a presença de insuficiência ventricular esquerda diastólica.
- (E) a presença de metahemoglobinemia.

15

Estudos farmacológicos e clínicos permitem identificar drogas que podem ser usadas em dose única diária com vantagens em relação aos esquemas de múltiplas doses ao dia. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. A levofloxacina tem eficácia comprovada quando prescrita uma vez ao dia em casos de pneumonia comunitária grave.
- II. A gentamicina apresenta menor nefrotoxicidade em dose única diária mesmo em casos de sepsis urinária grave.
- III. A daptomicina tem eficácia comprovada em dose única diária em casos de infecção cutânea grave.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

16

Dentre as diferentes formas de reação inflamatória destaque a forma granulomatosa, tipicamente presente na tuberculose.

Assinale a alternativa que apresente somente doenças que podem evoluir com reação inflamatória do tipo granulomatosa.

- (A) Sarcoidose, hanseníase, febre da arranhadura do gato
- (B) Brucelose, hanseníase, difteria
- (C) Hanseníase, brucelose, meningococcemia
- (D) Sarcoidose, linfogranuloma inguinal, meningococcemia
- (E) Sarcoidose, brucelose, difteria

17

O baço pode sofrer processo patológico que resulte na diminuição de seu volume. Assinale a alternativa que apresente a doença que pode ocorrer o fenômeno de redução do volume do baço por uma circunstância patológica.

- (A) Malária crônica
- (B) Anemia megaloblástica
- (C) Policitemia vera
- (D) Anemia falciforme
- (E) Esquistossomose

18

O diagnóstico de Coagulação Intravascular Disseminada (CID) é de caráter clínico com suporte laboratorial. Assinale a alternativa que contenha os principais exames laboratoriais recomendados para o diagnóstico de CID.

- (A) Tempo de protrombina, tempo de sangramento, tempo parcial de tromboplastina e produto de degradação da fibrina.
- (B) Tempo de protrombina, tempo de sangramento, produto de degradação da fibrina, contagem de plaquetas.
- (C) Tempo de protrombina, fibrinogênio sérico, produto de degradação da fibrina e d-dímero.
- (D) Tempo de protrombina, contagem de plaquetas, fibrinogênio sérico, d-dímero ou produto de degradação da fibrina.
- (E) Tempo parcial de tromboplastina, tempo de sangramento, fibrinogênio, produtos de degradação da fibrina.

19

No resultado de um hemograma, os valores do número de hemácias (em milhões/mm³), hemoglobina (em g/dL) e do hematócrito (em %) foram respectivamente 3,2; 9,0 e 26. Assinale a alternativa que contenha os valores respectivamente relacionados ao VCM (volume corpuscular médio em fl), HCM (hemoglobina corpuscular média em pg) e CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média em %).

- (A) VCM 78,0 HCM 30,3 CHCM 32,3
- (B) VCM 81,2 HCM 28,1 CHCM 34,6
- (C) VCM 82,0 HCM 30,3 CHCM 28,4
- (D) VCM 78,0 HCM 28,1 CHCM 32,3
- (E) VCM 82,0 HCM 29,2 CHCM 32,3

20

Assinale a alternativa em que o Teste de Coombs Direto tem a sua maior utilidade diagnóstica.

- (A) Nos pacientes antes de receber qualquer transfusão sanguínea.
- (B) Na pesquisa de anticorpos naturais do fator Rh.
- (C) Na anemia hemolítica auto-imune.
- (D) Nas provas de compatibilidade ou provas cruzadas.
- (E) Na avaliação materna no período pré-natal.

21

Em pacientes no Setor de Emergência hospitalar, com dispnéia de origem cardíaca, assinale a alternativa que apresente exame complementar com a melhor sensibilidade e especificidade para o aumento da pressão diastólica final (Pd2) do ventrículo esquerdo.

- (A) Eletrocardiograma (ECG).
- (B) Desidrogenase láctica (DLH).
- (C) Transaminase oxalacética (TGO).
- (D) Creatinofosfoquinase (CPK).
- (E) Peptídeo Natriurético Cerebral (BNP).

22

As alternativas a seguir incluem uma das causas de crise de dor abdominal de origem metabólica, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Diabetes.
- (B) Uremia.
- (C) Porfiria.
- (D) Anemia falciforme.
- (E) hiperlipidemia.

23

O resultado de uma hemocultura em paciente com síndrome séptica em período pós-operatório de cirurgia abdominal revelou a presença de *Escherichia Coli* produtora de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL).

Em relação às bactérias gram-negativas, produtoras de ESBL, analise as afirmativas a seguir.

- I. As beta-lactamases de espectro estendido são atualmente observadas apenas em bactérias gram-negativas identificadas em pacientes em ambiente hospitalar definindo a infecção como de origem hospitalar.
- II. As beta-lactamases de espectro estendido não interferem com a sensibilidade bacteriana a cefalosporinas de terceira geração como a ceftazidima, que pode assim ser habitualmente indicada em infecções por essas bactérias.
- III. As beta-lactamases de espectro estendido habitualmente não interferem com a sensibilidade bacteriana a antibióticos carbapenêmicos, que podem assim serem habitualmente indicados em infecções por essas bactérias.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

24

Em pacientes com dor abdominal por inflamação peritoneal, a intensidade da dor depende do tipo e da quantidade do material que entra em contacto com a superfície peritoneal para um dado intervalo de tempo.

Considerando um pequeno e mesmo volume de material, de exposição súbita, de curta evolução, assinale a alternativa em que se encontra o material capaz de provocar maior intensidade de dor.

- (A) fezes neutras contaminadas.
- (B) sangue.
- (C) urina.
- (D) doença inflamatória pélvica bacteriana.
- (E) suco ácido gástrico.

25

Em exame de hematoscopia realizado em paciente com anemia, o esfregaço periférico evidenciou a presença de hemácias do tipo em capacete e esquizócitos.

Assinale a alternativa que indique a forma de anemia que apresenta esses achados como sua característica diagnóstica mais importante.

- (A) Anemia megaloblástica.
- (B) Anemia hemolítica microangiopática.
- (C) Anemia por doença crônica inflamatória.
- (D) Anemia ferropriva após reposição de ferro.
- (E) Anemia falciforme.

26

Assinale a alternativa que indique teste de função pulmonar que é aferido pela espirometria e tem sua maior utilidade na avaliação de obstrução de vias aéreas.

- (A) Capacidade Pulmonar Total.
- (B) Volume Residual.
- (C) Volume Expiratório Final em 1 segundo.
- (D) Capacidade Residual Funcional.
- (E) Volume de Reserva Expiratória.

27

A retossigmoidoscopia e a colonoscopia são exames que apresentam, entre suas indicações, a possibilidade de identificação e retirada de lesões patológicas associadas ao desenvolvimento de um futuro câncer colo-retal.

Assinale a alternativa que contenha a lesão patológica com maior potencial para o desenvolvimento de câncer colo-retal.

- (A) pólipos adenomatosos vilosos.
- (B) pólipos hiperplásicos.
- (C) pólipos adenomatosos tubulares.
- (D) pólipos associados à colite ulcerativa.
- (E) pólipos juvenis esporádicos.

28

Um importante conceito epidemiológico é o valor preditivo de um teste. A respeito do valor preditivo, analise as afirmativas a seguir.

- I. O valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença quando o resultado do teste é negativo (normal) e depende da sensibilidade do teste e será melhor quanto mais sensível for o teste.
- II. O valor preditivo positivo é a probabilidade de doença em paciente com o resultado de um teste positivo (anormal) e não depende da prevalência da doença, sendo essa uma de suas vantagens.
- III. O valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença quando o resultado do teste é negativo (normal) e depende da prevalência da doença.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Pacientes que apresentam episódios de fenômenos trombóticos arteriais ou venosos podem necessitar de investigação para a hipótese de serem portadores de trombofilias.

As alternativas a seguir apresentam testes laboratoriais indicados para o diagnóstico das trombofilias, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Anticorpo anti-cardiolipina IgG.
- (B) Proteína S.
- (C) Anticoagulante lúpico.
- (D) Atividade anti-Xa.
- (E) Anti-trombina III.

30

As alternativas a seguir indicam medicações que são atualmente recomendadas para o tratamento farmacológico no estado de mal epilético ou status epilepticus, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Midazolam.
- (B) Fenobarbital.
- (C) Diazepam.
- (D) Carbamazepina.
- (E) Fenitoína.

Uroginecologista

31

Com relação às drogas para o tratamento da bexiga hiperativa, assinale a afirmativa correta.

- (A) A oxibutinina tem ação antimuscarínica e relaxante direta da musculatura lisa.
- (B) A tolterodina tem ação beta-agonista, consequentemente com menores efeitos colaterais.
- (C) A toxina botulínica A provoca a liberação da acetilcolina na junção colinérgica pré-sináptica.
- (D) A imipramina tem vários mecanismos de ação, aumentando o poder de contração vesical.
- (E) A darifenacina tem ação relaxante musculotrópica.

32

Dentre os *slings* utilizados para o tratamento da incontinência urinária de esforço, assinale a alternativa que apresente os que estão mais associados a erosão uretral ou vaginal.

- (A) de fásia de reto abdominal.
- (B) de parede vaginal.
- (C) de fásia cadavérica.
- (D) de submucosa intestinal suína.
- (E) sintéticos.

33

Assinale a alternativa que apresente as condições clínicas em que existe melhor indicação para utilizar *slings* transobturatórios.

- (A) Mulheres diabéticas.
- (B) Mulheres muito magras.
- (C) Mulheres com cirurgias pélvicas anteriores.
- (D) Mulheres com incontinência urinária mista.
- (E) Mulheres com vários partos vaginais anteriores.

34

As fístulas vesicovaginais podem ser abordadas cirurgicamente por via vaginal ou abdominal.

Assinale a alternativa que indique ser a via vaginal a melhor opção cirúrgica:

- (A) após radioterapia pélvica.
- (B) orifício único e abaixo da barra interureteral.
- (C) fístulas recidivadas.
- (D) quando existe fístula ureteral associada.
- (E) quando o volume de drenagem da fístula é muito grande.

35

No tratamento das fístulas vesicovaginais pode ser feita a eletrocoagulação endoscópica do orifício fistuloso.

Assinale a alternativa que indique a situação em que pode ser realizado este procedimento.

- (A) fístulas com orifícios maiores que 5 mm.
- (B) fístulas após radioterapia.
- (C) fístulas recidivadas.
- (D) fístulas com orifícios menores que 3 mm.
- (E) não deve ser tentada em qualquer situação, devido aos elevados riscos do procedimento.

36

Após tratamento para incontinência urinária de esforço na mulher, com *sling*, pode ocorrer obstrução urinária.

A esse respeito, a urodinâmica não é um bom exame para este diagnóstico porque:

- (A) o padrão urodinâmico feminino considerado normal é muito variável.
- (B) é comum existir bexiga hiperativa concomitante.
- (C) a história e o exame físico são suficientes para o diagnóstico de obstrução.
- (D) a cistoscopia é o melhor exame para diagnóstico de obstrução.
- (E) existe dificuldade para cateterismo uretral em mulheres obstruídas dificultando a realização do exame.

37

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir.

A *injeção intravesical de toxina botulínica requer atenção especial em pacientes com*

- (A) cistite intersticial.
- (B) cistite actínica.
- (C) hipertensão arterial com o uso de vários anti-hipertensivos.
- (D) miastenia gravis.
- (E) bexiga hiperativa neurogênica.

38

O prolapso genital é provavelmente multifatorial.

As alternativas a seguir apresentam fatores de risco que apresentam comprovação científica de causa-efeito, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Menopausa.
- (B) Parto vaginal.
- (C) Aumento da massa corporal.
- (D) Envelhecimento.
- (E) Histerectomia.

39

Assinale a alternativa que apresente a técnica cirúrgica, empregada no tratamento dos prolapso genitais, que está em desuso devido à demora na recuperação do paciente e ao elevado índice de recorrências.

- (A) Sutura da fásia do anel perivesical, associada a colporrafia anterior.
- (B) Promonto fixação da cúpula vaginal.
- (C) Miorrafia dos elevadores do ânus.
- (D) Colpopexia transcoccígea.
- (E) Fixação da cúpula vaginal ao ligamento sacroespinhoso.

40

Assinale a alternativa que apresente o distúrbio sexual feminino que está mais frequentemente associado a uma causa orgânica.

- (A) Vaginismo.
- (B) Dispareunia.
- (C) Aversão sexual.
- (D) Redução do desejo sexual.
- (E) Anorgasmia.

41

Assinale a alternativa que completa corretamente o trecho a seguir.

A complacência vesical pode estar reduzida no estudo urodinâmico de pacientes com

- (A) bexiga flácida.
- (B) mielomeningocele.
- (C) uso prolongado de parassimpaticolíticos.
- (D) uso prolongado de cateter vesical de demora.
- (E) enurese secundária.

42

Durante a cistometria pode ocorrer um aumento da pressão vesical por redução da complacência ou por contração vesical involuntária.

Assinale a alternativa que indique a manobra correta que pode ser feita para diagnosticar o aumento da pressão vesical.

- (A) Mandar o paciente tossir e observar a pressão do detrusor.
- (B) Mandar o paciente urinar e analisar o fluxo/pressão.
- (C) Esvaziar a bexiga e reiniciar o enchimento vesical.
- (D) Medir a pressão retal e compará-la à vesical.
- (E) Interromper a infusão do soro e observar o nível pressórico do detrusor.

43

O cateter vesical para medir a pressão vesical no estudo urodinâmico, deve ter o seguinte calibre:

- (A) maior que 20 CH.
- (B) maior que 12 CH.
- (C) entre 8 e 12 CH.
- (D) entre 4 e 7 CH.
- (E) menor que 4 CH.

44

O estudo urodinâmico de uma mulher com suspeita de cistite intersticial mostra capacidade cistométrica máxima de 420 mL e presença de contrações não inibidas.

A esse respeito é correto afirmar que:

- (A) a associação com a cistoscopia confirmará a hipótese de cistite intersticial.
- (B) os dados urodinâmicos excluem a possibilidade de cistite intersticial.
- (C) deve-se repetir a urodinâmica após a paciente estar em uso de anti-muscarínicos controlando as contrações não inibidas.
- (D) só os dados da urodinâmica, associados à história clínica, confirmam o diagnóstico de cistite intersticial.
- (E) é necessária a biópsia vesical para confirmação do diagnóstico de cistite intersticial.

45

A vídeourodinâmica está contra-indicada em mulheres:

- (A) grávidas
- (B) com incontinência pós operatória.
- (C) com prolapso genitais severos.
- (D) com suspeita de divertículo uretral.
- (E) com bexiga hiperativa idiopática.

46

Assinale a alternativa que apresente uma característica da chamada incontinência de esforço oculta.

- (A) Perda de urina apenas em ortostase.
- (B) A paciente informa ter incontinência e a mesma não ocorre no estudo urodinâmico.
- (C) A incontinência só ocorre após a redução do prolapso genital.
- (D) A incontinência só ocorre com a paciente tossindo e em ortostase.
- (E) A incontinência só ocorre após a retirada do espelho vaginal.

47

Nas mulheres com incontinência urinária de esforço, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A fisioterapia pélvica pode melhorar 40 a 50% das pacientes.
- (B) A incontinência de esforço associada à prolapso genital severo, sempre deve ser tratada cirurgicamente.
- (C) Aquelas mulheres com incontinência de esforço grave devem ser tratadas com cirurgia imediata.
- (D) Mulheres com boa musculatura pélvica respondem mal à fisioterapia.
- (E) Mulheres com musculatura pélvica fraca devem ser operadas imediatamente.

48

A utilização de cirurgia retro-púbicas aberta para incontinência urinária feminina pode ser seguida por complicações.

Assinale a alternativa que apresenta a complicação exclusiva da cirurgia de Marshall-Marchetti-Krantz.

- (A) Prolapso genital.
- (B) Bexiga hiperativa.
- (C) Lesão ureteral.
- (D) Obstrução urinária.
- (E) Osteíte púbica.

49

O diafragma pélvico é formado pelos músculos:

- (A) elevador do ânus e transverso.
- (B) pubococígeos, íleococígeos e coccígeos.
- (C) pubococígeos e íleococígeos.
- (D) piriformes e coccígeos.
- (E) piriformes, glúteos e íleococígeos.

50

Em relação à classificação anatômica dos prolapso pélvicos assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Prolapso uterino é associado ao compartimento vaginal médio.
- (B) Nos prolapso de compartimento anterior existem dois tipos de cistocele, além da combinação delas.
- (C) Nas enteroceles, as posteriores são mais comuns.
- (D) As retoceles são divididas em altas ou baixas.
- (E) As enteroceles pós operatórias podem acompanhar as retoceles.

51

Assinale a alternativa que indique o procedimento cirúrgico que está comumente associado à dispareunia.

- (A) Colporrafia anterior.
- (B) Colpopectia sacra.
- (C) Colporrafia posterior.
- (D) Suspensão íleocóccigea.
- (E) Suspensão do ligamento úterosacro.

52

Em relação aos *slings tension free*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) No passado, os *slings* eram colocados no colo vesical.
- (B) A utilização de telas de polipropileno monofilamentar resulta na melhor incorporação de tecido fibroso.
- (C) A tela deve ser apoiada na porção média da uretra.
- (D) O procedimento pode ser realizado apenas com anestesia local.
- (E) as mulheres idosas apresentam menor taxa de continência do que as mais jovens, com o uso de *slings* sintéticos.

53

Assinale a alternativa que indique a complicação exclusiva dos *slings* transobturatórios.

- (A) Perfuração uretral.
- (B) Dor na perna.
- (C) Erosão.
- (D) Hemorragia.
- (E) Disfunção miccional pós operatória.

54

Nas pacientes em uso contínuo de cateter vesical de demora, assinale a alternativa que indique o procedimento recomendado.

- (A) Colocar desinfetante na bolsa coletora.
- (B) Usar antibióticos profilaticamente.
- (C) Lavar a genitália frequentemente.
- (D) Esvaziar a bolsa coletora a cada 8 horas.
- (E) Colocar antimicrobianos no meato uretral.

55

Assinale a alternativa que indique a causa mais frequente de fístula vesico-uterina.

- (A) Cesareana.
- (B) Cateterismo vesical traumático.
- (C) Parto vaginal após primeiro parto por cesareana.
- (D) Migração de dispositivo intra-uterino (DIU).
- (E) Rompimento uterino no trabalho de parto.

56

As alternativas a seguir apresentam complicações que mulheres com divertículo de uretra podem apresentar, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Aparecimento de carcinoma no divertículo.
- (B) Infecção urinária recorrente.
- (C) Litíase vesical.
- (D) Dispareunia.
- (E) Gotejamento pós miccional.

57

Com o envelhecimento ocorrem modificações no aparelho urinário da mulher.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A excreção de líquidos ingeridos é maior durante a noite.
- (B) A capacidade vesical fica menor.
- (C) Passa a haver maior capacidade para adiar a micção.
- (D) É menos comum ocorrerem contrações não inibidas.
- (E) A contração do esfíncter externo (rabdoesfíncter) torna-se mais forte.

58

Em relação ao estudo urodinâmico, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Na fluxometria o paciente deverá urinar pelo menos 150mL para o exame ser considerado confiável.
- (B) Na cistometria, a velocidade de infusão alta poderá produzir alterações pressóricas irregulares (artefatos).
- (C) A avaliação cistométrica não sofre interferência pela presença de refluxo vesicoureteral.
- (D) A determinação da pressão de perda pela manobra de Valsalva deve ser avaliada à partir de pelo menos 150 mL de volume infundido.
- (E) Em até 40% dos homens poderá ocorrer uma diferença de até 2 mL/s no fluxo máximo, entre diferentes micções.

59

Assinale a alternativa que indique o melhor tratamento a ser utilizado em uma paciente com refluxo vesicoureteral severo e bexiga de capacidade muito pequena.

- (A) Uso de drogas parassimpaticolíticas.
- (B) Injeção vesical de toxina botulínica.
- (C) Ureterossigmoidostomia.
- (D) Neobexiga ileal.
- (E) Ampliação vesical com reimplante ureteral.

60

Em relação às fístulas uretero-vaginais, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A etiologia mais frequente são as histerectomias.
- (B) A cirurgia aberta, imediata ou após 6 meses, é a única conduta eficaz.
- (C) Ocorre micção normal, associada à incontinência total.
- (D) O diagnóstico pode ser feito pela urografia excretora ou pela pielografia retrógrada.
- (E) Outras etiologias para as fístulas são o trauma pélvico e após radioterapia.