

QUESTÃO 01

O diagnóstico por imagem assumiu um papel central no tratamento de pacientes com infecções profundas da cabeça e do pescoço. Informações obtidas por diferentes métodos de imagem são essenciais em delimitar com precisão a extensão anatômica do processo. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O diagnóstico por imagem das disfunções maxilofaciais e fasciais em geral começa com alguma forma de estudo radiográfico simples.
- B) As radiografias panorâmicas são comumente obtidas se os processos inflamatórios envolvem as regiões bucais ou parabucais para determinar se a origem da patologia é odontogênica e demonstrar a extensão do processo.
- C) As incidências antero-posterior (AP) e perfil do pescoço, com penetração para as partes moles, estão indicadas para verificar a permeabilidade das vias aéreas.
- D) A xeroradiografia é freqüentemente usada por alguns clínicos para avaliar processos patológicos envolvendo as partes moles e/ou a via aérea.
- E) A ressonância magnética (RM) é talvez a área do diagnóstico por imagem que mais rapidamente está se expandindo. Semelhante às radiografias convencionais, tomografia computadorizada (TC) e planigrafias, a RM envolve o uso de radiação ionizante.

QUESTÃO 02

Quanto à prescrição de antibióticos, nos processos infecciosos, está **correto** afirmar:

- A) A dose prescrita deve ser capaz de estabelecer uma concentração de antibiótico que seja igual a concentração inibidora mínima (MIC).
- B) Níveis subterapêuticos podem mascarar a infecção e suprimir as manifestações clínicas sem realmente eliminar os microorganismos invasores.
- C) Pacientes com doença renal preexistente e subsequente *clearance* reduzido podem exigir intervalos mais curtos entre as doses.
- D) Quando se trata de uma infecção severa estabelecida, a antibioticoterapia parenteral não deve ser considerada.
- E) Além de se tratarem as infecções com os antibióticos mais específicos possíveis e os de amplo espectro, a terapia de drogas associadas também deveria ser empregada.

QUESTÃO 03

Qual dos tumores não-odontogênicos, abaixo, **não** apresenta imagem radiográfica multilocular?

- A) Fibroma ossificante
- B) Osteíte condensante
- C) Granuloma de células gigantes
- D) Hemangioma central
- E) Querubismo

QUESTÃO 04

Qual dos tumores malignos, abaixo, apresenta imagem radiográfica de destruição óssea com margens mal definidas e aparência de dente “solto no alvéolo”?

- A) Carcinoma gengival.
- B) Osteossarcoma.
- C) Tumores metastáticos.
- D) Mieloma Múltiplo.
- E) Linfoma de Burkitt.

QUESTÃO 05

Constituem-se princípios do tratamento da osteomielite todos os abaixo, **exceto**:

- A) Avaliar e corrigir as deficiências das defesas do microorganismo.
- B) Antibióticos empíricos guiados pela coloração de Gram.
- C) Remover dentes com mobilidade e seqüestros.
- D) Antibióticos guiados por cultura; culturas repetidas.
- E) Seqüectomia, debridamento, decorticação, ressecção, reconstrução.

QUESTÃO 06

Para pacientes cujas infecções podem ser devidamente tratadas por exodontia, incisão e drenagem, é desejável uma anestesia local eficaz. A maioria dos Cirurgiões-Dentistas pode concordar que uma anestesia local adequada pode ser difícil de se obter quando há uma inflamação aguda ou infecção. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Os anestésicos locais por serem ácidos fracos que, em sua forma não ionizada, difundem-se lentamente pela membrana da célula e por outras barreiras teciduais para penetrar no tecido nervoso.
- B) Uma área infectada é provável que tenha pH mais baixo que os tecidos normais devido aos produtos da inflamação.
- C) O anestésico local é menos capaz de se difundir por meio de tecidos infectados que dos tecidos normais.
- D) Um mecanismo possível para a falha do estabelecimento de uma anestesia regional adequada é a alteração inflamatória degenerativa na estrutura do nervo e em suas proteínas constituintes.
- E) Alterações inflamatórias podem se deslocar pelo nervo que inerva a região infectada.

QUESTÃO 07

Há muitos métodos de induzir anestesia local. No entanto, somente aqueles métodos em que as substâncias induzem estado transitório e completamente reversível têm aplicação na prática clínica. São consideradas propriedades desejáveis para um anestésico local todas as abaixo, exceto:

- A) Não deve causar qualquer alteração permanente da estrutura nervosa.
- B) Sua toxicidade sistêmica deve ser baixa.
- C) Ser eficaz, na dependência de ter sido infiltrado no tecido ou aplicado localmente às mucosas.
- D) O tempo de latência deve ser o menor possível.
- E) O efeito clínico deve ser suficiente para permitir que se complete o procedimento.

QUESTÃO 08

As substâncias anestésicas locais são classificadas, de acordo com o sítio biológico e o modo de ação em:

- Classe A: atuam num sítio receptor na superfície externa da membrana nervosa.
- Classe B: atuam em sítios receptores na superfície interna da membrana nervosa.
- Classe C: atuam por mecanismo físico-químico independente do receptor.
- Classe D: atuam por combinação de mecanismos pelo receptor e independentes do receptor.

Baseando-se nas afirmações acima, assinale a alternativa correta:

- A) Análogos da lidocaína com amônio quaternário são Classe A.
- B) As Biotoxinas estão na Classe B.
- C) A Articaína é Classe C.
- D) A Benzocaína é Classe D.
- E) Os anestésicos locais mais úteis clinicamente (p.ex., articaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína) são Classe D.

QUESTÃO 09

De acordo com a cadeia intermediária da estrutura química, os anestésicos são classificados em Ésteres e Amidas. Qual das alternativas abaixo traz apenas anestésicos AMIDAS:

- A) Lidocaína, Etidocaína, Bupivacaína, Prilocaína, Articaína.
- B) Lidocaína, Procaína, Mepivacaína, Bupivacaína, Prilocaína.
- C) Lidocaína, Benzocaína, Mepivacaína, Bupivacaína, Articaína.
- D) Propoxicaína, Mepivacaína, Bupivacaína, Prilocaína, Articaína.
- E) Lidocaína, Tetracaína, Mepivacaína, Prilocaína, Articaína.

QUESTÃO 10

A diluição dos vasoconstrictores, nos anestésicos locais, é comumente designada pela proporção. Qual a quantidade de vasoconstrictor contida em uma solução que apresenta a diluição de 1:50.000?

- A) 0,00002 mg/ml.
- B) 0,0002 mg/ml.
- C) 0,002 mg/ml.
- D) 0,02 mg/ml.
- E) 0,2 mg/ml.

QUESTÃO 11

Com relação ao estado convulsivo, assinale a alternativa incorreta:

- A) O estresse pode provocar convulsão até mesmo em pacientes epiléticos bem controlados.
- B) Procedimentos de redução de estresse devem ser empregados para minimizar o risco de convulsões durante o tratamento.
- C) A hipoglicemia e a hiperventilação são duas outras causas de convulsões no consultório odontológico.
- D) As reações de superdosagem severa de anestésico local manifestam-se clinicamente por convulsões tônico-clônicas generalizadas.
- E) A administração de anestésicos locais é contra-indicada em pacientes com tendência a convulsões.

QUESTÃO 12

Segundo *Malamed (2001)* para a solução anestésica de Articaína a 4% com adrenalina 1:200.000 a dose máxima é de 7mg/kg; com o máximo absoluto de 500mg. Pergunta-se: Qual a quantidade máxima de anestésico a ser aplicada em um paciente com 100 Kg?

- A) 3,47.
- B) 6,94.
- C) 9,72.
- D) 12,50.
- E) 17,50.

QUESTÃO 13

Em anestesia local, são técnicas de injeção apenas na maxila todas as abaixo, exceto:

- A) Injeção intracrista.
- B) Bloqueio do nervo alveolar superior posterior.
- C) Bloqueio do nervo palatino maior.
- D) Bloqueio do V₂ do Trígêmio.
- E) Bloqueio do nervo naso palatino.

QUESTÃO 14

A técnica anestésica de *Vazirani-Akinosi*:

- A) É uma técnica para a mandíbula com a boca fechada.
- B) É um verdadeiro bloqueio do nervo mandibular, pois produz anestesia sensitiva em praticamente toda a distribuição do V₃.
- C) É uma técnica extra-bucal para anestesia da maxila.
- D) É uma técnica para a maxila com a máxima abertura bucal.
- E) Não é uma técnica anestésica para os maxilares.

QUESTÃO 15

São instrumentos de EXÉRESE todas as abaixo, exceto:

- A) Descoladores.
- B) Extratores (elevadores).
- C) Fórceps.
- D) Curetas.
- E) Pinça Goiva.

QUESTÃO 16

Relacione a primeira coluna com a segunda:

- | | | |
|-----------|-----|--|
| 1. Bolha | () | Fluido acumulado no epitélio da pele ou mucosa. |
| 2. Erosão | () | Úlcera superficial (escoriação). |
| 3. Mácula | () | Área circunscrita de alteração de cor, sem elevação. |
| 4. Pápula | () | Pequena massa palpável, acima da superfície do epitélio. |
| 5. Úlcera | () | Destruição do epitélio. |

A seqüência correta é:

- A) 1; 2; 3; 4; e 5.
- B) 1; 3; 2; 4; e 5.
- C) 2; 1; 3; 4; e 5.
- D) 1; 2; 4; 3; e 5.
- E) 1; 5; 3; 4; e 2.

QUESTÃO 17

São indicações para as Biopsias Incisionais todas as abaixo, exceto:

- A) Verificação de lesões ulcerativas ou vegetantes persistentes por mais de 30 dias.
- B) Lesões de origem melânica.
- C) Lesões suspeitas ou não identificadas clinicamente.
- D) Verificação de tecido remanescente à excisão de tecido neoplásico maligno.
- E) Verificação de processos inflamatórios ou granulomatosos.

QUESTÃO 18

São lesões brancas da mucosa bucal todas as abaixo, exceto:

- A) Líquen plano.
- B) Doença de Darier.
- C) Lúpus eritematoso crônico discóide.
- D) Ptíriase rosada de Gilbert.
- E) Doença de Addison.

QUESTÃO 19

Consiste em uma modificação da incisão de Wassmund, com as mesmas indicações e diferenciação técnica apenas na incisão abaixo da margem gengival livre 3 a 5 mm seguindo o contorno dos festões gengivais. Esta é a incisão de:

- A) Newmann.
- B) Partsch.
- C) Farabeuf.
- D) Ochsenbein-Luebke.
- E) Fisher.

QUESTÃO 20

Segundo a classificação de Winter e Pell & Gregory, para terceiros molares inferiores, o dente que apresentará um grau de menor dificuldade para sua extração será o:

- A) Distoangular, classe III, posição C.
- B) Horizontal, classe II, posição C.
- C) Mesioangular, classe II, posição C.
- D) Vertical, classe I, posição A.
- E) Mesioangular, classe II, posição B.

QUESTÃO 21

Qual das indicações abaixo, não justifica a remoção do terceiro molar inferior?

- A) Pericoronarite recorrente.
- B) Cárie.
- C) Doença periodontal.
- D) Sinusite maxilar.
- E) Abscessos apicais.

QUESTÃO 22

Constitui-se acidente de exodontia de um molar inferior todas as abaixo, exceto:

- A) Seccionamento do V₂ do Trigêmio.
- B) Fratura da coroa dental.
- C) Quebra de instrumento(s).
- D) Lesão de partes moles.
- E) Fratura radicular.

QUESTÃO 23

Sobre as Comunicações Bucossinusais é correto afirmar:

- A) Acontece particularmente quando um molar superior, com raízes convergentes, nas vizinhanças de espaços dentados, requer extração.
- B) O tratamento não deve ser feito imediatamente quando a abertura é criada.
- C) O tratamento bem-sucedido e fechamento da fístula buccossinusal requer cirurgia conservadora.
- D) Apesar da técnica usada, deve ser lembrado que o defeito ósseo em volta da fístula é muito menor do que a deformidade do tecido mole visível clinicamente.
- E) Se a fístula se desenvolve próximo à raiz de um dente adjacente, o fechamento ainda é mais complicado e, para ser bem sucedido, pode ser necessário a extração do dente.

QUESTÃO 24

Os princípios básicos, atuais, que regem a Traumatologia são:

- A) Redução e consolidação.
- B) Imobilização e redução.
- C) Redução, contenção e imobilização.
- D) Redução e osteossíntese.
- E) Redução, contenção, imobilização e controle da infecção.

QUESTÃO 25

Assinale com “V” a alternativa correta e com “F” a incorreta:

- () O hematoma caracteriza-se por uma coloração causada por impregnação de um corpo estranho ou substância na derme do paciente.
- () As lacerações na mucosa bucal não devem ser exploradas antes da sutura.
- () A tatuagem da pele só pode ocorrer nas lacerações e nas abrasões.
- () Nas lacerações causadas por mordidas de animais o tratamento consiste em limpeza da ferida e curativo.
- () As lacerações são menos dolorosas que as abrasões.

A seqüência correta é:

- A) F; F; V; F e V.
- B) F; F; V; V e V.
- C) F; V; V; F e V.
- D) F; V; V; V e V.
- E) F; F; V; F e F.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa incorreta:

- A) O tratamento das lacerações é caracterizado principalmente por sutura.
- B) Hematoma e equimose estão relacionados ao sangramento no interior dos tecidos nas contusões. A diferença entre eles é que no primeiro o sangramento provocou uma mancha, e no segundo, um aumento de volume do tecido.
- C) A contusão tem como características clínicas: inexistência de ruptura da superfície do tecido mole, edema, hematoma, equimose.
- D) Cauterização e esmagamento ósseo são procedimentos cirúrgicos de hemostasia.
- E) A tensão na sutura pode ser diminuída pelo deslocamento dos retalhos, a partir das suas bordas, no nível subcutâneo, de forma a permitir maior deslizamento da pele.

QUESTÃO 27

Paciente vítima de traumatismo dental, o seu incisivo central superior direito mostra-se móvel, com hemorragia do sulco gengival. Ao exame radiográfico o dente acha-se em sua posição normal no alvéolo. Qual o diagnóstico?

- A) Concussão.
- B) Subluxação.
- C) Luxação extrusiva.
- D) Luxação lateral.
- E) Luxação intrusiva.

QUESTÃO 28

O uso de parafusos do tipo IMF, possibilita seu emprego em traumatologia maxilo facial em algumas situações, entre elas, podemos indicar:

- A) Fixação intermaxilar.
- B) Fixação permanente de fraturas de maxila.
- C) Fixação permanente de fraturas na mandíbula.
- D) Suspensão da maxila ao arco zigomático.
- E) Fixação da mandíbula ao frontal.

QUESTÃO 29

O uso da barra de Erich, possibilita seu emprego em traumatologia maxilo facial em algumas situações. Entre elas, podemos indicar:

- A) Fixação intermaxilar.
- B) Fixação permanente de fraturas de maxila.
- C) Fixação permanente de fraturas na mandíbula.
- D) Suspensão do arco zigomático ao osso frontal.
- E) Fixação da mandíbula ao frontal.

QUESTÃO 30

O uso de fios de aço do tipo *KIRSCHNER*, possibilita seu emprego em traumatologia maxilo facial em algumas situações. Entre elas, podemos indicar:

- A) Fixação intermaxilar.
- B) Fixação permanente de fraturas de maxila.
- C) Fixação temporária de fraturas na mandíbula.
- D) Suspensão da maxila ao arco zigomático.
- E) Fixação da mandíbula ao frontal.

QUESTÃO 31

Em Fixação Interna Rígida (FIR), o sistema é 2.0, significa:

- A) Parafuso interfragmentário de 2cm.
- B) O diâmetro da cabeça do parafuso em mm.
- C) O diâmetro, em mm, da alma do parafuso (diâmetro sem as roscas).
- D) A largura do parafuso, em mm, incluindo as roscas.
- E) A largura do parafuso, em cm, incluindo as roscas.

QUESTÃO 32

Qual a fratura de mandíbula que não atinge a porção basilar?

- A) Goniana.
- B) Paragoniana.
- C) Parassinfisária.
- D) Processo alveolar.
- E) Sinfisária.

QUESTÃO 33

Em relação às características das fraturas de côndilo mandibular, é correto afirmar:

- A) Todas as fraturas são fechadas e devem ser tratadas, obrigatoriamente, por meio de redução fechada.
- B) As fraturas abertas devem ser tratadas com redução aberta e fixação interna e as fechadas por meio de redução fechada, sem fixação.
- C) A impossibilidade de obtenção de oclusão por métodos fechados é uma indicação absoluta para redução aberta da fratura.
- D) Em fraturas unilaterais, a linha média apresenta desvio para o lado contrário à fratura durante o movimento de máxima abertura bucal.
- E) As fraturas com grande deslocamento medial são as mais indicadas para cirurgia vídeo-assistida.

QUESTÃO 34

Qual dos exames abaixo é o mais indicado para o estudo da anquilose da ATM?

- A) Tomografia computadorizada da ATM.
- B) Sialografia.
- C) Ultra-sonografia das ATMs.
- D) Ressonância magnética da ATM.
- E) Cintilografia.

QUESTÃO 35

A Fratura do terço médio da face Le Fort III é também denominada de:

- A) Fratura de Guerin.
- B) Piramidal.
- C) Horizontal.
- D) Sagital palatina.
- E) Disjunção craniofacial.

QUESTÃO 36

Uma fratura do terço médio da face, com deslocamento para baixo, poderá provocar:

- A) Achatamento e alongamento da face.
- B) Achatamento e encurtamento da face.
- C) Achatamento e estreitamento da face.
- D) Luxação bilateral da ATM.
- E) Luxação da ATM e estreitamento da face.

QUESTÃO 37

Segundo a classificação de Knight & North, para fraturas do complexo zigomático, qual é a classe IV?

- A) Sem deslocamento do malar.
- B) Com deslocamento, mas sem rotação.
- C) Com deslocamento e rotação medial.
- D) Com deslocamento e rotação lateral.
- E) Complexas.

QUESTÃO 38

Uma fratura do assoalho orbital poderá provocar lesão do nervo:

- A) Infra-orbitário.
- B) Supra-orbitário.
- C) Oftálmico.
- D) Alveolar inferior.
- E) Metoniano.

QUESTÃO 39

Uma fratura cujo traço passa pelos ossos próprios do nariz, pelo unguis, pela lâmina papirácea do etmóide, se internando na cavidade orbitária, denomina-se:

- A) Fratura de Guerin.
- B) Fratura Le-Fort I.
- C) Fratura Le-Fort II.
- D) Fratura Le-Fort III.
- E) Fratura Sinfisária.

QUESTÃO 40

Uma grande parte do sucesso do tratamento ortocirúrgico depende da seleção adequada do paciente. Um candidato à cirurgia ortognática deve ser colaborador, e estar ciente das possibilidades e limitações do tratamento.

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A *natureza da deformidade* não tem importância. Importante é o planejamento.
- B) O *grau de deformidade* tem relação com o nível de satisfação do paciente.
- C) A *duração do interesse* pelo tratamento é um forte indicativo do grau de colaboração que o paciente pode oferecer.
- D) O paciente pode ter alguma dificuldade de *ajuste social*, e considerar que a deformidade seja a causa principal de seu desajuste.
- E) A *maturidade* do paciente para enfrentar e colaborar com o tratamento ortocirúrgico deve ser avaliada.

QUESTÃO 41

Em relação às técnicas de cirurgia ortognática, para mandíbula, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Osteotomia sagital.
- B) Osteotomia vertical.
- C) Osteotomia total em 3 (três) segmentos.
- D) Osteotomia subapical posterior.
- E) Osteotomia subapical anterior.

QUESTÃO 42

Os aspectos antiestéticos do excesso mandibular anteroposterior (A-P) se manifestam mais na vista de perfil do que no aspecto frontal. O que **não** notamos no perfil?

- A) Projeção exagerada do mento.
- B) Região submentoniana longa.
- C) Ângulo cervical aberto.
- D) Retrusão do lábio inferior em relação ao mento.
- E) Relação invertida entre os lábios, estando o inferior na frente do superior.

QUESTÃO 43

Os pacientes portadores de excesso maxilar anteroposterior apresentam as seguintes características, **exceto**:

- A) Perfil côncavo.
- B) Regiões Malar e paranasal proeminentes.
- C) Lábio superior projetado.
- D) Ângulo nasolabial fechado.
- E) Base nasal alargada.

QUESTÃO 44

Dentre os principais aspectos observados, na vista frontal, no paciente que apresenta deficiência maxilar vertical associada a deformidade mandibular, podem ser destacadas todas as características antiestéticas abaixo, **exceto**:

- A) Face curta com a redução mais significativa se situando no terço inferior.
- B) Exposição negativa dos incisivos superiores em repouso.
- C) Sorriso com muita exposição dos dentes superiores.
- D) Sulco nasogeniano profundo.
- E) Sulco mentolabial profundo.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa **correta**:

- A) O código de Nuremberg foi estabelecido após as atrocidades cometidas na primeira guerra mundial.
- B) O termo bioética foi cunhado pela primeira vez por um biólogo chamado Harry Potter, em 1980.
- C) A corrente principialista da bioética estabelece como princípios: Beneficência, Não maleficência, Autonomia e Justiça.
- D) O princípio bioético da justiça diz respeito, entre outros aspectos, ao consentimento livre e esclarecido.
- E) A bioética teve seu apogeu no início do século XX.

QUESTÃO 46

No que diz respeito à utilização de cadáveres em pesquisa e aos transplantes de órgãos, assinale a alternativa **correta**:

- A) Um cadáver morto por tiro deve esperar 45 dias para poder ser doado a uma universidade.
- B) A retirada de órgãos de anencéfalos é autorizada habitualmente.
- C) A doação de órgãos presumida, que está em vigor atualmente, é aquela em que se não for externado em documento civil o termo não-doador de órgãos, qualquer indivíduo é doador em potencial.
- D) Cadáver por morte violenta não pode ser doado a instituições de pesquisa.
- E) Cadáver por morte violenta pode ser doado a instituições de pesquisa somente após a necropsia.

QUESTÃO 47

Assinale a afirmativa que está **incorreta** em relação às espécies normativas que tratam sobre aspectos bioéticos no Brasil:

- A) No Brasil, a primeira resolução que trata da ética na pesquisa com seres humanos é a Resolução 01/88 devido às inúmeras denúncias sobre os abusos na saúde reprodutiva.
- B) Atualmente a resolução do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a ética na pesquisa é a 198/98.
- C) A resolução que trata da pesquisa com novos fármacos, medicamentos vacinas e testes é a resolução CNS 251/97.
- D) A resolução 251/97 divide as fases da pesquisa em 4 fases, sendo a quarta fase aquela em que a pesquisa mantém-se após o medicamento está sendo comercializado.
- E) A Resolução que define a aprovação de pesquisas em humanos é 0512/05.

QUESTÃO 48

Assinale a afirmativa **correta**:

- A) Devem-se respeitar os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades.
- B) Nos casos em que uma pesquisa envolve apenas questionário aplicado a pacientes, não precisa do consentimento informado.
- C) A pesquisa com seres humanos deve ser realizada mesmo quando o conhecimento que se pretende obter pode ser obtido por outro meio.
- D) A pesquisa com seres humanos deve estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais, porém não em outros fatos científicos.
- E) No que diz respeito a pesquisa com indígenas, as tribos afastadas da civilização devem ser utilizadas para dar maior fidedignidade aos dados da pesquisa.

QUESTÃO 49

Das afirmativas abaixo apenas uma **não** está correta. Assinale-a:

- A) A confidencialidade dos dados em uma pesquisa de base de dados não é um fator importante.
- B) A pesquisa deve ter o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu representante legal
- C) A utilização de placebo, em pesquisa com fármacos, deve ser **PLENAMENTE** justificada.
- D) A pesquisa deve estar fundamentada na experimentação prévia realizada em animais;
- E) As pesquisas a serem realizadas em populações indígenas devem ter o projeto aprovado pelo órgão competente (**FUNAI**).

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Nos casos em que a pesquisa envolve **APENAS** questionário aplicado a pacientes, o consentimento informado deve fazer parte do protocolo de pesquisa.
- B) Considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa.
- C) Respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades.
- D) As pesquisas realizadas em situação de emergência devem ter, obrigatoriamente, o consentimento informado (ou livre e esclarecido) assinado pelo paciente (pesquisado), senão a pesquisa estará inviabilizada.
- E) O comitê de ética em pesquisa das instituições deve ser multidisciplinar.