

Caderno de Prova



7 de abril



das 14 às 18 h



4 h de duração*



40 questões



P6

Enfermeiro da Família



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

1. Os visitantes de um centro comercial puderam visitar uma exposição de peças feitas de cerâmica, produzidas por alunos e oleiros-figueiros, que mostram aspectos da vida, história e cultura josefenses.



Fonte: Prefeitura Municipal de São José. Disponível em: <http://www.pmsj.sc.gov.br>

Esta exposição, realizada no mês de março, é uma homenagem à (ao):

- a. () Vinda dos primeiros imigrantes italianos.
- b. () Semana de Arte Moderna Josefense.
- c. (X) Aniversário da cidade de São José.
- d. () Aniversário de fundação de Florianópolis.
- e. () Aniversário da criação da primeira cerâmica de São José.

2. Segundo o estudo recentemente divulgado (Demografia Médica no Brasil), a presença de médicos no SUS é insuficiente.

Assinale a alternativa que indica, de acordo com este estudo, a proporção de médicos, para cada mil habitantes, nos serviços públicos no Brasil.

- a. () 0,57 médico para cada mil habitantes.
- b. (X) 1,11 médico para cada mil habitantes.
- c. () 2 médicos para cada mil habitantes.
- d. () 3 médicos para cada mil habitantes.
- e. () 4,11 médicos para cada mil habitantes.

3. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou recentemente estado de emergência de saúde pública no Estado.

A causa desta medida foi um grave surto de uma doença. Qual?

- a. () AIDS
- b. () Cólera
- c. () Febre Amarela
- d. () Dengue
- e. (X) Gripe

4. O cenário político agitou-se, há algumas semanas, pelo lançamento da REDE.

Do que se trata?

- a. (X) De um novo partido político que tem a liderança da ex-senadora Marina da Silva.
- b. () De um novo partido político que tem a liderança do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.
- c. () Uma aliança de partidos de esquerda que pretende combater os políticos de direita no Congresso Nacional.
- d. () Um grupo de políticos, comandados pela ex-senadora Marina da Silva, que promete apoiar todas as iniciativas governamentais, em troca da aprovação de seus projetos na área ambiental.
- e. () Uma rede nacional de computadores que pretende vigiar todo o território brasileiro, buscando interromper a devastação das nossas florestas.

5. No final do ano passado os palestinos comemoraram uma importante vitória diplomática. Qual?

- a. () A ONU reconheceu ser Jerusalém capital do Estado Palestino.
- b. () A ONU reconheceu a Palestina como Estado Soberano.
- c. (X) A ONU garantiu à Palestina o status de “Estado Observador”.
- d. () Os palestinos ganharam o reconhecimento internacional como Estado independente.
- e. () Israel reconheceu, incondicionalmente, o direito de os palestinos terem um Estado nos territórios hoje ocupados.

6. Julgamento no Supremo Tribunal Federal considerado, pela contribuição que deu ao combate à corrupção, o mais importante para a vida política do país, em 2012:

- a. (X) Ação penal 470.
- b. () Dissolução do casamento civil.
- c. () Separação entre a Igreja e o Estado.
- d. () Casamento de pessoas do mesmo sexo.
- e. () Constitucionalidade do regime de cotas raciais nas Universidades.

7. Chelyabinsk, na Sibéria, a cerca de 1500 quilômetros de Moscou, foi palco no mês de fevereiro de um inusitado fenômeno. Qual?

- a. () A queda do asteroide 2012DA14 que passou a 28 mil quilômetros da Terra.
- b. () A explosão da primeira bomba nuclear da História.
- c. () A explosão da torre de lançamento da estação espacial Myr que causou ferimentos em centenas de pessoas e enormes prejuízos econômicos à região.
- d. (X) A queda de um meteoro que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
- e. () A queda de um míssil perdido norte-americano que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.

8. Em 2010, o presidente Barack Obama apresentou ao país uma nova doutrina de segurança nacional que, de certa forma, em muito diverge da do seu antecessor George W. Bush.

Assinale a alternativa que indica alguns dos objetivos da nova doutrina de segurança de Washington.

- a. () O desarmamento dos Estados Unidos, a recondução dos Estados Unidos à liderança mundial, o desestímulo às importações.
- b. (X) O desarmamento nuclear, a promoção da paz e da segurança, e a preservação do planeta.
- c. () O aumento da capacidade de defesa dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental.
- d. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental sem prejuízo à economia norte-americana.
- e. () O aumento da capacidade nuclear dos Estados Unidos, a promoção da paz e segurança interna e a preservação ambiental com a adesão sem ressalvas aos tratados de redução de gases causadores do efeito estufa.

9. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgou recentemente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.

Os 5 países que obtiveram o melhor índice foram, respectivamente:

- a. () Austrália, Estados Unidos da América, Holanda, Israel e Alemanha.
- b. () Holanda, Alemanha, Noruega, Austrália e Estados Unidos da América.
- c. () Estados Unidos da América, Noruega, Austrália, Holanda e Argentina.
- d. () Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Alemanha e Brasil.
- e. (X) Noruega, Austrália, Estados Unidos da América, Holanda e Alemanha.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. De acordo com o artigo 5º da Lei 8080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, identifique as afirmativas abaixo que expressam os objetivos do Sistema Único de Saúde:

1. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
2. o aumento da capacidade da rede de atenção por meio da instalação de complexos de média complexidade, policlínicas e das unidades de pronto-atendimento.
3. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
4. a formulação de políticas públicas direcionadas exclusivamente ao atendimento da demanda espontânea nos centros de saúde da atenção básica.
5. o fortalecimento da rede hospitalar e do corpo clínico para que a atenção de alta complexidade seja a porta de entrada preferencial ao Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

12. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, Estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.

Em relação ao Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, é **correto** afirmar:

- a. () O Pacto pela Vida está descrito pela Portaria Ministerial conhecida como NOAS/2012.
- b. () O Pacto em Defesa do SUS tem como ação prioritária a ampliação da oferta de serviços em saúde e exames complementares por meio do fortalecimento das relações entre o setor público e as entidades privadas.
- c. () O Pacto pela Gestão do SUS estabelece as diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da centralização do poder administrativo; da municipalização, com oferta de serviços de alta e média complexidade em todos os municípios brasileiros; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e Integrada – PPI; Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- d. (X) O fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, faz parte das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida.
- e. () O Fortalecimento da Atenção Hospitalar e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família é prioritário no Pacto pela Vida.

Enunciado das questões 13 e 14

Responda às questões 13 e 14, considerando a Política Nacional de Atenção Básica 2011 - Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

13. Qual das alternativas abaixo **não** corresponde às atribuições do enfermeiro descritas na Portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica?

- a. () Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.
- b. (X) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- c. () Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- d. () Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- e. () Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.

14. São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:

- 1. definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.
- 2. programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e a organização da agenda de trabalho compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários.
- 3. desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.
- 4. realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- 5. prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

15. A raiva é uma zoonose transmitida ao homem principalmente pelos cães, gatos e morcegos. Afeta todos os mamíferos suscetíveis ao vírus da raiva. É uma doença progressiva aguda e letal. A transmissão acontece quando o vírus, presente na saliva do animal infectado, penetra no organismo, através da pele ou das mucosas. Isso pode acontecer por meio do contato direto com a saliva desse animal, através da mordedura, arranhadura, lambedura ou por contato indireto (materiais contaminados). No meio rural, o morcego do tipo hematófago, que se alimenta de sangue, é o maior transmissor da doença para humanos, bovinos, equinos, suínos e macacos.

Em relação ao atendimento antirrábico em Santa Catarina, é **correto** afirmar:

- a. () A vacinação antirrábica faz parte do calendário básico de vacinação da criança, sendo contraindicada sua aplicação em adultos.
 - b. (X) A vacinação ainda é a melhor forma de prevenção. Porém, as campanhas de vacinação para cães e gatos são recomendadas para áreas endêmicas ou onde haja risco para raiva de ciclo urbano, o que não é o caso de Santa Catarina.
 - c. () Caso haja agressão por cães, gatos ou outros animais, independentemente da gravidade, deve-se lavar o ferimento com água e sabão e indicar a aplicação de duas doses de vacina antirrábica.
 - d. () No caso de uma agressão por cães e gatos com sinais clínicos compatíveis com raiva, indicar sete doses de vacina antirrábica associada à administração de soro antirrábico.
 - e. () No caso de morte do animal após o período de observação, deve ser enviado para laboratório tecido nervoso central, para diagnóstico viral, e indicar a aplicação de soro antirrábico e 1 dose de vacina antirrábica.
- 16.** A rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade. Clinicamente é caracterizada por exantema máculo-papular e puntiforme difuso, iniciando-se na face, couro cabeludo e pescoço, alastrando-se posteriormente para tronco e membros.

Em relação à rubéola, é **correto** afirmar:

- a. () A vacina contra a rubéola está contraindicada em pessoas com 40 anos ou mais ou com história de infertilidade.
- b. () A vacina está indicada a todas as gestante durante o pré-natal, objetivando-se, com isso, reduzir a incidência da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC).
- c. () As vacinas disponíveis contra a rubéola são produzidas a partir de fragmentos do núcleo da bactéria Wistar RA 27/3 atenuados, apresentados em frasco-ampola na forma liofizada.
- d. (X) Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas como cardiopatias, catarata e surdez, denominada Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) quando a infecção ocorre durante na gestação.
- e. () A rubéola é uma doença grave, cujo tratamento exige internação hospitalar e administração de antibióticos por via intravenosa, além da aplicação de imunoglobulina específica antirrubéola.

17. A maioria dos métodos anticoncepcionais atua de forma a prevenir a gravidez antes ou durante a relação sexual. A Anticoncepção de Emergência (AE) é um método anticoncepcional que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O método, também conhecido por "pílula do dia seguinte", utiliza compostos hormonais concentrados e por curto período de tempo, nos dias seguintes da relação sexual.

Em relação à contracepção emergencial, é **correto** afirmar:

- a. () A AE possui uma taxa de falha insignificante e não produz efeitos secundários indesejados.
- b. () A AE pode ser utilizada de forma planejada, previamente programada, substituindo outros métodos anticoncepcionais de rotina.
- c. () AE atua após a fecundação e impede a implantação do óvulo fecundado no útero, sendo, por este motivo, considerado um método abortivo.
- d. () Todas as mulheres podem usar o método com segurança, mesmo aquelas que, habitualmente, tenham contra-indicações ao uso de anticoncepcionais hormonais combinados
- e. (X) Sua utilização é recomendada em casos de relação sexual sem uso de método anticoncepcional, falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do anticoncepcional e abuso sexual.

18. Assinale a alternativa **incorreta** sobre o direito à saúde, observando a Lei Orgânica do Município de São José:

O direito à saúde implica os seguintes princípios fundamentais:

- a. () Opção quanto ao tamanho da prole.
- b. () Meio ambiente preservado e poluição ambiental controlada.
- c. (X) Acesso universal, integral e equitativo às ações e serviços para a promoção de saúde e prevenção de doenças em detrimento das ações assistenciais curativas.
- d. () Serviço público de assistência à saúde gratuito.
- e. () Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, educação, alimentação, transporte e lazer.

19. Analise o resultado da colpocitologia oncótica de uma mulher de 22 anos, hígida, nulípara, em uso de contracepção oral combinada:

- Adequabilidade da amostra: satisfatória.
- Epitélios representados na amostra: escamosos, glandulares.
- Microbiologia: Lactobacilos sp.
- Alterações celulares benignas reativas ou reparativas: inflamação.
- Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero (2011), qual a conduta preconizada diante do resultado dessa colpocitologia oncótica?

- a. (X) Repetir a coleta da colpocitologia oncótica em 6 meses.
- b. () Referir ao serviço de urgência hospitalar.
- c. () Referir ao ginecologista imediatamente.
- d. () Encaminhar para exame colposcópico para biópsia e conização da lesão.
- e. () Encaminhar ao cirurgião para realização de conização.

20. O câncer de mama e o câncer de colo uterino são os cânceres ginecológicos que mais matam mulheres no país. Entretanto, durante toda a vida, apenas metade das mulheres realiza pelo menos um exame preventivo de câncer de colo uterino e apenas um terço das mulheres serão submetidas a um único exame de mamografia.

São fatores de risco para o câncer de mama:

- a. () Amamentação e multiparidade.
- b. () Ocorrência de mastite durante o puerpério.
- c. () Sexo masculino e uso prolongado de DIU contendo progestágeno por mulheres em idade fértil.
- d. (X) Sexo feminino, menarca precoce, nuliparidade e terapia de reposição hormonal.
- e. () História familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau e antecedentes obstétricos de abortos de repetição.

21. Mariana é moradora de São José, está com 12 meses de idade e foi encaminhada ao Centro de Saúde pela Agente Comunitária de Saúde do bairro por apresentar esquema vacinal incompleto.

Observe a situação vacinal da criança e responda:

Vacina	Idade aplicada
Vacina BCG	Ao nascer
Vacina Hepatite B (HB)	Ao nascer e aos 2 meses
Vacina Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Pertussis – DTP)	Nenhuma dose aplicada
Vacina DTP/HB/Hib (Tetra)	Aos 2 e aos 4 meses
Vacina DTP/HB/Hib (Penta)	Nenhuma dose aplicada
Vacina Oral contra a Poliomielite (Sabin/VOP)	Aos 2 e aos 4 meses
Vacina Injetável contra a Poliomielite (VIP)	Nenhuma dose aplicada
Vacina oral de Rotavírus Humano (VORH)	Aos 2 e aos 4 meses
Vacina Pneumocócica 10 Valente (Pnc10V)	Nenhuma dose aplicada
Vacina Meningocócica Conjugada C (Men C)	Aos 3 e aos 5 meses
Vacina Febre Amarela (FA)	Nenhuma dose aplicada
Vacina Tríplice Viral – Sarampo, Rubéola e Caxumba	Nenhuma dose aplicada

Quais vacinas devem ser administradas a Mariana no Centro de Saúde?

- Aplicar somente a vacina contra a febre amarela.
- 1 dose de vacina DTP/HB/Hib (Penta), 1 dose da vacina Oral contra a Poliomielite (Sabin/VOP), 1 dose da vacina Pneumocócica 10 Valente (Pnc10V), 1 dose da vacina Meningocócica Conjugada C (Men C) e 1 dose da vacina Tríplice Viral – Sarampo, Rubéola e Caxumba
- 1 dose de reforço da vacina BCG, 1 dose de vacina DTP/HB/Hib (Penta), 1 dose vacina Injetável contra a Poliomielite (VIP), e 1 dose da vacina Febre Amarela (FA)
- Reiniciar o esquema vacinal de todas as vacinas pois o tempo de atraso para vacinação de reforço é superior a 2 meses
- Aplicar somente 1 dose de vacina Tríplice Viral – Sarampo, Rubéola e Caxumba e aprazar as doses atrasadas para outra oportunidade pois não é recomendado administrar multidoses de vacinas no mesmo dia.

22. Em relação aos exames solicitados durante a consulta de pré-natal de baixo risco, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Exame

- Coombs indireto
- VDRL
- HbsAg
- Anti-HIV
- Rubéola IgG
- Glicemia

Coluna 2 Indicação

- Exame indicado para o diagnóstico e seguimento terapêutico de sífilis.
- Detecta a presença de anticorpos específicos para rubéola na corrente sanguínea. Quando o resultado for reagente, indica imunidade adquirida por meio de vacinação ou exposição ao vírus.
- Indicado para gestantes com tipagem sanguínea Rh negativo.
- Exame solicitado para investigar hepatite B.
- Exame que indica a dosagem sérica de glicose.
- Exame que se destina ao diagnóstico e consequente profilaxia da Transmissão Vertical do vírus da imunodeficiência humana.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
- 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5
- 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4
- 3 – 2 – 4 – 6 – 5 – 1
- 6 – 5 – 3 – 2 – 4 – 5

23. Durante o atendimento a uma mulher com 12 semanas de gestação, a enfermeira identifica que a maior parte dos exames rotineiros de primeiro trimestre estão dentro dos parâmetros de normalidade, exceto a glicemia de jejum, cujo resultado foi 98 mg/dl.

Frente a esta constatação, considerando as diretrizes do Caderno de Atenção Básica 32 – Atenção ao Pré-natal de baixo risco, qual a conduta a ser adotada no atendimento sequencial desta gestante pela equipe de saúde?

- a. (X) Rastreamento positivo para Diabetes gestacional: realizar confirmação diagnóstica solicitando o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 75g entre 24 e 28 semanas de gestação.
- b. () Rastreamento negativo para diabetes gestacional: seguir o atendimento de pré-natal com a solicitação de novos exames complementares apenas no segundo trimestre de gestação, conforme rotina.
- c. () Rastreamento positivo para diabetes gestacional: solicitar nova glicemia em jejum no puerpério.
- d. () Rastreamento positivo para diabetes gestacional: solicitar hemoglobina glicada e perfil lipídico durante a gestação.
- e. () Rastreamento negativo para diabetes gestacional: solicitar novos exames de rotina apenas no final do terceiro trimestre de gestação.

24. A redução da mortalidade infantil, especialmente do componente neonatal, é uma prioridade do governo federal, expressa pela Agenda de Compromissos pela Saúde firmada em reunião da Comissão Intergestora Tripartite, assim como a promoção da saúde integral da criança. Nesta direção, o aleitamento materno foi considerado tema fundamental para a promoção da saúde da criança. No que diz respeito ao incentivo ao aleitamento materno, o Brasil tem situação de destaque no contexto internacional.

Identifique abaixo as ações de promoção do aleitamento materno desenvolvidas no Brasil.

1. Garantia às mães de 120 dias de licença maternidade, sem prejuízo do emprego e salário, bem como o direito, quando do retorno ao trabalho, a uma pausa de 1 hora por dia para amamentar seu filho até os 6 meses de idade.
2. A Semana Mundial de Amamentação, por ser um marco internacional que repercute nacionalmente como um grande incentivador do aleitamento materno.
3. A “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC), idealizada em 1990 pela OMS e UNICEF, que estimula e certifica as instituições que adotam as práticas de promoção, proteção e apoio à amamentação.
4. Bancos de Leite Humano, cuja principal ação é apoiar as mulheres que desejam amamentar seus filhos e nesse processo, além de conseguir prolongar a amamentação, muitas descobrem ou aprendem a identificar o excesso de leite e se tornam doadoras.
5. O “Dia Nacional de Doação de Leite Humano”, para estimular as doações, considerando que o leite humano pasteurizado no Brasil é seguro e atende prioritariamente os recém-nascidos prematuros e/ou os que por algum motivo necessitam de internação em Unidades Neonatais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), considerando as contraindicações relativas ou absolutas ao uso de anticoncepcionais orais combinados.

- Mulheres acima de 35 anos, com consumo superior a 15 cigarros/dia.
- Mulheres com hipertensão arterial crônica com níveis pressóricos sustentadamente elevados, superiores a 140/90 mmHg.
- Uso por adolescentes hígdas.
- Uso por mulheres com doença hepática aguda.
- Uso por mulheres com sangramento uterino anormal de origem desconhecida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – V – V – F
- b. V – V – V – F – F
- c. V – V – F – V – V
- d. V – F – V – F – V
- e. F – F – F – F – F

26. Os benefícios da amamentação são amplamente discutidos e o incentivo ao aleitamento materno é responsabilidade de toda equipe de saúde na atenção à saúde da criança. Em poucas situações a amamentação é absolutamente ou parcialmente contraindicada.

Assinale a alternativa que **não** representa uma contraindicação para amamentação.

- a. Mães infectadas pelo HIV
- b. Mães portadoras de hanseníase
- c. Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2
- d. Mães com Doença de Chagas na fase aguda da doença
- e. Criança portadora de galactosemia

27. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável.

Segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o número adequado de consultas de pré-natal (baixo risco) deve ser igual ou superior a:

- a. 6 consultas.
- b. 9 consultas.
- c. 10 consultas.
- d. 12 consultas.
- e. 15 consultas.

28. O rastreamento para luxação congênita do quadril, nas primeiras consultas da criança (15 e 30 dias e 2 meses), pode ser realizado no exame físico por meio de 2 manobras.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** essas 2 manobras.

- a. Manobra de Adams e Laségue
- b. Manobras de Barlow e Ortolani
- c. Manobra de Elevação da perna esticada e Elevação bilateral da perna esticada
- d. Manobra de Hoover e Milgran
- e. Manobra de Patrick e Gaenslen

29. Assinale a alternativa que indica todos os parâmetros para avaliar o crescimento, constantes na Caderneta de Saúde da Criança.

- a. Perímetro cefálico (zero a 2 anos), peso para a idade e comprimento/estatura para a idade.
- b. Perímetro cefálico (zero a 2 anos) e índice de massa corporal (IMC) para a idade.
- c. Perímetro cefálico (zero a 2 anos), peso para a idade, comprimento/estatura para a idade e índice de massa corporal (IMC) para a idade.
- d. Perímetro cefálico (zero a 2 anos), perímetro braquial (zero a 2 anos), peso para a idade e comprimento/estatura para a idade.
- e. Peso para a idade e comprimento/estatura para a idade.

30. As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil.

Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, em relação aos tipos de hepatites virais.

Coluna 1 Hepatite

1. Tipo A
2. Tipo B
3. Tipo C
4. Tipo D
5. Tipo E

Coluna 2 Descrição

- () É causada por um vírus defectivo, satélite do HBV, ou seja, é uma infecção que depende funcionalmente da Hepatite B.
- () A principal via de contágio do vírus é a fecal-oral; ocorre também por contato inter-humano ou através de água e alimentos contaminados. A doença é autolimitada e de caráter benigno. Menos de 0,1% dos casos pode evoluir para hepatite fulminante, sendo que este percentual aumenta em idades mais avançadas.
- () A transmissão do vírus se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível. Existe vacina e imunoglobulina específicas.
- () Sua transmissão ocorre principalmente por via parenteral (compartilhamento de agulhas contaminadas, materiais perfurocortantes em geral). A transmissão sexual é pouco frequente.
- () O vírus é de transmissão fecal-oral. A transmissão interpessoal não é comum. A doença é autolimitada e pode apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 4 – 5 – 3
- b. () 3 – 1 – 4 – 5 – 2
- c. () 3 – 5 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 1 – 2 – 3 – 5
- e. () 4 – 1 – 3 – 2 – 5

31. Assinale a alternativa **correta** em relação à assistência e ao tratamento para os casos de HIV/aids, no Brasil.

- a. (X) Tendo em vista o desejo das pessoas que vivem com HIV/aids de terem filhos, em 2010 foram publicadas diretrizes de reprodução, para garantir os direitos sexuais e reprodutivos.
- b. () A maior parte dos medicamentos antirretrovirais são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde.
- c. () Os medicamentos antirretrovirais distribuídos no Brasil são considerados defasados em relação às recentes descobertas e novos medicamentos desenvolvidos em países como os Estados Unidos da América e o Japão.
- d. () Os laboratórios que realizam exames de carga viral estão concentrados em 25% das capitais brasileiras.
- e. () O número de serviços especializados para pessoas vivendo com HIV/aids estagnou, não aumentou desde o ano de 2007.

32. O pé diabético é uma complicação crônica do Diabetes mellitus. Cabe ao Enfermeiro acrescentar, na consulta de enfermagem, o exame dos membros inferiores para identificação do pé em risco.

São orientações básicas para os cuidados dos pés:

1. Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a familiar ou usar espelho.
2. Lavar os pés diariamente, com água morna, evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos.
3. Andar descalço sempre que possível, em casa.
4. Cortar as unhas de forma oval.
5. Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou tecido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

33. São atribuições do Enfermeiro da Atenção Básica à Saúde no atendimento à saúde da pessoa idosa, **exceto**:

- a. Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- b. Realizar assistência domiciliar, quando necessário.
- c. Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
- d. Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- e. Orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

34. As unidades de saúde devem estar mobilizadas para detecção precoce e atenção aos casos de tuberculose. Um método diagnóstico fundamental, capaz de detectar 70-80% dos casos de tuberculose pulmonar é:

- a. O hemograma.
- b. O exame radiológico.
- c. A prova tuberculínica.
- d. O exame bacteriológico direto do escarro (baciloscopia).
- e. O teste ELISA.

35. Para enfrentar a pandemia da Influenza A(H1N1) o Ministério da Saúde recomenda a adoção de medidas de prevenção, por todos os membros das equipes de saúde.

Não é considerada medida preventiva:

- a. Frequente higienização das mãos.
- b. Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
- c. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
- d. Utilizar máscaras cirúrgicas durante o atendimento de pacientes com síndrome gripal.
- e. Circular dentro das Unidades de Saúde utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

36. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos procedimentos para a medida da pressão arterial.

- Deve certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga vazia e não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos.
- O paciente deve estar sentado com as pernas cruzadas.
- Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para baixo.
- Deve explicar o procedimento ao paciente, orientando-o para que não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – V – V
- b. V – V – F – V
- c. V – F – F – V
- d. F – V – V – V
- e. F – F – V – V

37. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública.

Sobre a forma de transmissão da hanseníase, assinale a alternativa **correta**.

- a. A transmissão via relações sexuais.
- b. A transmissão se dá por via parenteral.
- c. A transmissão é hereditária (congenita).
- d. A transmissão se dá por meio do contato do homem com a urina de um rato portador do bacilo.
- e. A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente, sem tratamento, que elimina o bacilo, principalmente pelas vias áreas superiores, para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.

38. A biossegurança compreende um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes a atividades de:

1. Pesquisa.
2. Desenvolvimento Tecnológico.
3. Prestação de Serviços.
4. Produção.
5. Ensino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

39. Assinale a alternativa que indica o direito que **não** consta do Código de Ética dos profissionais de enfermagem.

- a. () Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- b. () Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem para obtenção de medidas cabíveis de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
- c. () Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- d. (X) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas.
- e. () Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

40. Assinale a alternativa que representa uma incumbência privativa do Enfermeiro, segundo o Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987.

- a. (X) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- b. () Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH).
- c. () Prestação da assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- d. () Acompanhamento da evolução do trabalho de parto.
- e. () Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>