

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

A respeito da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a opção correta.

- A** O Programa Saúde da Família, uma das linhas de atuação do Programa Brasil Sorridente, promove o deslocamento de agentes de saúde e especialistas até a comunidade, permitindo, assim, a integralidade das ações de atenção básica de saúde bucal.
- B** De acordo com o organograma de funcionamento da Política Nacional de Saúde Bucal, o paciente portador de necessidades especiais não poderá ser atendido pela atenção básica de saúde bucal, devendo ser atendido pela atenção especializada, inserida na política do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência.
- C** O Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde e o Conselho de Saúde Suplementar, foi o responsável por criar a Política Nacional de Saúde Bucal.
- D** As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal visam, entre outros aspectos, a universalidade e a integralidade da atenção à saúde bucal.
- E** Implementado juntamente com a Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa Brasil Sorridente objetiva ampliar o atendimento básico de saúde, melhorar o atendimento secundário e cuidar da saúde da família, distribuindo dentifrícios fluoretados em áreas que apresentam índice de CPO-D maior que 3.

### QUESTÃO 32

Acerca dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), criados com o intuito de promover a ampliação da atenção secundária de saúde bucal, assinale a opção correta.

- A** Os CEOs compõem a estrutura do Programa Brasil Sorridente e têm como função básica a atenção secundária e terciária da saúde bucal, por meio das especialidades odontológicas.
- B** Os CEOs trabalham pelo sistema da livre demanda, ou seja, o próprio paciente pode procurar atendimento especializado, conforme sua queixa principal.
- C** O governo federal, por meio de repasse pelo Ministério da Saúde, disponibiliza incentivo financeiro de sessenta mil reais para implementação de CEOs tipo II, recurso que deve ser utilizado para construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos odontológicos.
- D** Não cabe aos CEOs atender pacientes com suspeita de câncer bucal, uma vez que existem unidades próprias para isso, os chamados UNACONS ou CACONS.
- E** Os CEOs devem realizar uma produção mínima mensal de procedimentos em cada especialidade, definida na Portaria n.º 1.464/GM, de 2011.

### QUESTÃO 33

Em relação às ações da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a opção correta.

- A** No âmbito dessa política, as ações de recuperação do indivíduo buscam devolver capacidades perdidas e reintegrá-lo no ambiente social e nas atividades laborais.
- B** A organização da ação de fluoretação das águas compete ao Ministério da Saúde, que recebe os dados regionais por meio do trabalho dos agentes comunitários de saúde.
- C** Para melhor identificar os principais grupos de ações para promoção, proteção e recuperação da saúde, é necessário conhecer o perfil epidemiológico da população.
- D** Para permitir amplo acesso às ações educativas em saúde bucal, foram criados centros próprios, com infraestrutura adequada para aulas expositivas, videoconferências e “escovódromos”.
- E** Um fator que define a necessidade de aplicação tópica de flúor é a concentração de flúor na água consumida regularmente, sendo considerado baixo um valor de 2,5 ppm F.

### QUESTÃO 34

Um paciente de dezoito anos de idade, saudável, apresentou queixa de dificuldade de movimentação da língua. Ao exame físico, observou-se, durante o movimento de protrusão, desvio para o lado esquerdo.

Com base nessas informações, é correto afirmar que esse paciente apresenta lesão no nervo

- A** hipoglosso do lado direito.
- B** glossofaríngeo do lado direito
- C** lingual do lado esquerdo.
- D** hipoglosso do lado esquerdo.
- E** glossofaríngeo do lado esquerdo.

### QUESTÃO 35

Assinale a opção que apresenta o exame de imagem mais indicado para o estudo da hiperplasia condilar unilateral.

- A** tomografia computadorizada da ATM
- B** ultrassonografia da ATM
- C** radiografia transcraniana para ATM
- D** ressonância magnética da ATM
- E** radiografia panorâmica digital

### QUESTÃO 36

Assinale a opção que apresenta apenas anestésicos locais do tipo éster.

- A** benzocaína, etidocaína, ropivacaína e clorprocaína
- B** articaína, benzocaína, procaína e bupivacaína
- C** articaína, lidocaína, procaína e etidocaína
- D** lidocaína, etidocaína, bupivacaína e clorprocaína
- E** benzocaína, procaína, tetracaína e clorprocaína

**QUESTÃO 37**

Assinale a opção que apresenta condição patológica que contraindica o uso de anestésicos locais do tipo éster.

- A** diabetes melito descompensada
- B** síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)
- C** colinesterase plasmática atípica
- D** metemoglobinemia adquirida
- E** hipertermia maligna

**QUESTÃO 38**

Considere que, em uma situação laboratorial, tenha sido produzida solução anestésica com concentração de 6% de sal anestésico e vasoconstritor com diluição em solução anestésica de 1: 500.000 e essa solução tenha sido apresentada em uma ampola de 2 mL. Nessa situação, a quantidade correta de sal anestésico e de vasoconstritor é, respectivamente, igual a

- A** 120 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
- B** 12 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
- C** 12 mg/ampola e 0,004 mg/ampola.
- D** 60 mg/ampola e 0,002 mg/ampola.
- E** 120 mg/ampola e 0,004 mg/ampola.

**QUESTÃO 39**

Por meio do coagulograma completo, exame laboratorial complementar para cirurgia bucomaxilofacial solicitado especialmente no caso de procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral, é possível verificar

- A** o TTP (tempo de tromboplastina parcial), que permite identificar alterações na via intrínseca da cascata da coagulação.
- B** o RNI, conhecido como razão normalizada internacional, cuja fórmula parte do tempo de protrombina (TP) do paciente, importante na avaliação de pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais.
- C** casos de neutrofilia, isto é, aumento da quantidade de neutrófilos, comum em infecções odontogênicas crônicas.
- D** a contagem de plaquetas, que em um paciente adulto saudável varia de 100.000 a 200.000 células/mm<sup>3</sup> de sangue.
- E** os fatores de coagulação II, VII, IX e X, cuja produção depende da vitamina K.

**QUESTÃO 40**

Durante a realização de exame complementar radiográfico do tipo panorâmica dos maxilares, em paciente de trinta e cinco anos de idade, foi observada área radiolúcida de aproximadamente 1cm de diâmetro, delimitada por fina camada radiopaca envolvendo a coroa do dente 23, incluso em posição transalveolar.

Nesse caso, as hipóteses diagnósticas mais prováveis são

- A** cisto dentígero e osteossarcoma.
- B** odontoma complexo e ameloblastoma.
- C** cisto radicular e lesão periférica de células gigantes.
- D** odontoma composto e tumor odontogênico adenomatoide.
- E** cisto dentígero e tumor odontogênico adenomatoide.

**QUESTÃO 41**

Um paciente de trinta e quatro anos de idade, saudável, foi encaminhado para avaliação e tratamento no CEO próximo a sua residência, queixando-se, principalmente, de dor e inchaço, aproximadamente sete dias. Durante anamnese, o paciente relatou ter quebrado uma prótese fixa no dente 36 havia mais de dois anos, mas que não tinha, até então, procurado atendimento odontológico. Ao exame físico, observou-se ponto de flutuação na região de fundo de vestibulo bucal do referido dente, sem presença de fistula ou secreção.

Assinale a opção que apresenta a conduta mais adequada ao caso apresentado acima.

- A** profilaxia antibiótica; exodontia; drenagem via alveolar
- B** profilaxia antibiótica; incisão e drenagem do abscesso; colocação de dreno e manutenção por uma semana
- C** antibioticoterapia de largo espectro
- D** incisão extrabucal; drenagem do abscesso; instalação de dreno e manutenção por uma semana
- E** profilaxia antibiótica; incisão e drenagem do abscesso; colocação de dreno e manutenção por até setenta e duas horas

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 42**

Se, na realização de bloqueio anestésico realizado de maneira incorreta, a solução anestésica for deixada na saída do forame redondo, ocorrerá insensibilidade em

- A toda a mandíbula e no terço posterior da língua no lado anestesiado.
- B apenas a região de molares superiores do lado anestesiado.
- C toda a maxila e região de palato mole do lado anestesiado.
- D todos os dentes mandibulares do lado anestesiado, nos dois terços anteriores da língua e na mucosa vestibular dos dentes do lado anestesiado.
- E todo o globo ocular, na conjuntiva, nas glândulas lacrimais e em parte da mucosa nasal no lado anestesiado.

**QUESTÃO 43**

Acerca das medicações do grupo benzodiazepínico, indicadas para controle da ansiedade, especialmente em casos de cirurgia, assinale a opção correta.

- A São exemplos de drogas benzodiazepínicas o diazepam, o clonazepam, o buscopan e o fentanil.
- B A prescrição de benzodiazepínicos deve ser feita em receituário especial (em duas vias) contendo os dados completos do cirurgião dentista, do comprador e da própria medicação.
- C Os benzodiazepínicos atuam no sistema nervoso central como inibidores do GABA, reduzindo a capacidade de neurotransmissão e, conseqüentemente, diminuindo as reações químicas que provocam a ansiedade.
- D Além do efeito ansiolítico, os benzodiazepínicos podem produzir sedação, hipnose, relaxamento muscular e ação anticonvulsivante.
- E Os benzodiazepínicos são sempre indicados para pacientes ansiosos e não colaboradores, que devem começar a tomá-los, por via parenteral, na noite que antecede o procedimento cirúrgico.

**QUESTÃO 44**

Para a aplicação de anestesia geral, sempre que possível, e principalmente em cirurgias eletivas, faz-se necessária uma avaliação pré-anestésica. Nessa avaliação, o médico anestesista observa, entre outros aspectos, o estado físico do paciente. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A Mesmo pacientes com parada cardiorrespiratória são submetidos à avaliação de estado físico, sendo, nesse caso, classificados como ASA 6.
- B Em paciente ASA 2, poderá ser realizado qualquer tipo de procedimento cirúrgico sob anestesia geral, uma vez que esse tipo de paciente é saudável.
- C O paciente que apresenta *angina pectoris* estável, classificado como ASA 1, pode ser liberado pelo médico anestesista para submeter-se a quaisquer procedimentos cirúrgicos eletivos em cirurgia bucomaxilofacial.
- D O estado físico de paciente que se encontra hospitalizado é considerado ruim, sendo esse tipo de paciente automaticamente classificado como ASA 5.
- E O paciente com diabetes melito descompensada, classificado como ASA 3, deve tratar-se antes do procedimento cirúrgico eletivo.

**QUESTÃO 45**

Assinale a opção correta com relação às drogas anti-inflamatórias esteroidais.

- A Dada sua função antiedemogênica, é sempre recomendada a utilização de esteroides no transoperatório, a partir do início do procedimento cirúrgico.
- B É completamente proibido o uso de esteroides em pacientes com doenças autoimunes, pois, isso prejudicaria ainda mais as defesas do organismo, devido à ação imunossupressora dessas drogas.
- C Esteroides, quando prescritos no pós-operatório, devem ser utilizados por longos períodos de tempo, de modo que os efeitos terapêuticos sejam maiores que os efeitos colaterais.
- D Os esteroides atuam diretamente nas vias cicloxigenase e lipoxigenase, evitando a formação de prostaglandinas e leucotrienos, produtos finais da inflamação.
- E Os esteroides inibem a mobilização de fosfolípidios e a formação do ácido araquidônico, o que reduz a exacerbação do processo inflamatório.

**QUESTÃO 46**

Os produtos finais prostaglandinas e leucotrienos apresentam como efeitos importantes

- A hipotermia local e reparo de tecidos mineralizados, por aposição de células mesenquimais indiferenciadas.
- B macrocitose e aumento do pH local, devido à ativação do sistema de complemento.
- C constrição vascular e relaxamento muscular, em virtude da presença de óxido nítrico.
- D exsudação plasmática constante e dor, como consequência da potencialização das cininas.
- E leucopenia e diminuição do tempo de sangramento, devido a alteração na agregação plaquetária.

**QUESTÃO 47**

Uma paciente de trinta e oito anos de idade apresentou lesão pediculada em região labial inferior, de aproximadamente 8 mm em seu maior diâmetro, assintomática, de crescimento lento e coloração normal.

Para o diagnóstico dessa lesão, é indicada a biópsia

- A excisional, além da conservação da peça em solução de formol a 25%, em frasco duas vezes maior que a peça.
- B excisional, além da conservação da peça em solução de formol a 70%, em frasco duas vezes maior que a peça.
- C excisional, além da conservação da peça em solução de formol a 10%, em frasco dez vezes maior que a peça.
- D incisional, além da conservação da peça em solução de formol a 25%, em frasco dez vezes maior que a peça.
- E excisional, além da conservação da peça em solução de formol a 10%, em frasco duas vezes maior que a peça.

**QUESTÃO 48**

Uma paciente de vinte e três anos de idade compareceu a clínica de odontologia para exodontia de resto radicular do dente 34. Ao exame físico, o profissional percebeu palidez na mucosa palpebral e bucal. O resultado do exame laboratorial de sangue solicitado mostrou contagem de eritrócitos de  $3 \times 10^6$  /mm<sup>3</sup> e taxa de hemoglobina de 10 g/dL.

O diagnóstico mais provável para essa paciente é de

- A linfocitose.
- B leucopenia.
- C anemia.
- D agranulocitose.
- E trombocitopenia.

**QUESTÃO 49**

Na radiografia de rotina de uma paciente negra, foram observadas áreas radiolúcidas circunscritas, próximas, não havendo evidência de união com os ápices dos dentes anteriores da mandíbula, que se apresentaram com vitalidade pulpar. Essas são características clínicas e radiográficas de

- A displasia cementária periapical.
- B abscesso periodontal.
- C granuloma periapical.
- D cisto periapical.
- E fibroma ossificante.

**QUESTÃO 50**

No que se refere à utilização de fármacos por pacientes renais crônicos, assinale a opção correta.

- A Se o paciente faz uso de medicamento anticoagulante oral, como, por exemplo, o AAS, após liberação médica, tal droga deverá ser suspensa 48 horas antes do procedimento cirúrgico.
- B O uso da tetraciclina por esses pacientes deve ser evitado, porque tal droga promove aumento dos níveis de nitrogênio ureico do sangue. As penicilinas e a clindamicina, por sua vez, podem ser utilizadas, desde que o médico corrija a dosagem e(ou) o intervalo.
- C Deve-se evitar a prescrição, para esses pacientes, de qualquer anestésico que contenha vasoconstritor, especialmente a felipressina.
- D Se o paciente estiver em terapia de diálise, será obrigatória a realização de profilaxia antibiótica, preferencialmente com 2 g de amoxicilina, via oral, uma hora antes da intervenção cirúrgica.
- E Havendo indicação cirúrgica, o paciente deve ser submetido à cirurgia o mais rapidamente possível, em sessão única, para evitar o uso demasiado de medicações, em várias sessões.

**QUESTÃO 51**

Considerando que durante o processo de exodontia, a raiz mesial do dente 26 tenha sido a fraturada pelo cirurgião, e que esse fato tenha resultado na intrusão desse fragmento no seio maxilar homolateral, assinale a opção correta.

- A A manobra de Valsava está indicada para auxiliar na remoção da raiz.
- B Os nervos alveolares superiores, palatino e pterigomandibular deverão ser anestesiados para essa cirurgia.
- C Os ramos dos pares cranianos de nervos V e VII estarão envolvidos nessa cirurgia.
- D Por se tratar de uma cirurgia considerada limpa, apenas o uso de analgésicos será recomendado no pós-operatório.
- E O acesso mais recomendado para a retirada dessa raiz mesial é o acesso de Caldwell Luck.

**QUESTÃO 52**

Um paciente com vinte e oito anos de idade que tinha sofrido um acidente automobilístico havia aproximadamente duas horas recebeu os primeiros atendimentos hospitalares na unidade de trauma, onde recebeu os cuidados ATLS. Esse paciente foi diagnosticado com Glasglow 14, trauma leve de crânio e de face. Em seguida, ele foi avaliado pelo cirurgião bucomaxilofacial, que observou o seguinte quadro: sangramento discreto pelo nariz e parestesia na região do nervo infraorbitário esquerdo, má oclusão e hematoma sublingual à esquerda e lesões cortocontusas em face.

Acerca do caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

- A Anestesia dos ramos do nervo facial está indicada para instalação de aparelho do tipo barras de Erich e para um possível bloqueio maxilomandibular.
- B Fios de sutura multifilamentados do tipo seda 3.0 são os mais indicados para possíveis suturas cortocontusas na pele desse paciente.
- C O fato de o paciente apresentar o olho esquerdo com diplopia e limitação dos movimentos para baixo é indicativo de que houve fratura de assoalho de órbita esquerda associado ao encarceramento de mucosa sinusal.
- D O cirurgião deve solicitar radiografia de face tipo Hirtz, para confirmar o diagnóstico de fratura de órbita.
- E Caso o referido paciente apresente desocclusão do lado esquerdo e mordida cruzada homolateral, uma radiografia com incidência do tipo Towne está indicada para diagnosticar uma possível fratura de côndilo.

**QUESTÃO 53**

Assinale a opção correta a respeito das técnicas e táticas da cirurgia bucomaxilofacial.

- A A extração dos dentes caninos e incisivos deve ser realizada com o fórceps de número 1, e a dos pré-molares inferiores, com o fórceps número 150.
- B O acesso cirúrgico do ápice dentário de um primeiro pré-molar superior poderá ser realizado pelo acesso do tipo Wassmund ou, ainda, pelo acesso do tipo semilunar.
- C Apreensão, deslocamento vestibular e palatino, rotação e avulsão são movimentos adequados para a exodontia de um dente 24 em posição normal.
- D Limas endodônticas, periótomos, fórceps 201 e alavancas retas são instrumentos auxiliares para a extração de remanescentes de raízes fraturadas.
- E Segundo a classificação de Pell e Gregory, na impacção classe 1, o terceiro molar está completamente envolvido por osso do ramo mandibular e, na impacção classe A, o plano oclusal do siso impactado está no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar.

**QUESTÃO 54**

A classificação das fraturas do terço médio da face proposta no século XIX por René Le Fort é ainda utilizada em traumatologia bucomaxilofacial. No entanto, as características atribuídas às fraturas sofreram alterações ao longo dos anos, novas tecnologias. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A Tratando-se de fratura Le Fort II, o traço de fratura passa bilateralmente pelas suturas, frontozigomáticas e há comprometimento dos arcos zigomáticos.
- B A fratura Le Fort III é diagnosticada por meio de exame clínico e radiografia do tipo PA de face.
- C O diagnóstico da fratura Le Fort II, também chamada fratura piramidal de face, é realizado por exame clínico e tomografia computadorizada de face (janela para tecido ósseo).
- D Narizes em sela, alongamento da face, rinoliorreia são aspectos associados à fratura do tipo Le Fort I.
- E A fratura Le Fort I causa parestesia do infraorbitário bilateral, blefaro-hematoma bilateral e rinorragia.

**QUESTÃO 55**

Considere que determinado paciente, submetido à exodontia de terceiro molar inferior, tenha retornado ao consultório no terceiro dia pós-operatório com forte dor local e que, ao exame clínico, o profissional que o atendeu tenha notado sítio cirúrgico com tecido necrótico e secreção purulenta. Nesse caso, o diagnóstico mais provável e o tratamento de escolha são, respectivamente,

- A pericoronarite e bochecho com clorexidina 0,12%.
- B alveolite seca e bochecho com água oxigenada 10 volumes.
- C alveolite purulenta e prescrição de antibiótico.
- D alveolite seca e prescrição de antibiótico.
- E pericoronarite e prescrição de antibiótico.

**QUESTÃO 56**

A respeito da terapêutica de suporte à dor utilizada para as cirurgias bucomaxilofaciais, assinale a opção correta.

- A A utilização de corticoide antes da cirurgia tende a elevar a quantidade de analgésico a ser administrado ao paciente no pós-operatório.
- B No pós-operatório de um paciente com úlcera gástrica, deve-se utilizar um anti-inflamatório não esteroide (AINES).
- C Os derivados da codeína são mais indicados para pacientes com dores leves.
- D A utilização da dipirona sódica é contraindicada a pacientes hipertensos, uma vez que o medicamento eleva a pressão sanguínea.
- E Os derivados do ácido acetilsalicílico apresentam como efeito colateral a alteração da função plaquetária.

**QUESTÃO 57**

Considere que um paciente de treze anos de idade, vítima de queda da própria altura, tenha sido conduzido ao pronto-socorro com ferimento corto-contuso na base do mento, com mordida aberta anterior e com trismo mandibular. Nessa situação, o diagnóstico mais provável é de

- A fratura parasinfisária na mandíbula.
- B fratura mandibular na linha média.
- C fratura condilar bilateral.
- D deslocamento dos incisivos para lingual.
- E fratura maxilar com impacção na região dos incisivos e deslocamento inferior na região dos molares.

**QUESTÃO 58**

A respeito de exames complementares para a realização de diagnósticos em pacientes vítimas de trauma, assinale a opção correta.

- A A radiografia panorâmica permite visualizar fraturas em toda a extensão da mandíbula, incluindo-se os côndilos.
- B O exame radiográfico periapical completo deve ser solicitado no primeiro atendimento, para verificar possíveis fraturas dentárias em caso de fraturas faciais complexas.
- C Em pacientes inconscientes, é mais indicada a realização de radiografias póstero-anteriores.
- D A técnica de Hirtz com incidência sub-mento-vértex é indicada para pacientes com fraturas de linha média mandibular.
- E A incidência póstero-anterior conhecida como técnica de Towne causa um alongamento na imagem, impedindo a visualização de fraturas em sínfise mandibular.

**QUESTÃO 59**

De acordo com as normas de obtenção de imagens utilizadas em odontologia, assinale a opção correta.

- A O método de Clark, embasado no princípio do paralelismo, possibilita, com uma tomada radiográfica apenas, a determinação de qual objeto está mais próximo do filme.
- B Para se determinar o comprimento dos implantes dentários a serem utilizados, deve-se solicitar a radiografia panorâmica mapeada para implantes, exame que fornece com precisão as medições necessárias.
- C Os aparelhos de raio-x utilizados atualmente erradiam apenas a região a ser examinada, não sendo necessária, portanto, a utilização de aventais de chumbo.
- D A tomografia computadorizada, que permite visualizar mais detalhes que a radiografia convencional, pode ser indicada para gestantes, uma vez que não utiliza radiação ionizante.
- E A ecografia é indicada para a análise de alterações volumétricas em tecidos moles do organismo humano, como, por exemplo, as glândulas salivares maiores.

**QUESTÃO 60**

No que concerne a implantes dentários, assinale a opção correta.

- A O tratamento de superfície feito nos implantes visa, entre outros objetivos, transformar a qualidade de osso do tipo V em tipo IV.
- B Considera-se normal que nos implantes que tenham sofrido osseointegração haja perda óssea peri-implantar de até aproximadamente 5 mm no primeiro ano de pós-operatório.
- C É possível melhorar o travamento primário por meio da diminuição da quantidade de fresas, suprimindo-se, por exemplo, a utilização da fresa *countersink* em ossos tipo I ou II.
- D Como, durante a fresagem, a irrigação excessiva com soro fisiológico pode causar o aquecimento e necrose óssea do local, a irrigação intermitente é a mais indicada nesse caso.
- E A inclinação vestibulo-lingual do implante deve, preferencialmente, coincidir com o eixo de força mastigatória, fato que aumenta a longevidade do implante.

**QUESTÃO 61**

Assinale a opção correta no que se refere aos implantes dentários.

- A Se, após a segunda semana de cirurgia, não houver inflamação, pode-se proceder à instalação de carga imediata.
- B Nos implantes unitários imediatos, é recomendada a ativação da carga de oclusão em 100%.
- C No momento da implantação o implante não pode apresentar nenhuma mobilidade.
- D Osso tipo IV apresenta travamento primário melhor que osso tipo I.
- E A ausência de áreas radiolúcidas peri-implantar em exame radiográfico sem distorção relaciona-se a um bom prognóstico.

**QUESTÃO 62**

Acerca de aspectos relevantes em urgências e emergências em odontologia, assinale a opção correta.

- A Para pacientes com angina peitoral, sinal de infarto, é indicada a utilização sublingual de amino glicosídeos.
- B A posição de decúbito dorsal com membros inferiores mais elevados auxilia a perfusão sanguínea no cérebro, sendo indicada para pacientes com distúrbios do tipo lipotímia.
- C A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada o mais rapidamente possível toda vez que o profissional perceber que o paciente perdeu a consciência, para evitar danos por falta de oxigenação no cérebro.
- D As reações anafiláticas podem ser tratadas, inicialmente, por meio da administração de dose de 3 mL de adrenalina 1:1000 por via subcutânea.
- E Leucocitose acima de 15.000 mm<sup>3</sup> pode ser indicativo de quadro de diabetes.

**QUESTÃO 63**

Assinale a opção correta, a respeito de biossegurança.

- A O uso de equipamento de proteção individual tem a finalidade de impedir que microrganismos provenientes de pacientes, por meio de sangue, fluidos orgânicos, secreções e excreções, contaminem o profissional de saúde.
- B Utiliza-se a desinfecção quando se objetiva destruir todos os microrganismos presentes em determinado material ou superfície.
- C A esterilização pode ser realizada em autoclave, que utiliza calor seco, ou em estufa que utiliza calor úmido, sendo mais indicado o uso de estufa para esse fim.
- D Hepatite B, hepatite C, leishmaniose, herpes, AIDS e tuberculose podem ser adquiridas por contaminação na prática odontológica.
- E Conforme o risco de transmissão de infecção e a necessidade de esterilização ou desinfecção, os instrumentos cirúrgicos, são classificados em duas categorias: críticos ou semicríticos.

**QUESTÃO 64**

Assinale a opção que apresenta a ordem cronológica correta dos estágios do processo de cicatrização dos tecidos.

- A agregação plaquetária, hemostasia e coagulação
- B trauma inflamatório, hemostasia, fibroplastia e regeneração
- C edema, hemostasia e agregação plaquetária
- D fibroblástico, de remodelação e inflamatório
- E inflamatório, fibroblástico e de remodelação

**QUESTÃO 65**

Ainda acerca de biossegurança, assinale a opção correta.

- A O glutaraldeído pode ser utilizado como desinfetante de superfícies, dada sua baixa toxicidade.
- B Define-se infecção cruzada como a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe, dentro de um ambiente clínico, podendo a transmissão resultar do contato pessoa-pessoa ou ocorrer por meio de objetos contaminados.
- C A infecção pelo vírus da hepatite B ocorre somente por meio do contato com secreções genitais.
- D Antissepsia refere-se à inibição da proliferação ou à destruição de microrganismos presentes em superfícies inanimadas, como bancadas e equipamentos.
- E Manobras como esterilização do instrumental, antissepsia do campo operatório e colocação de luvas e máscaras devem ser realizadas apenas quando o paciente possuir alguma doença contagiosa.

**QUESTÃO 66**

Com relação a cirurgia oral e maxilofacial, assinale a opção correta.

- A Nas cirurgias parendodônticas, a incisão deve ser feita sobre osso, para prevenir a deiscência do retalho, devendo a linha da incisão passar por cima da loja óssea e seguir até o segundo dente vizinho ao local da lesão.
- B Nas incisões intrabucais, o ápice livre de um retalho não deve ser mais amplo que a base, para não comprometer o suporte sanguíneo dos tecidos.
- C A ligadura da artéria facial durante o procedimento cirúrgico acarreta necrose tecidual da área anteriormente irrigada por esse vaso.
- D Durante a incisão cirúrgica, o cirurgião deve iniciar o procedimento inserindo o bisturi pela parte cortante, em um ângulo de 45 graus, desligando-o, em seguida, e, por fim, deve retirá-lo em um ângulo de 90 graus. Essa técnica limita a quantidade de dano tecidual na incisão, favorecendo a reparação tecidual.
- E A pinça do tipo Kelly é indicada para promover a hemostasia de microvasos, enquanto a pinça de Allis é mais indicada para procedimento em vasos de grande calibre.

**QUESTÃO 67**

Considere que determinada pessoa, em decorrência de queda da própria altura sobre haste metálica visivelmente enferrujada, tenha sofrido ferimento corto-contuso que transfixou desde a pele do mento até a mucosa bucal do lábio inferior. Com base nessa situação, assinale a opção correta.

- A A sutura da mucosa bucal pode ser feita com fio de nylon 2.0, o que propicia o refinamento das feridas superficiais.
- B Indica-se a imunização ativa e passiva se o paciente tiver recebido, vacinação contra o tétano mais de dois anos antes da queda.
- C Para permitir melhor estética, a sutura da pele pode ser feita com fio de catêgute 5.0.
- D O debridamento da ferida será necessário apenas no caso de haver secreção purulenta no local.
- E Antes do fechamento do corte, é recomendado irrigar bem o local com soro fisiológico, a fim de se removerem corpos estranhos e pequenos fragmentos que possam ter permanecido nos tecidos.

**QUESTÃO 68**

No que se refere a técnica cirúrgica para suturas na face, assinale a opção correta.

- A** Suturas maxilofaciais devem ser realizadas com agulhas de seção circular e ponta cônica, que penetram facilmente em tecidos resistentes, como gengiva e pele.
- B** A laçada do fio de sutura deve ser apertada apenas o suficiente para aproximar adequadamente as bordas da ferida, pois tensões excessivas comprimem a vascularização, prejudicando a cicatrização.
- C** Nas suturas internas de músculos, se o nó da sutura ficar sepultado, o corte do fio deve ser feito pelo menos 10 mm acima do nó.
- D** Em se tratando de incisões em planos musculares diferentes, a sutura desses planos deve sempre ser realizada com sutura contínua e festonada, para garantir a melhor cicatrização dos tecidos.
- E** O porta-agulhas do tipo castroviejo é apreendido de forma semelhante às tesouras, com os dedos anelar e polegar.

**QUESTÃO 69**

Considere que uma paciente do sexo feminino, de sessenta e oito anos de idade, diabética, hipertensa e alérgica a penicilina tenha comparecido a um consultório para instalação de implante dentário no dente 46. Com relação a esse caso clínico, assinale a opção correta.

- A** Como a paciente é alérgica a penicilina, deve ser-lhe indicado um antimicrobiano como a azitromicina, mas apenas no pós-operatório.
- B** A dipirona sódica deveria ser evitada no pós-operatório, pois elevaria a pressão arterial da paciente.
- C** O ibuprofeno deverá ser evitado no pós-operatório imediato por dificultar a agregação plaquetária.
- D** A paciente deve realizar o bochecho com clorexidina a 0,12 % antes da cirurgia e nas duas semanas posteriores ao procedimento com objetivo de reduzir a microbiota bucal.
- E** Se, durante os exames complementares, for detectado que a glicemia em jejum da paciente é de 101 mg/dL, será necessário que para o médico, antes da realização do implante, substitua o hipoglicemiante por ela usado.

**QUESTÃO 70**

Considerando que um rapaz de vinte e seis anos de idade, com histórico de febre reumática na infância, tenha se apresentado em um consultório para extração de resto radicular do dente 12. Assinale a opção correta no que concerne ao protocolo de planejamento cirúrgico.

- A** O fórceps a ser utilizado nesse procedimento é o de número 151.
- B** Para o conforto pós-operatório, deve-se utilizar um anti-inflamatório não esteroide associado a um analgésico.
- C** A sutura deverá ser removida o mais brevemente possível, de preferência 48 horas após o procedimento.
- D** Antes do procedimento, deve-se solicitar o risco cirúrgico desse paciente ao cardiologista, uma vez que o paciente se encontra na faixa etária de maior incidência de cardiopatias.
- E** Para esse paciente, é indicada a profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana com 6g de amoxicilina 1 hora antes do procedimento.

**QUESTÃO 71**

Acerca das disfunções das articulações têmporo-mandibulares (ATM), assinale a opção correta.

- A** A técnica de imagem mais eficaz para avaliar tecidos moles das ATM é a ressonância magnética.
- B** Nas cirurgias de recaptura de disco das ATM, o acesso cirúrgico retromandibular é o mais indicado, por permitir boa visualização dessas articulações.
- C** A radiografia das ATM em máxima abertura bucal é útil para avaliar se a relação entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular do osso zigomático é adequada.
- D** A disfunção do músculo pterigoideo do lado direito provoca desvio para o lado oposto durante a abertura bucal.
- E** A luxação bilateral recorrente das ATM é tratada cirurgicamente pela técnica da coronoidectomia bilateral.

**QUESTÃO 72**

A respeito das dores orofaciais mais comuns, assinale a opção correta.

- A** A ocorrência de enxaquecas é mais comum em homens do que em mulheres.
- B** Mesmo que o paciente aponte claramente que a dor ocorre na maxila, é possível que sua origem seja na mandíbula, pois a confusão sensorial é frequente nas dores orofaciais.
- C** Fadiga da musculatura mastigatória ao acordar é sinal claro de neuropatologia do nervo facial.
- D** A placa miorelaxante é indicada para todos os casos de dor orofacial.
- E** A neuralgia do nervo trigêmeo pode estar associada a um ponto de gatilho, região que, se manipulada corretamente, trará alívio à dor do paciente.

**QUESTÃO 73**

Assinale a opção que apresenta a associação correta entre os atos operatórios e os instrumentos cirúrgicos.

- A** diérese — bisturi e exérese — alavanca
- B** diérese — bisturi e síntese — fórceps
- C** síntese — bisturi e hemostasia — pinça hemostática
- D** diérese — tesoura e hemostasia — porta-agulhas
- E** hemostasia — pinça Backhaus e síntese — porta-agulhas

**QUESTÃO 74**

Acerca da utilização dos fórceps nas extrações dentárias, assinale a opção correta.

- A** O primeiro movimento a ser realizado com o fórceps é a pressão no sentido apical.
- B** Durante a exodontia de um primeiro molar superior, a pressão de rotação deve ser aplicada com o fórceps, de modo a evitar fraturas radiculares.
- C** O fórceps deve ser utilizado quando a extração com alavancas não tiver sido possível.
- D** Para diminuir as chances de fratura da raiz, o fórceps deve ser posicionado, preferencialmente, acima da junção amelocementária.
- E** A utilização dos fórceps é indicada para os casos em que é necessário empregar força maior que a habitual, como na extração de anquilosados, por exemplo.

**QUESTÃO 75**

Assinale a opção correta, a respeito da técnica cirúrgica para as mentoplastias.

- Ⓐ Apesar de ser um procedimento basicamente estético, a mentoplastia pode ser indicada para tracionar a musculatura sublingual e melhorar o espaço aéreo na faringe.
- Ⓑ O limite do avanço mental possível é igual a dois terços da dimensão anteroposterior da sínfise mandibular.
- Ⓒ A osteotomia deve se dirigir posteriormente até a região do primeiro molar, passando 5 mm acima do forame mental.
- Ⓓ A fixação deve ser feita posicionando-se a placa apropriada no centro do mento e sempre com parafusos monocorticais de 4 mm a 6 mm, para que as raízes dentárias não sejam atingidas.
- Ⓔ Para evitar a recidiva nos casos de cirurgia de avanço do mento, é essencial que toda a musculatura inserida no segmento distal seja liberada.

**QUESTÃO 76**

No que se refere aos sistemas de classificação dos terceiros molares impactados, assinale a opção correta.

- Ⓐ O dente siso incluído na impactação classe 2 de Pell e Gregory, está todo coberto pela porção anterior do ramo mandibular.
- Ⓑ O dente impactado pertencente à classe A de Pell e Gregory e está abaixo da linha cervical do segundo molar.
- Ⓒ Considerando-se o sistema de classificação pela angulação, é correto afirmar que um terceiro molar com impactação horizontal está posicionado com a face oclusal voltada para a região distal do segundo molar.
- Ⓓ Os sistemas de classificação, embasados em análises clínicas, possibilitam ao cirurgião avaliar o grau de dificuldade da exodontia.
- Ⓔ O sistema de classificação dos sisos proposto por Pell e Gregory utiliza letras para determinar a relação desses dentes com o bordo anterior do ramo mandibular e números para determinar sua relação com o plano oclusal.

**QUESTÃO 77**

Com relação às técnicas cirúrgicas ortognáticas, assinale a opção correta.

- Ⓐ Se houver necessidade de que a reposição posterior da maxila seja maior que 7 mm, a turbinectomia deve ser executada.
- Ⓑ As osteotomias subapicais e segmentares são indicadas para correção de alterações oclusais se o nivelamento ou a relação transversa não tiverem sido solucionados com ortodontia.
- Ⓒ Apesar de diminuir consideravelmente o risco de parestesia do nervo alveolar inferior, a técnica da osteotomia vertical de ramos mandibulares só deve ser utilizada em casos em que haja avanço mandibular.
- Ⓓ Em cirurgias bimaxilares, a maxila deve, obrigatoriamente, ser operada e fixada antes da mandíbula.
- Ⓔ O acesso cirúrgico para a mentoplastia deve ser feito preferencialmente por meio de incisão no fundo de vestibulo.

**QUESTÃO 78**

Em relação às cirurgias ortognáticas e às técnicas de expansão maxilar assistida cirurgicamente, assinale a opção correta.

- Ⓐ A osteotomia entre os incisivos deve ser feita com broca 703, parar evitar dano às raízes dos incisivos centrais.
- Ⓑ Esse tipo de cirurgia é indicado para paciente cujo crescimento ósseo ainda não terminou.
- Ⓒ A osteotomia deve ser planejada para distanciar aproximadamente 5 mm dos ápices dentários.
- Ⓓ A ativação transoperatória do expansor deve ser feita até que a deficiência transversa seja corrigida, e o aparelho deve ser travado nessa posição por vinte e um dias.
- Ⓔ Se não há deslocamento inferior da maxila, não há possibilidade de alargamento da base nasal e, portanto, não há necessidade de fazer a plicatura nasal.

**QUESTÃO 79**

No que se refere a implantodontia, assinale a opção correta.

- Ⓐ Se, durante a instalação de implante na região do dente 11, o cirurgião perceber que houve pequena fenestração da tábua vestibular, ele poderá realizar enxerto particulado e membrana, nesse mesmo momento.
- Ⓑ Carga imediata refere-se ao implante que foi instalado e recebeu a prótese em oclusão normal até vinte e um dias após o ato cirúrgico.
- Ⓒ O espaço necessário entre um implante e um dente poderá ser menor que 1 mm, desde que o dente seja normal, sem canal tratado.
- Ⓓ Como os sistemas de implantes são padronizados entre as marcas nacionais, as fresas cirúrgicas e os componentes protéticos dos diversos tipos de implantes são compatíveis, mesmo se de fabricantes diferentes.
- Ⓔ Tratando-se da técnica de extração seguida imediatamente da instalação de implante nos dentes incisivos maxilares, é recomendado que sempre se proceda ao descolamento das papilas adjacentes, para permitir visualização das cristas ósseas e definir o limite ósseo.

**QUESTÃO 80**

Assinale a opção correta, a respeito de traumatologia bucomaxilofacial.

- Ⓐ As fraturas de cabeça da mandíbula tratadas cirurgicamente podem resultar em mordida aberta anterior indesejada, cerca de dez vezes menor se comparadas ao tratamento incruento.
- Ⓑ Em cirurgias para tratamento de fraturas maxilares isoladas, não é necessário fazer a fixação intermaxilar transoperatória, uma vez que a maxila é um osso fixo no crânio.
- Ⓒ Incisões pré-auriculares podem ser usadas, como as de Dingman, Kellibian e Thoma, para acesso direto ao arco zigomático.
- Ⓓ Com o avanço dos sistemas de fixação interna rígida, todas as fraturas mandibulares podem ser tratadas com acesso intrabucal.
- Ⓔ O acesso cirúrgico subpalpebral é o mais indicado, para tratamento de fraturas do tipo *blow out*, uma vez que tal fratura sempre ocorre no assoalho da órbita.