CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca das funções dos sistemas do corpo humano, assinale a opção correta.

- O sistema circulatório é responsável por distribuir oxigênio e nutrientes para as células e proteger contra doenças, prevenir hemorragia por meio da formação de coágulo e ajudar na regulação da temperatura corporal; porém, não tem influência na manutenção do equilíbrio acido-básico, nem no transporte de dióxido de carbono e resíduos das células.
- O sistema genital é responsável pela reprodução do ser humano, pela produção de enzimas e pela libido.
- Produção de calor, postura corporal e participação e produção de movimentos corporais são funções de sistema muscular.
- Regular a temperatura do corpo, receber estímulos como calor e dor, auxiliando na produção de vitamina A, e proteger o corpo são funções do sistema tegumentar.
- O sistema esquelético, que tem a função de proteger e sustentar o corpo, bem como de auxiliar nos movimentos corporais, produz de novas células reprodutoras e armazena minerais.

QUESTÃO 32

Acerca da composição dos grandes vasos sanguíneos do corpo humano, assinale a opção correta.

- As veias são vasos sanguíneos responsáveis pelo transporte do sangue do coração aos demais tecidos do organismo.
- Artérias são vasos sanguíneos calibrosos de paredes espessas responsáveis pelo retorno do sangue ao coração.
- Arteríolas são artérias de grande calibre que distribuem sangue aos capilares.
- Vênulas são veias de tamanho microscópico responsáveis pela coleta de sangue dos capilares para drenar para as artérias.
- Os capilares são vasos microscópicos, localizados entre as vênulas, onde ocorrem as trocas entre o sangue e as células dos tecidos.

QUESTÃO 33

Os tecidos são elementos do organismo não constituídos em um sistema autônomo, entendido como um agrupamento de células com as mesmas propriedades. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- As células nervosas não possuem núcleo e apresentam a mesma forma nos sistemas do corpo.
- As células do tecido muscular são curtas e formam as fibras nervosas.
- O tecido epitelial é o conjunto de células de revestimento que são chamadas células epiteliais. Elas formam a pele, camada mais superficial do corpo, protegendo e recombinando toda sua superfície.
- Determinadas células do tecido adiposo armazenam as reservas proteicas do corpo.
- O periósteo é uma membrana grossa de tecido conjuntivo que reveste a superfície do osso, na qual correm os vasos linfáticos, importantes para a nutrição do osso.

QUESTÃO 34

Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, assinale a opção correta.

- A dose de manutenção é aquela necessária para obter outros níveis do medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos durante o tratamento.
- Dose máxima é a maior dose utilizada capaz de produzir efeito terapêutico, causando, frequentemente, efeitos indesejáveis.
- O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando se tiver certeza do medicamento prescrito, da dose e da via de administração.
- Não há necessidade de esclarecer o paciente sobre o medicamento que irá receber.
- A dose terapêutica é aquela que não é capaz de produzir o efeito desejado.

QUESTÃO 35

Os seres vivos podem ser agrupados de acordo com suas semelhanças morfológicas, formas de alimentação, de locomoção de produção e de ciclo de vida. Os maiores grupos resultantes do processo de evolução são os reinos. Acerca da classificação dos seres vivos quanto ao reino a que pertencem, assinale a opção correta.

- O reino Protista é constituído por seres formados também por uma só célula, porém com material genético protegido por uma membrana. Esses seres são denominados procariontes.
- Os fungos são considerados plantas porque fazem fotossíntese. Eles não são considerados animais porque não são capazes de se locomover à procura de alimentos.
- Os homens, os peixes, as aves, os animais domésticos, os répteis, os insetos e muitos outros estão no reino Animália, que reúne o maior e mais variado número de espécies na face da terra.
- Os vírus pertencem ao reino Protista, por apresentarem uma estrutura muito complexa.
- O reino Monera é formado por seres muito simples, unicelulares, cuja única célula não apresenta uma membrana envolvendo o material genético, ou seja, não possui um núcleo delimitado ou diferenciado do restante das células, chamada de célula eucariótica.

Assinale a opção correta acerca de doenças transmitidas por bactérias.

- O agente etiológico da sífilis, doença transmissível sexualmente e por via congênita, é denominado *Vibrio cholerae*.
- **19** A hanseníase é causada por um bacilo chamado *Mycobacterium leprae*, que afeta a pele e o sistema nervoso, causando deformações e falta de sensibilidade.
- O agente etiológico da AIDS e da hepatite B é transmitido pelo sangue contaminado.
- Uma das doenças mais importantes no Brasil é a doença de Chagas, causada por uma bactéria flagelada chamada de *Trypanosoma cruzi*.
- **9** O tétano é causado por um bacilo chamado *Clostridium botulinum*, que também forma esporos.

QUESTÃO 37

Acerca da biossegurança para os profissionais de saúde, assinale a opção correta.

- Diversos microrganismos são transmitidos, na falta de cuidados, aos profissionais de saúde, destacando-se o vírus da imunodeficiência humana (HIV), o Clostridium tetani, os vírus das hepatites B e C e o Plasmodium falciformium.
- O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) não evita o risco de exposição a material biológico, como sangue e fluidos corporais.
- As recomendações denominadas precauções-padrão devem ser adotadas no atendimento a todo e qualquer paciente, incluem a higienização das mãos, o uso do equipamento de proteção individual, vacinação contra hepatite B e descarte adequado de materiais perfurocortantes.
- Os acidentes com perfurocortantes no reencape da agulha ou na sua manipulação são pouco frequentes para a equipe de enfermagem.
- As doenças transmitidas por gotículas são mais difíceis de prevenir com o uso de máscaras do que as que são transmitidas por aerossóis.

QUESTÃO 38

A higienização das mãos é a medida mais importante, reconhecida há muitos anos, na prevenção e no controle das infecções nos serviços de saúde. Estudos recentes sobre o tema avaliam que a adesão dos profissionais a essa pratica não é constante e ainda é insuficiente na rotina dos serviços. Acerca da higienização das mãos, assinale a opção correta.

- O uso de luvas substitui a higienização das mãos nos procedimentos de enfermagem.
- A antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos tem a finalidade de eliminar a microbiota transitória da pele e de reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional.
- O uso de secadores elétricos é indicado no processo de higienização das mãos por eles serem práticos e não apresentarem dificuldades no seu acionamento, não havendo possibilidade de carrearem microrganismos.
- Os dispensadores de sabão e antissépticos devem possuir dispositivos que dificultem o seu esvaziamento e facilitem o preenchimento.
- Os produtos antissépticos são associados a detergente e se destinam à higienização das mãos e à desinfecção da pele.

QUESTÃO 39

Os artigos hospitalares devem ser submetidos aos processos de limpeza, desinfecção ou esterilização, pois, independentemente do processo a serem submetidos, todo artigo deverá ser considerado como contaminado. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

CESPE/UnB - SESA/ES/2013

- Estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro são considerados artigos não críticos.
- O uso do EPI não é imprescindível à pessoa que manuseia artigos contaminados.
- Os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são denominados artigos semicríticos e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível.
- Artigos não críticos são destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras e requerem desinfecção de médio ou alto nível de esterilização.
- Os artigos semicríticos são destinados à penetração através da pele e das mucosas nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular.

QUESTÃO 40

Atualmente, já e possível, por intermédio das vacinas, alcançar a prevenção e a diminuição significativa de ocorrência de doenças que, até pouco tempo, causavam adoecimento e morte de muitas pessoas. Acerca das doenças que podem ser prevenidas mediante vacinação, assinale a opção correta.

- A hepatite B tem como agente infeccioso o vírus da hepatite B e infecta apenas o homem, seu reservatório natural.
- **3** A poliomielite é chamada paralisia infantil e provoca, subitamente, deficiência visual, febre e flacidez muscular, afetando, sobretudo, os membros superiores.
- O tratamento do tétano consiste em internação hospitalar em enfermarias luminosas com circulação de muitos profissionais de enfermagem.
- A transmissão da coqueluche ocorre pelo contato indireto através dos artigos hospitalares usados nos pacientes.
- A adoção de condutas de vigilância epidemiológica não é importante para a febre amarela porque apresenta características exclusivas.

QUESTÃO 41

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS, assinale a opção correta.

- A gonorreia é uma doença infecciosa causada por um vírus do tipo espiroqueta, chamado *Chlamyidia trachomatis*.
- O diagnóstico do cancro mole é feito a partir da visualização de roséolas e verrugas.
- A ocorrência de infecção pelo HPV (papilomavírus humano) não aumenta os riscos de desenvolvimento de câncer do colo uterino.
- **D** A sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que pode atingir qualquer tecido ou órgão e tende a evoluir cronicamente.
- O conjunto de anti-inflamatórios popularmente conhecido como coquetel melhorou o prognóstico para doentes com AIDS.

- 9 **-**

Acerca dos principais tipos de transtorno mental, assinale a opção correta.

- No transtorno de ansiedade generalizada, o paciente apresenta, normalmente, um fácil relacionamento.
- A pessoa com depressão apresenta tristeza comum, sem perda da autoestima, normalmente reclama da falta de ânimo, de cansaço fácil e de não sentir interesse por nada.
- O indivíduo com episódios de mania caracteriza-se por apresentar um ritmo lento, falar pouco, sempre do mesmo assunto, e dormir muito.
- O indivíduo com transtorno bipolar apresenta constância no estado de humor.
- **9** Demência é uma síndrome causada por alguma doença cerebral, e acarreta perturbações de vários aspectos do funcionamento mental.

QUESTÃO 43

Com relação à assistência ao paciente cirúrgico, de acordo com a classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica, assinale a opção correta.

- As cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados com flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras na ausência de supuração local.
- Cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso e de tecido necrótico.
- As cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana muito numerosa ou em tecido de fácil descontaminação são denominadas potencialmente contaminadas.
- Nas infecções pós-cirúrgicas, não deve ser levado em consideração o número de microrganismos presentes no tecido a ser operado.
- Girurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação. Normalmente são cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta.

QUESTÃO 44

Para atuar no psiquismo, os psicofármacos precisam vencer uma série de barreiras até atingir o sistema nervoso central. A área em que irão atuar está intimamente ligada aos efeitos que produzem, sejam eles desejáveis ou não. Acerca da atuação e dos efeitos adversos dos psicofármacos, assinale a opção correta.

- A fadiga, a sonolência, a lentidão e a confusão mental não são efeitos colaterais apresentados durante o uso dos ansiolíticos.
- **9** Os antidepressivos são eficazes em muitas formas de transtornos mentais, porém produzem euforia e pequena melhora no humor dos pacientes.
- O uso de hipnóticos não agrava o quadro de pessoas que sofrem de apneia do sono.
- As drogas ansiolíticas são capazes de aliviar os sintomas de ansiedade, interferindo, excessivamente, em outras funções cerebrais.
- **G** Os neurolépticos ou antipsicóticos reúnem um grupo de drogas com propriedades terapêuticas e farmacológicas comuns, em especial no tratamento de transtornos psicóticos como esquizofrenia.

QUESTÃO 45

Com relação à descrição dos tipos de choque, assinale a opção correta.

- Choque anafilático é um estado de choque circulatório que resulta em reação alérgica leve, produzindo vasoconstrição sistêmica e hipovolemia grave.
- **3** O choque resultante do volume intravascular aumentado em decorrência da perda de líquidos é o choque hipovolêmico.
- Choque cardiogênico é aquele decorrente do comprometimento ou da falência do epicárdio.
- O choque resultante da perda do tônus parassimpático que provoca hipovolemia relativa é denominado neurogênico.
- **6** Choque séptico é um estado resultante da infecção grave que provoca hipovolemia relativa.

QUESTÃO 46

- O diabetes melito é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia) decorrente dos defeitos na secreção e da ação da insulina. Acerca da assistência de enfermagem ao paciente com disfunções endócrinas, assinale a opção correta.
- A insulina, uma proteína produzida pelo pâncreas, controla o nível de glicose no sangue ao regular a produção do armazenamento de glicose.
- O diabetes do tipo I é originalmente conhecido como diabetes melito não insulinodependente.
- **O** diabetes do tipo II é originalmente conhecido como diabetes melito insulinodependente.
- A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico nos diabéticos do tipo II que resulta de uma deficiência de insulina.
- O exercício é extremamente importante no controle do diabetes por causa de seus efeitos sobre a diminuição da glicemia e a redução dos fatores de riscos cardiovasculares.

Acerca da atuação do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com distúrbios digestivos, assinale a opção correta.

- Como comprometimento hepático grandes quantidades de líquido rico em bilirrubina podem acumular-se na cavidade peritoneal, como no caso da ascite.
- Medir e registrar o pulso, a respiração e a pressão arterial do paciente são procedimentos de enfermagem realizados antes da biópsia hepática.
- A biópsia hepática consiste na remoção de uma pequena quantidade de tecido hepático, geralmente por meio de endoscopia digestiva alta.
- Quando a concentração de bilirrubina no sangue está anormalmente elevada, todos os tecidos do corpo, inclusive as escleras e a pele, tornam-se avermelhados ou azulados, condição chamada de icterícia.
- A paracentese é a remoção de líquido (ascite) da cavidade torácica por meio de uma pequena incisão cirúrgica ou punção feita através da parede do tórax em condições estéreis.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta a respeito da assistência de enfermagem aos pacientes com disfunções gastrointestinais submetidos aos procedimentos endoscópicos.

- Náuseas, sufocação ou engasgo são sintomas experimentados pelo paciente durante a endoscopia digestiva alta.
- A inspeção visual direta do colo até o duodeno pode ser feita com um colonoscópio fibróptico flexível, exame chamado colonoscopia, que necessita de orientações importantes por parte do técnico de enfermagem.
- A colonoscopia é feita enquanto o paciente está em decúbito lateral direito, podendo essa posição ser modificada durante o exame para facilitar o avanço do aparelho.
- A laparoscopia pode ser usada para o diagnóstico da doença gastrointestinal. Esse procedimento é realizado através de uma pequena incisão na parede do tórax.
- O paciente pode ser autorizado a dirigir duas horas após o exame de endoscopia digestiva alta com sedação.

QUESTÃO 49

Acerca dos conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares, assinale a opção correta.

- Resultados de exames de laboratório e pesquisa de antígenos não são critérios para diagnóstico das infecções hospitalares.
- Não são consideradas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de setenta e duas horas da internação, quando associadas a procedimentos.
- As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a vinte e quatro horas são hospitalares.
- A infecção adquirida durante a admissão do paciente e que se manifeste na internação ou após a alta, ainda que possa ser relacionada com a internação, não caracteriza hospitalar.
- O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da análise do seu prontuário.

OUESTÃO 50

Acerca do sistema cardiovascular e da assistência ao paciente com disfunções cardiovasculares, assinale a opção correta.

- No teste de esforço cardíaco, o paciente caminha em uma esteira ou nada em uma piscina olímpica.
- A ecografia é um teste ultrassonográfico invasivo utilizado para examinar o tamanho, o formato e o movimento das estruturas cardíacas.
- **O** Pressão arterial sistêmica é a pressão exercida sobre as paredes das artérias durante a sístole e a diástole ventriculares.
- A hipotensão postural ocorre quando a pressão arterial cai de maneira significativa depois que o paciente assume uma postura deitado.
- **O** eletrocardiograma é um instrumento ultrapassado na avaliação do sistema cardiovascular.

QUESTÃO 51

A estratégia de Saúde da Família deve desenvolver ações de acordo com a fase do ciclo de vida das pessoas, elencando prioridades. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- O território, considerado espaço meramente geográfico, estabelece a divisão entre o trabalho da equipe e o atendimento da clientela.
- **19** Em visita domiciliar, a abordagem do atendimento deve focar na realização de curativos e prescrição médica para diabéticos e hipertensos, pois são ações programáticas prioritárias na implementação da atenção básica em nível nacional.
- A estratégia de Saúde da Família deve ser compreendida como um espaço de construção de cidadania.
- Ações de saúde bucal estão previstas apenas para aplicação de flúor em crianças e adolescentes.
- **6** É competência exclusiva do dentista promover a educação em saúde bucal.

QUESTÃO 52

Um dos desafios da estratégia Saúde da Família tem sido a reorientação do modelo assistencial. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- A prevenção do uso de drogas na gravidez independe de ações preventivas, pois estudos demonstram que esta população refugia-se em locais onde o programa Saúde da Família não consegue atuar.
- O Programa de Agentes Comunitários de Saúde possui autonomia para desempenhar ações de promoção da saúde em todas as localidades em que está presente, não estabelecendo interfaces com a estratégia Saúde da Família.
- As equipes de Saúde da Família atuam em uma região previamente delimitada sem limite do número de famílias a serem atendidas. Assim, essas equipes deverão cobrir o número total de famílias presentes na área delimitada.
- Pacientes com diagnóstico de tuberculose que demandem atendimento da saúde bucal deverão receber tratamento conservador por meio de terapia medicamentosa nas urgências odontológicas. O profissional que o atende deverá respeitar as normas de biossegurança e o uso de EPIs.
- Ações educativas que visem à promoção de uma alimentação saudável apresentam pouco ou nenhum impacto na saúde bucal do idoso e da criança.

Texto para as questões 53 e 54

Um paciente de trinta e dois anos de idade, residente em um município do Espírito Santo, recebe atendimento da estratégia Saúde da Família em virtude de uma lesão medular completa decorrente de ferimento de arma de fogo há cerca de um ano. Porém, o paciente vem apresentando resistência ao atendimento da estratégia Saúde da Família para dar continuidade ao processo de reabilitação e educação em saúde, pois considera o atendimento hospitalar mais seguro e acolhedor. Com um quadro de incontinência urinária e anal e início de uma úlcera por pressão em região trocanteriana, o paciente recusou-se, nas cinco últimas visitas que recebeu da equipe do programa Saúde da Família, a realizar o autocateterismo vesical, preferindo trocar seu curativo da forma como aprendeu no hospital. O paciente verbalizou não confiar na equipe da estratégia Saúde da Família, pois sabe que a equipe tem se queixado para sua mãe sobre seu comportamento e isso tem intensificado os conflitos com sua família.

QUESTÃO 53

A partir dos elementos do caso descrito, assinale a opção correta.

- A situação em que o paciente vive pode ser conceituada como oriunda de um acidente violento não intencional e evitável com impacto físico ou emocional na vida da vítima que demanda ações especiais.
- O paciente está correto em recusar a realização do autocateterismo em decorrência de complicações graves, como, por exemplo, infecções de repetição.
- Com relação às informações sobre o cateterismo, a equipe deve utilizar estratégias em que fique claro para o paciente que a realização do autocateterismo intermitente poderá ajudar a normalizar a pressão interna da sua bexiga e reduzir o nível de perdas urinárias.
- Visando reorientar a terapêutica do paciente, o código de ética respalda os profissionais para repassar as queixas do paciente para os familiares e amigos mais próximos, caso o paciente apresente capacidade de discernimento.
- A lesão trocanteriana em apreço está na fase de ulceração e decorre da lesão original ao trauma.

QUESTÃO 54

Ainda considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

- Oconsiderando as queixas do paciente, os gestores municipais deverão encaminhar o paciente para o programa Saúde da Família do Estado.
- A atuação da equipe da estratégia Saúde da Família requer a integração de diversos saberes, de modo a compartilhar responsabilidades na relação terapêutica em processo de desenvolvimento com o paciente ao longo do tempo, buscando eficácia e resolutividade do cuidado em saúde.
- Os conselheiros de saúde deverão ser comunicados sobre a recusa de atendimento e deverão realizar uma visita domiciliar na ausência do paciente.
- A equipe deve esclarecer para o paciente que, na fase em que ele está, seu atendimento consistirá apenas na atenção básica, considerando o seu processo de reabilitação.
- Os problemas apresentados na relação da estratégia Saúde da Família com o paciente podem ser considerados de natureza simples, uma vez que, no âmbito da atenção básica, o retorno só deverá ser agendado se o mesmo demandar um procedimento autorizado pela família.

QUESTÃO 55

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de doze milhões de exames citopatológicos são realizados anualmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do exame citopatológico de Papanicolaou, assinale a opção correta.

- O início da realização do exame citopatológico deve dar-se aos dezoito anos de idade.
- Após dois exames negativos, o agendamento de um novo exame deverá prever intervalo bianual para sua realização.
- O exame de Papanicolaou é um procedimento de realização periódica que visa o rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras.
- A vacinação contra HPV em adolescentes de nove a treze anos de idade tem eficácia em 100% na prevenção do câncer de colo do útero.
- Os exames citopatológicos devem ser realizados até o início da menopausa.

QUESTÃO 56

A osteoporose é um acontecimento comum no climatério e cada vez mais presente no contexto do envelhecimento populacional. Dessa forma, os profissionais de saúde devem estar preparados para prestar orientações nesse sentido. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A prática regular de exercícios físicos ou caminhada vigorosa não deve ser incentivada como tratamento para as mulheres em fase de climatério, pois há grandes chances de ocorrência de quedas e fraturas na menopausa.
- A osteoporose tem prevalência apenas após a menopausa, não havendo tratamento disponível, exceto para o controle da dor.
- A dor relacionada à osteoporose é um indicativo de que a paciente é poliqueixosa.
- A reposição hormonal deve ser incentivada para todas as mulheres em fase de climatério como o melhor tratamento da atualidade e poderá ser esclarecida pela equipe de enfermagem quanto aos seus benefícios.
- Observadas as especificidades de cada caso, a equipe de saúde poderá orientar, para paciente em fase de climatério, uma dieta variada e rica em vitamina D e cálcio, a exposição ao banho de Sol diariamente por curtos períodos de tempo, a realização de exercícios físicos adequados e a necessidade de algum suplemento prescrito por médicos ou nutricionistas, quando for o caso.

Apesar de se manter ainda em níveis altos para o padrão mundial, a mortalidade materno-infantil no Brasil tem sido reduzida nos últimos anos. Entre os vários aspectos que contribuem para essa redução, destacam-se a educação e a qualidade da assistência em saúde. Acerca desse assunto e da saúde materno-infantil, assinale a opção correta.

- A nutriz que deseja continuar a amamentação poderá fazer um estoque de leite em seu domicílio, podendo guardá-lo em temperatura ambiente conjuntamente com outros alimentos.
- Uma abordagem humanizada pressupõe respeitar em absoluto as tradições que cada família recebe de seus antepassados. No Brasil, é comum avós complementarem a alimentação dos bebês com chás caseiros. Nessa situação, a melhor conduta do profissional de saúde é apoiar e estimular a família a ministrar chás adoçados ao recém-nascido.
- Com objetivo de evitar a interrupção precoce na produção do leite, a doação de leite materno deve ser incentivada apenas para mães nos primeiros quinze dias pós-parto.
- No início da amamentação, é comum a produção de leite materno em excesso, entretanto a ordenha deverá ser realizada exclusivamente por profissional capacitado, visando evitar o ingurgitamento mamário.
- O Projeto Mãe Canguru contempla ações humanizadas no cuidado neonatal, de modo a incentivar o contato direto da pele do bebê com a pele da mãe, e ajuda na recuperação do bebê prematuro.

QUESTÃO 58

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora de algum tipo de deficiência, das quais: 5% é portadora de deficiência mental; 2% de deficiência física; 1,5% de deficiência auditiva; 0,5% de deficiência visual; e 1% de deficiência múltipla.

Política Nacional da Pessoa com Deficiência, Ministério da Saúde/Brasil,1992.

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- O acompanhamento das crianças com deficiência inclui, necessariamente, a observação e intervenções relacionadas ao desenvolvimento de constipação crônica, incontinência urinária, desenvolvimento de úlceras por pressão e queda dos pés.
- As orientações relativas à higienização bucal de crianças com algum grau de deficiência auditiva só poderão ser realizadas se a mãe se dispuser a comunicar-se com a criança em seu domicílio.
- Recomenda-se que a criança com deficiência em condição de alimentar-se por via oral tenha acesso a refeições balanceadas para suas necessidades e que sejam oferecidas porções em intervalos regulares, respeitando-se o grau de aceitação dos alimentos.
- A maioria das causas das deficiências é oriunda dos transtornos congênitos e perinatais, razão por que a qualidade do pré-natal não apresenta impacto nessa prevalência, uma vez que a maioria das deficiências é fruto da carga genética hereditária.
- As crianças dependentes de cadeira de rodas não podem ser atendidas nas unidades básicas de saúde, pois requerem tratamento especializado de média e alta complexidade.

QUESTÃO 59

A educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos, pacientes e familiares de paciente diabéticos, bem como a implementação de ações preventivas do pé diabético são fundamentais para a redução dos riscos de amputação. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A correção de deficiências visuais, particularmente a catarata e a melhoria do ambiente doméstico (pisos escorregadios, obstáculos de percurso, luminosidade insuficiente, ausência de corrimãos, suporte ou barras em locais de banho, retirada de tapetes soltos) devem ser incentivadas para minimizar a possibilidade de quedas e lesões em pacientes diabéticos.
- A neuropatia influencia a involução das lesões no pé diabético, uma vez que a dor recorrente é causada pela isquemia crônica.
- Atualmente, indica-se o uso de filme transparente para a realização de curativos oclusivos em feridas infectadas com moderada quantidade de exsudato.
- O pé neuroisquêmico é menos suscetível a ulcerações traumáticas, infecção e gangrena.
- Algumas medidas simples podem evitar a ocorrência do pé diabético, tais como o uso de calçados abertos, com solados rígidos, que ofereçam firmeza na pisada. O material deverá ser preferencialmente de plástico ou sintético e com uma ou duas numerações a mais do que o número usual do paciente.

QUESTÃO 60

Acerca da presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez, que caracteriza a denominada diabetes gestacional, assinale a opção correta.

- **©** Em gestantes previamente diabéticas, o exercício físico é recomendação obrigatória para a redução dos níveis glicêmicos, mesmo que a paciente apresente picos hipertensivos intermitentes.
- Na confirmação da diabetes gestacional, deve-se orientar a gestante para a necessidade de manutenção de uma dieta equilibrada, monitoramento da glicemia e acompanhamento do desenvolvimento fetal.
- O uso de insulina para regularização dos níveis de glicose sanguínea é absolutamente contraindicado em gestantes.
- No pós-parto, a criança deverá ser afastada imediatamente da mãe para que haja confirmação da diabetes do tipo 1 na criança e, nesse caso, estabelecer procedimento para a correção de situações de hipoglicemia.
- A administração de glicose ao recém-nascido por via oral ou intravenosa é sempre indicada na primeira hora do pós-parto.

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa garantir atendimento de qualidade às brasileiras pelo SUS, desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

- Nos estados ou municípios em que a Rede Cegonha esteja adotada, as grávidas receberão auxílio para o deslocamento até o local das consultas de pré-natal e para a maternidade no momento do parto.
- A gestante deverá realizar seis consultas no primeiro trimestre da gravidez, caso contrário, será desligada da Rede Cegonha.
- A gestante será vinculada compulsoriamente, desde o pré-natal, à Casa da Gestante para realização do parto natural, evitando a peregrinação de mulheres e recém-nascidos nos serviços de saúde.
- O parto normal e domiciliar (natural) é incentivado, o que implica que os hospitais não podem realizar indução hormonal ou utilizar métodos de alívio da dor.
- O pai será incentivado a acompanhar a puérpera e seu filho somente após o parto, ou seja, na unidade de internação materna e neonatal, visando minimizar o risco de infecções para mãe e recém-nascido. Na ausência do pai, a gestante poderá indicar um acompanhante de sua preferência.

QUESTÃO 62

De acordo com os resultados da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas realizada por inquérito telefônico em 27 cidades do Brasil, a frequência de diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial alcançou 22,7%, sendo maior em mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%), podendo ultrapassar 50% após os cinquenta e cinco anos de idade.

VIGITEL, Brasil, 2011 (com adaptações)

Acerca dos aspectos essenciais do cuidado de enfermagem para o paciente hipertenso, assinale a opção correta.

- O acidente vascular cerebral é uma situação de emergência cujo principal fator de risco é a hipertensão arterial. Nesse caso, o principal cuidado de enfermagem é manter o paciente em hipertermia com colcha térmica, pois a normotermia ou hipotermia pode exacerbar a lesão neurológica.
- O automonitoramento residencial da pressão arterial de pacientes hipertensos ou com suspeita de hipertensão está expressamente contraindicado por conta do fator de risco estresse.
- A correta medida da pressão arterial pressupõe um adequado preparo do paciente. Deve-se assegurar que o paciente tenha esvaziado a bexiga, não tenha praticado exercício físico há menos de uma hora e não tenha ingerido bebidas estimulantes ou fumado nos trinta minutos anteriores à realização do procedimento. Em seguida, o paciente deverá ser posicionado adequadamente e mantido em repouso por pelo menos cinco minutos antes da realização do procedimento de medição da pressão arterial.
- Na fase aguda de ocorrência de acidente vascular cerebral associado à hipertensão grave, a redução da pressão arterial deverá ocorrer abruptamente para prevenir maiores complicações ou sequelas.
- O ibuprofeno, comprimido de 200 mg ou suspensão oral 20 mg/mL, é um dos anti-hipertensivos distribuídos na farmácia popular ao paciente hipertenso que apresente documento de identidade com foto e prescrição médica devidamente preenchida.

QUESTÃO 63

Sob a supervisão do enfermeiro, a prática do técnico em enfermagem em terapia intensiva em procedimentos de infusão de soluções e manipulação de cateteres de longa permanência deverá proporcionar a segurança dos pacientes internados, a eficácia da terapia e prevenir a ocorrência da incompatibilidade ou perda da estabilidade de medicamentos e soluções e outras complicações. De acordo com as orientações para a realização desses procedimentos, o técnico em enfermagem deve

- evitar usar vias de infusão diferentes na vigência de associação de medicamentos de compatibilidade desconhecida ou duvidosa.
- infundir rapidamente o medicamento no paciente, objetivando a melhor absorção deste e a permeabilidade da via de acesso venoso.
- consultar o enfermeiro, o médico ou o farmacêutico sempre que houver dúvidas em relação os efeitos indesejados ou compatibilidade dos medicamentos prescritos.
- aprazar todos os medicamentos contidos na prescrição médica no mesmo horário de administração.
- diluir os vários medicamentos prescritos pelo médico na mesma solução ou seringa, objetivando racionalizar o processo de trabalho e evitar desperdícios de seringas, luvas ou outros insumos necessários ao preparo.

QUESTÃO 64

Embolia gasosa corresponde à

- entrada de ar no sistema vascular, que pode ser causada pela presença de ar ou desconexão do sistema de infusão.
- infusão inadvertida de fluídos e soluções não vesicantes ao redor do tecido subcutâneo.
- inflamação da veia, que ocorre quando as células endoteliais da parede do vaso em que está inserido o cateter se tornam inflamadas e irregulares, proporcionando a aderência de plaquetas e predispondo a veia a inflamação.
- infusão de drogas vesicantes ou irritantes do vaso sanguíneo para o tecido circunvizinho, fato que ocasiona a destruição dos tecidos de forma indolente e progressiva.
- formação de coleção localizada no espaço subcutâneo devido a extravasamento sanguíneo.

Durante um plantão no pronto-socorro de um hospital geral, chegou à sala de emergência uma senhora de quarenta e cinco anos de idade, apresentando transtorno mental agudo. Durante o atendimento, o médico e a equipe de enfermagem constataram que as alterações clínicas apresentadas pela paciente desencadearam alterações de comportamento grave, a ponto de colocar em risco a integridade física e moral dela e de terceiros.

Nesse quadro clínico, em que a equipe de saúde encontra-se em uma situação de atendimento de risco, o técnico em enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, deve

- A isolar a paciente em um consultório.
- evitar anotações de enfermagem no prontuário, limitando-se a anotá-las no diário da unidade.
- providenciar a contenção imediata da paciente antes de qualquer intervenção médica.
- retirar prioritariamente todas as roupas e pertences da paciente,
 mesmo que ela esteja confusa, agressiva e acompanhada.
- promover a privacidade e reduzir a exposição moral e física da paciente.

QUESTÃO 66

Unidade de terapia intensiva neonatal é uma unidade hospitalar destinada à assistência a pacientes críticos ou graves

- selecionados por tipo de doença ou intervenção, como cardiopatias, quadros neurológicos e cirúrgicos, entre outras.
- **3** admitidos com idade entre zero e vinte e oito dias.
- idade máxima de vinte e nove dias.
- recém-nascidos e pediátricos em uma mesma sala.
- G com idade igual ou superior a dezoito anos, podendo admitir pacientes de quinze a dezessete anos de idade, se definido nas normas da instituição.

QUESTÃO 67

Na realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar em um paciente adulto internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), a relação entre a qualidade de compressões e a quantidade de ventilações deve ser de

- trinta para três.
- **3** trinta para duas.
- **9** duas para quinze.
- duas para trinta.
- quinze para duas.

QUESTÃO 68

Um homem com quarenta e dois anos de idade foi submetido à craniotomia para clipagem de aneurisma cerebelar esquerdo. Na UTI, logo após a cirurgia, os sinais vitais do paciente estavam estáveis e ele se recuperava bem da anestesia geral. Então, repentinamente, o paciente apresentou alteração do nível de consciência, bradicardia, pressão sistólica aumentada, anisocoria e padrão respiratório Cheyne-Stokes, necessitando de ventilação mecânica. Diante da situação, foi instalada ventilação mecânica e o paciente foi mantido em jejum com SNG aberta, sonda vesical e cateter venoso central.

Considerando que as opções abaixo apresentam as intervenções que poderiam ser prescritas pelo enfermeiro da UTI, assinale a opção que corresponde à intervenção mais correta a ser indicada para o paciente em questão.

- A Realizar balanço hídrico rigorosamente.
- **9** Fechar SNG, se o paciente apresentar desequilíbrio hidroeletrolítico.
- Manter o paciente em decúbito lateral com flexão de quadril superior a 90°.
- Proceder à aspiração endotraqueal ou nasal com pré-oxigenação e ofertar oxigênio a 50%.
- **6** Promover aspiração endotraqueal em horários fixos.

QUESTÃO 69

Uma pessoa de trinta e cinco anos foi admitida na sala de emergência de um pronto-socorro após sofrer acidente automobilístico que resultou em quadro hemorrágico devido a múltiplas fraturas seguido de choque hipovolêmico.

Nesse quadro clínico, de acordo com as prescrições de enfermagem, será necessário monitorar, de hora em hora,

- taquipneia, febre, poliúria, hipotensão e alteração do nível de consciência.
- **6** dispneia, hipertensão, bradicardia, disúria e alteração do nível de consciência.
- sudorese, pele pálida e fria, hiperglicemia e diminuição do débito cardíaco.
- **o** alteração do nível de consciência, taquicardia, taquipneia, hipotensão e pele pálida ou fria.
- hipertensão, sudorese, dispneia e diminuição do débito cardíaco.

A escala de Apgar, que é um método de avaliação sistemática do recém-nascido logo após o parto e deve ser utilizado rotineiramente para identificar os recém-nascidos que necessitem de reanimação e cuidados especiais, é composta pelos seguintes quesitos: batimento cardíaco, atividade reflexa,

- esforço respiratório, tônus muscular e cor da pele.
- **3** respiração, pressão arterial e cor da pele.
- respiração, tônus muscular e temperatura corpórea.
- respiração, temperatura corpórea e tônus muscular.
- **e** esforço respiratório, pressão arterial e cor da pele.

QUESTÃO 71

Um paciente de quarenta e cinco anos de idade, recém-admitido em UTI, foi submetido a cirurgia cardíaca. Após esse procedimento, ele permaneceu sedado, com ventilação mecânica e dreno pleural. Durante a anotação de enfermagem e verificação dos sinais vitais, o técnico em enfermagem observou agitação e movimento dos membros superiores do paciente, que logo foram associados com a presença de dor na beira do leito.

Nesse quadro clínico, outras observações que estariam também associadas com a presença de dor no paciente seriam

- A hipotensão arterial sistêmica e oligúria.
- alteração do débito do dreno pleural e pleurisia.
- apneia e bradicardia.
- expressão facial e sinais fisiológicos como taquicardia e hipertensão arterial sistêmica.
- **3** secreção purulenta no curativo e hipertermia.

QUESTÃO 72

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo aponta algumas diretrizes e condutas na implementação da Atenção Integral à Saúde do Adolescente. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- O profissional de saúde que constatar que um adolescente sofre ou foi vítima de violência sexual poderá notificar o caso somente com autorização do responsável (pais ou responsável legal) pelo adolescente, pois, assim, atenderá aos princípios do segredo profissional e dos limites legais da idade do menor.
- O diafragma é um método contraceptivo de dupla proteção e de maior preferência pelas adolescentes, pois apresenta proteção contra a doença inflamatória pélvica oriunda do HPV e é mais eficaz do que o dispositivo intrauterino.
- A dispensação de medicações não poderá ser realizada para adolescentes que estejam desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais.
- O profissional de saúde que atende o adolescente deverá incentivá-lo a expor seus conflitos familiares e orientar suas condutas pelo bom senso.
- Algumas situações vulnerabilizam os adolescentes ao desenvolvimento de problemas de saúde bucal, tais como a anorexia ou a bulimia, a situações de violência e ao abuso de drogas ilícitas.

Em determinada unidade hospitalar em que se encontravam de plantão no turno matutino três técnicos em enfermagem, dois auxiliares de enfermagem do sexo masculino, um agente administrativo de plantão, um médico clínico geral e dois residentes (enfermagem e médico), o enfermeiro de plantão comunicou que iria se atrasar por duas horas.

Considerando essa situação, assinale a opção correta quanto ao exercício profissional da equipe de enfermagem.

- O técnico em enfermagem poderia delegar aos auxiliares de enfermagem o transporte de uma paciente com dependência total de cuidados de enfermagem que estivesse recebendo drogas vasoativas por bomba de infusão em maca, desde que dois auxiliares de transporte do serviço pudessem estar presentes.
- O técnico em enfermagem poderia preparar o paciente para consultas e exames, realizando o preenchimento da ficha de atendimento, a verificação de sinais vitais, o peso e altura, bem como comunicar alterações e aspectos significativos do cuidado aos médicos ou enfermeiros responsáveis pelo serviço.
- A equipe de enfermagem não poderia executar ações ou contribuir com a equipe multiprofissional na ausência da supervisão do enfermeiro de plantão da unidade.
- O auxiliar de enfermagem estaria autorizado a administrar quimioterapia a pedido do residente médico em decorrência do atraso do enfermeiro de plantão.
- Por comunicação telefônica, o enfermeiro de plantão deveria autorizar um dos técnicos em enfermagem a orientar e colher amostras para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou, caso as pacientes agendadas para o turno matutino para esse exame reclamassem quanto ao atraso do atendimento.

QUESTÃO 74

Apesar do acesso universal ao pré-natal, a redução da prevalência da sífilis ainda é um desafio no contexto brasileiro. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- As relações sexuais anais e orais não constituem fator de risco para a transmissão de sífilis durante a gravidez.
- **6** O agente causador da sífilis é o *Trypanosoma cruzi*.
- Cegueira, surdez, deficiência mental e malformações no feto podem ocorrer devido à transmissão horizontal da sífilis durante a gravidez.
- Os fármacos disponíveis para o tratamento da sífilis deverão ser prescritos para o casal (ou parceiros envolvidos); entretanto, a gestante só poderá realizar o tratamento após o nascimento da criança, devido ao risco de a penicilina ocasionar malformações, cegueira e outras teratogenias.
- No âmbito da Rede Cegonha, os profissionais da atenção básica poderão realizar os testes para a triagem rápida da sífilis em gestantes e parceiros, visando diminuir a prevalência da doença nessa população. Para que isso ocorra, entretanto, o município terá de optar pela adesão a essa estratégia junto ao Ministério da Saúde e as equipes de atenção básica terão de ser devidamente capacitadas para essa triagem.

QUESTÃO 75

Condiloma acuminado, também conhecido como verruga genital, é uma doença sexualmente transmissível. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- Em uma primeira fase de manifestação do condiloma acuminado, ocorre a presença do cancro duro, reconhecido como uma lesão rosada, endurecida e pouco dolorida.
- A principal forma de transmissão do condiloma acuminado é sexual, não havendo risco de transmissão ao bebê durante o parto.
- Atualmente, existe vacina para a prevenção do condiloma acuminado, entretanto a duração exata da imunidade conferida por ela ainda não foi determinada.
- As principais queixas de pacientes portadores de condiloma acuminado que buscam o serviço médico são o aparecimento de pústulas doloridas e prurido imediatamente após o contágio.
- **9** Devido à desordem causada pelo HPV, todas as mulheres portadoras de condiloma acuminado terão câncer cervical em virtude da resistência das cepas existentes e capacidade de diferenciação no tecido epitelial do útero.

QUESTÃO 76

Especialistas consideram que uma parcela significativa de pessoas infectadas pelo vírus HIV conviva com ele sem nunca ter realizado testagem, desconhecendo, portanto, que seja portadora da doença. Acerca desse assunto e de aspectos relacionados à contaminação HIV/AIDS, assinale a opção correta.

- Nas relações sexuais protegidas, o risco de se infectar pelo HIV é ainda bastante elevado.
- Apesar da tecnologia disponível no mundo, a testagem para HIV/AIDS no Brasil ainda se apresenta onerosa para a população, sendo disponibilizada gratuitamente a testagem rápida apenas para crianças, idosos e gestantes.
- A janela imunológica pode durar de trinta a cento e vinte dias. Assim, quando um usuário procurar o serviço hospitalar, é importante informá-lo que ele poderá infectar outras pessoas se estiver ou suspeitar estar nessa condição, reforçando-lhe a recomendação quanto às relações sexuais com o uso de preservativo e o não compartilhamento de seringas.
- Filhos de pais HIV soropositivos não poderão ser vacinados contra a tuberculose e hepatite B, a fim de evitar exposições desnecessárias a um sistema imunológico em condição especial de desenvolvimento.
- Enquanto não houver vacina contra o HIV, recomenda-se o uso da profilaxia pré-exposição sexual como prevenção da contaminação do HIV. Esse é um método seguro, desde que seja utilizado em dose única e sob prescrição médica.

A raiva manifesta-se por quadro de uma encefalite aguda, que leva as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos, constituindo um problema de saúde pública. Acerca dessa doença, assinale a opção correta.

- Na suspeita de um caso de raiva, a equipe deverá notificar o Ministério da Saúde, que providenciará o repasse de recursos para a coleta de líquor e raspagem das células da córnea em até setenta e duas horas.
- O soro antirrábico e a vacina antirrábica deverão ser imediatamente administrados diante de um caso de suspeita clínica-epidemiológica de raiva humana, de modo a prevenir a ocorrência de encefalite e outras complicações neurológicas.
- O Ministério da Saúde recomenda que todo caso suspeito deverá ser acompanhado no serviço de referência ambulatorial do estado ou município em que se localiza. O encaminhamento do paciente para atendimento de média e alta complexidade deverá ocorrer apenas se houver queixas de salivação progressiva, taquipneia e redução do nível de consciência.
- Morcegos e cães têm sido os principais responsáveis pela transmissão da raiva no Brasil.
- A raiva é uma doença que acomete animais invertebrados por meio do protozoário *Toxoplasma gondii*, encontrado particularmente na América Latina.

QUESTÃO 78

A respeito da tuberculose, assinale a opção correta.

- A vacinação BCG na infância é eficiente no combate à tuberculose; entretanto, a baixa adesão da população a esse procedimento e o aumento do número de crianças com HIV positivo, que têm contraindicação absoluta de tomar a vacina, são os fatores responsáveis pelo incremento de casos em crianças, adolescentes e adultos saudáveis.
- Entre as estratégias de controle da tuberculose, a busca ativa em indivíduos sintomáticos respiratórios é prevista apenas no nível da atenção básica. A busca ocorre por meio da identificação dos casos suspeitos na visita trimestral da população adscrita para cada equipe.
- O sintoma mais comum dessa doença em sua forma pulmonar é a hemoptise.
- O teste anti-HIV deverá ser obrigatório para o paciente com diagnóstico confirmado de tuberculose.
- Entre as diversas competências previstas para o controle da tuberculose no nível da atenção básica, encontram-se as ações relativas ao controle diário de faltosos, podendo-se utilizar de estratégias como a visita domiciliar e o contato telefônico ou pelo correio, para evitar o abandono do tratamento.

QUESTÃO 79

Acerca da hanseníase, assinale a opção correta.

- Em gestantes, o esquema de tratamento em ambulatório ou unidade básica de saúde preconiza o acompanhamento mensal nas consultas de pré-natal, a visita domiciliar quando houver suspeita de descontinuidade do tratamento e a certificação de que a cartela de PQT contém tiacetazona em vez de rifampicina.
- O bacilo morto do agente etiológico da hanseníase ainda possui capacidade de infectar outras pessoas, de modo que o paciente deve ser orientado a não interromper o tratamento antes de resultados laboratoriais que comprovem a diminuição do número de bacilos ativos em até 80%.
- O tratamento preconizado pela OMS para hanseníase é a poliquimioterapia associada a rifampicina, pirazinamida e rifapentina. Os ajustes da dose devem ser feitos conforme peso e a altura do paciente, devendo-se ainda considerar a tipologia da doença, sendo imprescindível a orientação ao paciente no momento da entrega da cartela de PQT.
- O bacilo *Calymmatobacterium granulomatis*, responsável pela transmissão da doença, tem alto poder de infectividade.
- É comum se associar o tamanho das lesões e a perda de tecido ocasionados pela hanseníase à ausência de dor. Entretanto, os profissionais deverão atentar para o fato de que existem diferentes manifestações e tipos da doença, que podem associar-se tanto à presença de dor quanto à perda de sensibilidade (sensitiva, motora e autonômica).

QUESTÃO 80

Considerando os fundamentos e preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

- As situações que causem danos patrimoniais ou financeiros são consideradas gravíssimas, devendo aplicar-se ao funcionário que as cometer a pena máxima, que consiste na multa.
- Na assistência direta ao paciente, é pouco provável que haja crimes de contravenção penal que possam infringir postulados éticos e legais, pois a equipe de enfermagem dificilmente tem acesso irrestrito a recursos materiais do serviços público que possam ser suprimidos.
- Se houver indícios de que a equipe de enfermagem está insatisfeita, o código permite a suspensão plena de penas ao técnico ou enfermeiro de plantão que tenha recebido rotineiramente gorjetas por familiares que desejem uma atenção preferencial desse perfil profissional.
- O segredo profissional poderá justificar a recusa do comparecimento do profissional de enfermagem para testemunhar quando requerido pela autoridade.
- Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais é uma proibição expressa pelo código de ética.

CespeUnB

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos