

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



30 questões



S02

Enfermeiro Hospitalar



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra, através da Interpraias; por mar, em barcos que transportam passageiros desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões, vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A expressão “Extremamente concorrida” equivale a *Com muitos turistas*.
- b. () A forma verbal “há”, do final do texto, equivale a *existem*.
- c. (X) A regra de acentuação gráfica de *Camboriú* aplica-se a *balaústre, saúde, viúvo*.
- d. () Para serem gramaticalmente corretas, as palavras *rainha, fortuito* e *gratuito* devem receber acento gráfico.
- e. () Em “Ofereço a você uma estada na região da Costa Brava” a expressão sublinhada equivale a *Ofereço-a*.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta clareza, lógica e correção gramatical.

- a. () Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
- b. () Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
- c. () Você quer que eu te mostre a Praia das Laranjeiras?
- d. () Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia das Taquaras.
- e. (X) Ana estava cônica de que visitava nosso melhor balneário.

3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os pontos e vírgulas (;) foram empregados para separar itens de uma enumeração.
- 2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
- 3. A expressão “através” equivale a *também*.
- 4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da Laranjeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase **correta**, em todas as formas verbais apresentadas.

- a. () Assim que eu for à Ponta do Santinho, em Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
- b. () Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso balneário.
- c. () Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia Brava.
- d. (X) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade de pescadores, ficarei contente.
- e. () A Praia dos Amores não tem realmente praia; se tivesse, é bom.

5. Analise o texto abaixo:

No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem conotação histórica de uma prática que vem sendo feita há muitos anos.

adapt. de <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br>: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

- a. (X) Em “aliada à manutenção da cultura regional”, substituindo a expressão “aliada” por asso-ciada, o acento de crase permanece.
- b. () A “conotação histórica” da pesca artesanal se deve à promessa de ganho financeiro dessa prática.
- c. () No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
- d. () Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser substituída por fazem, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
- e. () Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão, de um dos principais causadores do aquecimento global. Segundo os pesquisadores, a última vez que os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de anos.

Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.

- a. () Ozono (O₃)
- b. () Oxigênio (O₂)
- c. () Nitrogênio (N₂)
- d. () Vapor de água (H₂O)
- e. (X) Gás carbônico (CO₂)

7. Nos meses da temporada de verão Balneário Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à população local, compartilham a beleza natural e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade.

Em relação à população fixa do município, segundo projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de 2012, com cerca de:

- a. () 86 mil habitantes.
- b. (X) 113 mil habitantes.
- c. () 223 mil habitantes.
- d. () 343 mil habitantes.
- e. () 544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente, importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um importante órgão das Nações Unidas.

O órgão em questão é o (a):

- a. () Secretariado Geral das Nações Unidas.
- b. () Organização dos Estados Americanos (OEA).
- c. (X) Organização Mundial do Comércio (OMC).
- d. () Fundo das Nações Unidas para a Infância.
- e. () Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.

- a. (X) Brasil, Argentina e Uruguai.
- b. () Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- c. () Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
- d. () Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- e. () Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia, principalmente nas cidades de Benghazi e Trípoli.

Assinale a alternativa que indica outro acontecimento ocorrido naquele país e que teve grande repercussão mundial.

- a. () A insurreição civil contra o presidente Bashar al Assad.
- b. () A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
- c. () O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
- d. (X) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
- e. () A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. O Ministério da Saúde estabelece ações mínimas para a redução da incidência e da gravidade das infecções relacionadas aos serviços de saúde. No controle de infecções, as práticas de higienização das mãos contribuem para a qualidade da assistência.

Em relação à higienização das mãos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.
- b. (X) A higienização das mãos de familiares, acompanhantes e visitantes antes e após contato com o paciente é facultativa nos serviços de saúde, pois estas pessoas compartilham da mesma flora microbiana e não representam risco significativo para infecções cruzadas.
- c. () A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, diminuindo ou até interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.
- d. () Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantêm contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado.
- e. () A utilização de produtos e as técnicas para a higienização das mãos variam de acordo com as indicações e os objetivos ao qual se destinam.

12. A icterícia fisiológica no período neonatal é bastante comum; portanto, representa um dos focos dos cuidados de enfermagem em puericultura.

Quanto aos princípios gerais da assistência de enfermagem ao recém-nascido com icterícia fisiológica em tratamento de fototerapia, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Durante o tratamento de fototerapia deve-se proteger os olhos para evitar lesões nos fotorreceptores da retina.
- b. () Ajustar o aparelho de fototerapia no berço ou incubadora a uma distância de 5 a 10 cm da criança.
- c. () Cuidar para que as sessões de fototerapia não ultrapassem 30 minutos por dia.
- d. () Posicionar a criança para que a luz incida apenas na região da face e dos membros superiores.
- e. () Orientar as mães para restringir o número e o tempo de amamentação. O alto consumo hídrico dificulta a fotodegradação da bilirrubina.

13. A desidratação pode ser considerada uma causa comum de admissão de crianças em unidades pediátricas.

Sobre os sinais clínicos de desidratação assinale a alternativa **correta**.

- a. () Um dos sinais clínicos de desidratação é o aumento da diurese.
- b. () O aumento da pressão arterial pode ser observado como sinal clínico da desidratação.
- c. () Em casos de desidratação, as crianças apresentam mucosas úmidas e brilhantes.
- d. () Unhas quebradiças e queda de cabelos são sinais clínicos de desidratação.
- e. (X) A diminuição do turgor cutâneo é um dos sinais que podem ser observados nos casos de desidratação.

14. Em relação à formação de recursos humanos na área da saúde, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
- b. () A participação na formulação e na execução da política de formação de recursos humanos para a saúde é atribuição exclusiva da esfera federal, representada pelos Ministérios da Saúde e da Educação.
- c. () O objetivo da organização de um sistema de formação de recursos humanos na área da saúde é a expansão quantitativa dos cursos de pós-graduação.
- d. () Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas pelo Ministério da Saúde.
- e. () Deverão ser criadas Comissões Intergestoras de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino superior para a oferta de pós-graduação aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

15. A nebulização consiste numa forma de tratamento de várias afecções pulmonares.

Não é característica da nebulização:

- a. () A nebulização facilita a expectoração e pode diminuir a tosse.
- b. () A nebulização com beta 2 agonistas provoca broncodilatação.
- c. () A nebulização pode ser utilizada como via de administração de medicamentos.
- d. (X) A nebulização fornece umidade às mucosas do trato respiratório a partir de uma fonte exclusiva de O₂. O ar comprimido é contraindicado, pois resseca as vias aéreas.
- e. () A nebulização pode ser recomendada para diminuir a inflamação e congestão das mucosas em resfriados, gripes, laringites, sinusites ou em outras afecções do trato respiratório.

16. Especialmente nos primeiros dias de amamentação podem surgir alguns problemas que podem ser solucionados com algumas medidas simples; cabe à enfermagem prestar os cuidados e orientações. Um desses problemas é o ingurgitamento mamário.

Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

1. A causa do ingurgitamento mamário é atribuída ao esvaziamento incompleto ou inadequado das glândulas mamárias.
2. Nos casos de ingurgitamento mamário as mamas apresentam-se aumentadas em tensão máxima, túrgidas e dolorosas.
3. Apenas nos casos de ingurgitamento mamário é indicado o uso de bicos, mameadeiras e chupetas para poupar a(s) mama(s) ingurgitada(s).
4. Uma medida profilática é a alternância das mamas e frequência das mamadas (livre demanda).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Na assistência ao paciente em parada cardiorrespiratória, qual a sequência **correta** de suporte básico de vida?

- a. () ABC (abertura de vias aéreas, boa ventilação, circulação/compressões).
- b. () ACB (abertura de vias aéreas, circulação/compressões, boa ventilação).
- c. () BAC (boa ventilação, abertura de vias aéreas, circulação/compressões).
- d. (X) CAB (circulação/compressões, abertura de vias aéreas, boa ventilação).
- e. () CBA (circulação/compressões, boa ventilação, abertura de vias aéreas).

18. Identifique abaixo com (V) o que for sinais do trabalho de parto verdadeiro ou (F) o que for sinais do trabalho de parto falso.

- Contrações com intervalo irregular (sem diminuição do intervalo).
- Contrações regulares (intervalo gradativamente decrescente).
- A gestante refere desconforto ou dor nas costas que se irradia para o abdômen.
- A gestante refere desconforto ou dor apenas no abdômen.
- As contrações não se interrompem com a sedação.
- As contrações interrompem-se com a sedação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – F – V – F – V – F
- b. V – F – V – F – F – V
- c. V – F – F – V – F – V
- d. F – V – V – F – V – F
- e. F – V – F – V – F – V

19. No tratamento de pacientes em estado crítico a monitoração hemodinâmica invasiva fornece informações importantes para a avaliação terapêutica.

Como é denominado o cateter de artéria pulmonar utilizado na obtenção de parâmetros hemodinâmicos?

- a. Cateter Butterfly
- b. Cateter Abbocath
- c. Cateter de Broviac
- d. Cateter de Hickman
- e. Cateter de Swan-Ganz

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em relação às responsabilidades e aos deveres.

- Os profissionais de Enfermagem devem colaborar com a fiscalização do exercício profissional.
- Os profissionais de Enfermagem devem registrar informações do processo de cuidar de forma abreviada e sucinta.
- Os profissionais de Enfermagem devem interromper uma pesquisa na presença de qualquer risco à vida e à integridade da pessoa.
- É responsabilidade dos profissionais de Enfermagem zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – V – F
- b. V – F – V – V
- c. F – V – V – V
- d. F – V – V – F
- e. F – F – V – V

21. De acordo com o Caderno de Atenção Básica n. 16 – Diabetes Mellitus (BRASIL, 2006), cerca de 50% da população com diabetes não sabe que é portadora da doença, de modo que algumas vezes esses indivíduos permanecem não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco face à doença.

Não é considerado fator indicativo de maior risco para o desenvolvimento do diabetes:

- a. Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg).
- b. Prática de atividade física aeróbica regular.
- c. Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes.
- d. Idade > 45 anos e sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC > 25).
- e. Obesidade central (cintura abdominal > 102 cm para homens e > 88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas).

22. Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia, está associada à diminuição da fertilidade. Porém, esse efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre o retorno das menstruações e também quando o leite materno deixa de ser o único alimento recebido pelo bebê – o que ocorrer primeiro.

Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais durante os primeiros seis meses pós-parto, deve-se considerar:

1. O tempo pós-parto.
2. Se vai ser adotada ou não a amamentação e, em caso afirmativo, considerar o padrão da amamentação.
3. Que a escolha do método anticoncepcional deve ser livre e informada, respeitando-se os critérios de elegibilidade clínica.
4. Que embora a escolha do método contraceptivo seja uma decisão livre e informada, o preservativo e a minipílula são os únicos métodos recomendados durante o aleitamento materno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

23. No contexto da epidemia do HIV, a prática de aconselhamento tem se configurado como uma estratégia de prevenção de suma importância, sendo parte essencial do seu processo de diagnóstico. Para orientar a realização dessa prática, foram sistematizados procedimentos pré e pós-teste com conteúdos bem definidos, que auxiliam o profissional/serviço a incorporar uma concepção de trabalho e a lógica da promoção à saúde com ações de prevenção do HIV, hepatites e outras DST. O processo de aconselhamento inclui componentes educativos, de avaliação de risco e de apoio emocional.

Em relação ao aconselhamento pós-teste anti-HIV, as condutas recomendadas diante de um resultado negativo incluem:

- a. () Orientar que o teste anti-HIV deve ser realizado anualmente, uma vez que maior parte das pessoas infectadas são portadoras assintomáticas do vírus HIV.
- b. () Orientar que, por se tratar de um exame de radioimunoensaio, o resultado anti-HIV negativo indica a presença de imunidade à doença.
- c. () Orientar sobre a necessidade de repetir a coleta do exame decorridos três meses da entrega do primeiro resultado e reforçar a necessidade de não-exposição ao risco de infecção para o HIV, devendo se restringir a utilizar o preservativo masculino em todas as relações sexuais, até a realização do novo teste.
- d. () Orientar que a janela imunológica é o período em que os anticorpos anti-HIV encontram-se em níveis indetectáveis no organismo humano, podendo durar até três anos, situação que dificulta o diagnóstico precoce da infecção pelo vírus HIV.
- e. (X) Informar que um resultado negativo pode significar duas situações: a pessoa não está infectada, ou foi infectada tão recentemente que seu organismo ainda não produziu anticorpos num quantitativo suficiente para ser detectado pelo teste.

24. A placenta prévia (inserção baixa de placenta) corresponde a um processo patológico em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento inferior do útero. A incidência gira em torno de 0,5% a 1% de todas as gestações.

Não é (são) considerado(s) fator(es) de risco para a ocorrência de placenta prévia:

- a. () Cesarianas anteriores.
- b. (X) Idade materna inferior a 15 anos.
- c. () Patologias que deformem a cavidade uterina.
- d. () Curetagem uterina prévia.
- e. () Gravidez gemelar.

25. Os pais e/ou cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no primeiro ano de vida, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. Neste sentido, é necessário abordar o assunto durante as consultas regulares de puericultura e nos demais encontros do profissional de saúde com a família.

Em relação aos cuidados recomendados para a prevenção deste problema, é **correto** afirmar:

- a. (X) A melhor maneira de prevenir a morte súbita de criança é o posicionamento no berço. Deve-se colocar a criança para dormir de “barriga para cima” (posição supina).
- b. () Deve-se colocar a criança para dormir de lado ou de bruços, posicionando almofadas ou travesseiros firmes junto ao seu dorso.
- c. () É importante que o berço seja firme e os lençóis ou cobertas fiquem frouxos, a fim de permitir maior mobilidade à criança durante o sono.
- d. () É importante que o colchão do berço seja firme; entretanto, é fundamental que sejam posicionados objetos macios em volta da criança.
- e. () A criança pode ser colocada para dormir de “barriga para cima” (posição supina), lateralizada ou de bruços. A posição no berço não interfere na ocorrência de morte súbita em crianças.

26. O Brasil deu mais um passo no avanço das ações de saúde pública para a população de todo o País com a introdução da vacina contra o rotavírus no Calendário Básico de Imunizações para crianças. Esta vacina é administrada em crianças aos dois e aos quatro meses de idade para proteger antecipadamente a faixa etária em que se observa a maior incidência de complicações decorrentes da infecção pelo rotavírus (6 a 24 meses). Dois tipos de vacina contra rotavírus estão disponíveis internacionalmente: uma vacina preparada com vírus humanos atenuados e outra por reagrupamento de rotavírus bovino e humano (pentavalente). A vacina utilizada no Brasil é a de rotavírus humanos denominada vacina oral de rotavírus humano (VORH).

Em relação às contraindicações deste imunobiológico, é **correto** afirmar:

- a. () A vacina pode ser aplicada em indivíduos que fazem uso de medicamentos imunossuppressores como corticosteroides (prednisona > 2 mg/kg/dia por duas semanas ou mais, ou dose equivalente para outros corticosteroides) e quimioterápicos.
- b. () A vacina é considerada altamente eficaz, segura e isenta de eventos adversos, podendo ser aplicada, inclusive, em crianças que sabidamente tenham alguma forma de alergia grave (urticária disseminada, broncoespasmo, laringoespasmo e choque anafilático) a algum dos componentes da vacina, ou a dose prévia desta vacina.
- c. (X) A vacina está contraindicada em crianças com imunodeficiência primária ou secundária, pois não há dados sobre a segurança da vacina nesses indivíduos.
- d. () A vacina pode ser administrada a crianças com história de doenças gastrointestinais crônicas, malformação congênita do trato digestivo ou história prévia de invaginação intestinal.
- e. () A vacina pode ser administrada para pessoas de qualquer faixa etária; no entanto, o Ministério da Saúde preconizou sua administração em menores de 2 anos a fim de proteger antecipadamente a faixa etária em que se observa a maior incidência de complicações decorrentes da infecção pelo rotavírus (6 a 24 meses).

27. A susceptibilidade à infecção por tuberculose é praticamente universal. A maioria das pessoas resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial à doença; no entanto, alguns bacilos permanecem vivos, embora bloqueados pela reação inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas não conseguem impedir a multiplicação dos bacilos e adoecem na sequência da primoinfecção. Outros 5%, apesar de bloquearem a infecção nessa fase, adoecem posteriormente por reativação desses bacilos ou em consequência de exposição a uma nova fonte de infecção. Fatores relacionados à competência do sistema imunológico podem aumentar o risco de adoecimento. Entre estes, destaca-se a infecção pelo HIV, doenças ou tratamentos imunodepressores, idade (menor que dois anos ou maior que sessenta anos) e desnutrição. Por este motivo, recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos coabitantes de caso índice bacilífero.

Em relação aos procedimentos de prevenção recomendados para este caso, é **correto** afirmar:

- a. (X) Nestes casos, o recém-nascido não deverá ser vacinado com BCG ao nascer. A quimioprofilaxia deve ser administrada por três meses e, após esse período, faz-se a Prova Tuberculínica (PT).
- b. () O recém-nascido que receber a vacina BCG ao nascer, antes do primeiro contato com o caso índice bacilífero coabitante, não necessita fazer quimioprofilaxia primária, pois o imunobiológico confere imunidade à doença.
- c. () O recém-nascido coabitante de caso índice bacilífero deve realizar prova tuberculínica antes de receber a vacina BCG.
- d. () Todo recém-nascido coabitante de caso índice bacilífero deve realizar raio x de tórax antes de iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida.
- e. () O Etambutol, na dose de 4 -8 mg/kg de peso, é a droga de escolha para a quimioprofilaxia primária do recém-nascido.

28. A aferição de sinais faz parte do exame físico do histórico de enfermagem e sua avaliação auxilia o enfermeiro no planejamento das ações, na elaboração da prescrição de enfermagem e na tomada de decisão clínica. Os sinais vitais podem ainda ser mensurados isoladamente com o objetivo de conhecer/revisar a condição de saúde do paciente. A avaliação dos sinais vitais abarca: temperatura, pulso, pressão arterial, respiração e dor.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação à avaliação do pulso arterial, que pressupõe a análise da frequência e do ritmo cardíaco, assim como de sua amplitude e forma.

- () O pulso arterial amplo e rápido, denominado pulso em martelo d'água, é um sinal semiológico encontrado na insuficiência aórtica.
- () Taquisfigmia refere-se ao aumento súbito e simultâneo das frequências cardíaca e respiratória, acima dos parâmetros de normalidade estabelecidos para a idade.
- () Bradisfigmia refere-se a um pulso fino e bradicárdico.
- () Taquicardia refere-se a uma frequência cardíaca aumentada em relação ao parâmetro de normalidade estabelecido para a idade.
- () O pulso filiforme é cheio, amplo e irregular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V - V - V - F - F
- b. () V - V - F - F - F
- c. (X) V - F - V - V - F
- d. () V - F - V - F - V
- e. () F - V - F - V - F

29. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. É consenso que o rastreamento organizado do câncer do colo do útero é o desafio a ser vencido para que se obtenha a melhor relação custo-benefício possível com alta cobertura populacional.

Este sistema deve incluir:

1. Recrutamento da população-alvo, idealmente por meio de um sistema de informação de base populacional.
2. Adoção de recomendações baseadas em evidências científicas, que inclui definição da população-alvo e do intervalo entre as coletas, assim como a elaboração de guias clínicos para o manejo dos casos suspeitos.
3. Recrutamento das mulheres em falta com o rastreamento.
4. Garantia da abordagem necessária para as mulheres com exames alterados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () É correta apenas a afirmativa 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. A determinação do tipo de ferida é de fundamental importância para a tomada de decisão do profissional de saúde. O mercado disponibiliza atualmente uma gama de curativos industrializados indicados para os mais diversos tipos de feridas agudas e crônicas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação à cobertura do tipo hidrocólóide.

- () Estimula a angiogênese e o desbridamento autolítico.
- () Acelera o processo de granulação tecidual.
- () É indicado na prevenção e no tratamento de feridas abertas infectadas.
- () É indicado em feridas abertas infectadas, com intensa exsudação.
- () É indicado na prevenção ou no tratamento de úlceras de pressão não infectadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. () V – V – V – V – F
- c. (X) V – V – F – F – V
- d. () V – F – V – F – V
- e. () F – F – V – V – F

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>