

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



30 questões



S03

Enfermeiro Obstetra



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra, através da Interpraias; por mar, em barcos que transportam passageiros desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões, vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A expressão “Extremamente concorrida” equivale a *Com muitos turistas*.
- b. () A forma verbal “há”, do final do texto, equivale a *existem*.
- c. (X) A regra de acentuação gráfica de *Camboriú* aplica-se a *balaústre, saúde, viúvo*.
- d. () Para serem gramaticalmente corretas, as palavras *rainha, fortuito* e *gratuito* devem receber acento gráfico.
- e. () Em “Ofereço a você uma estada na região da Costa Brava” a expressão sublinhada equivale a *Ofereço-a*.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta clareza, lógica e correção gramatical.

- a. () Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
- b. () Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
- c. () Você quer que eu te mostre a Praia das Laranjeiras?
- d. () Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia das Taquaras.
- e. (X) Ana estava cônica de que visitava nosso melhor balneário.

3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os pontos e vírgulas (;) foram empregados para separar itens de uma enumeração.
- 2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
- 3. A expressão “através” equivale a *também*.
- 4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da Laranjeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase **correta**, em todas as formas verbais apresentadas.

- a. () Assim que eu for à Ponta do Santinho, em Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
- b. () Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso balneário.
- c. () Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia Brava.
- d. (X) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade de pescadores, ficarei contente.
- e. () A Praia dos Amores não tem realmente praia; se tivesse, é bom.

5. Analise o texto abaixo:

No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem conotação histórica de uma prática que vem sendo feita há muitos anos.

adapt. de <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br>: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

- a. (X) Em “aliada à manutenção da cultura regional”, substituindo a expressão “aliada” por asso-ciada, o acento de crase permanece.
- b. () A “conotação histórica” da pesca artesanal se deve à promessa de ganho financeiro dessa prática.
- c. () No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
- d. () Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser substituída por fazem, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
- e. () Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão, de um dos principais causadores do aquecimento global. Segundo os pesquisadores, a última vez que os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de anos.

Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.

- a. () Ozono (O₃)
- b. () Oxigênio (O₂)
- c. () Nitrogênio (N₂)
- d. () Vapor de água (H₂O)
- e. (X) Gás carbônico (CO₂)

7. Nos meses da temporada de verão Balneário Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à população local, compartilham a beleza natural e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade.

Em relação à população fixa do município, segundo projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de 2012, com cerca de:

- a. () 86 mil habitantes.
- b. (X) 113 mil habitantes.
- c. () 223 mil habitantes.
- d. () 343 mil habitantes.
- e. () 544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente, importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um importante órgão das Nações Unidas.

O órgão em questão é o (a):

- a. () Secretariado Geral das Nações Unidas.
- b. () Organização dos Estados Americanos (OEA).
- c. (X) Organização Mundial do Comércio (OMC).
- d. () Fundo das Nações Unidas para a Infância.
- e. () Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.

- a. (X) Brasil, Argentina e Uruguai.
- b. () Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- c. () Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
- d. () Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- e. () Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia, principalmente nas cidades de Benghazi e Trípoli.

Assinale a alternativa que indica outro acontecimento ocorrido naquele país e que teve grande repercussão mundial.

- a. () A insurreição civil contra o presidente Bashar al Assad.
- b. () A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
- c. () O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
- d. (X) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
- e. () A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Segundo as infrações e penalidades previstas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é **correto** afirmar:

- a. () A penalidade de advertência verbal é de competência da instituição empregadora onde está lotado o profissional.
- b. () A penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 60 dias.
- c. (X) A penalidade de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem.
- d. () A penalidade de multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 20 vezes o valor da anuidade da categoria de enfermeiro, independente da categoria de registro do infrator.
- e. () A penalidade de censura consiste na proibição do exercício de 50% da carga horária de trabalho do infrator por um período não superior a 15 dias.

12. Em que consiste a Credeização, cuidado imediato ao Recém Nascido (RN)?

- a. () Consiste na avaliação e realização de curativo do coto umbilical.
- b. (X) Consiste na aplicação de Nitrato de Prata a 1% para prevenir infecções gonocócicas.
- c. () Consiste na primeira verificação da temperatura corporal do RN por via retal.
- d. () Consiste na administração de vitamina K, por via intramuscular, para evitar uma deficiência na coagulação sanguínea.
- e. () Consiste na realização de lavagem gástrica para livrar o RN do perigo da aspiração de líquidos do parto.

13. A higienização das mãos é uma prática relativamente simples, porém muito importante para o controle de infecções nos serviços de saúde.

A respeito dos produtos e das técnicas de higienização das mãos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) O uso de clorexidina para a higienização das mãos nos serviços de saúde é eficaz no controle de infecções; contudo, a absorção pela pele é muito alta causando irritação, mesmo em concentração mínima.
- b. () Em geral, a higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.
- c. () Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparados aos sabonetes comuns.
- d. () Antissepsia Cirúrgica das mãos constitui uma medida importante dentre outras, para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico; sua finalidade é eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional.
- e. () A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada. Antes de iniciar qualquer uma das técnicas é necessário retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio), pois sob tais objetos podem acumular microrganismos.

14. Os estabelecimentos de serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) por eles gerados, cabendo aos órgãos públicos, dentro de suas competências, a gestão, regulamentação e fiscalização. Os RSS são classificados segundo grupos de risco.

Assinale a alternativa **correta** em relação à classificação dos resíduos perfurocortantes:

- a. () Perfurocortantes são resíduos do grupo C, são representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos.
- b. () Perfurocortantes são resíduos do grupo B, são identificados através do símbolo de risco (caveira) acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE.
- c. () Perfurocortantes são resíduos do grupo A, são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
- d. (X) Perfurocortantes são resíduos do grupo E, são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE.
- e. () Perfurocortantes são resíduos do grupo D, podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização, são armazenados em recipientes de cor cinza ou preta acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE.

15. Utilizando a Fórmula de Nägele, qual a Data Provável do Parto (DPP) para uma gestante multipara cuja data da última menstruação (DMU) foi no dia 17 de abril de 2013?

- a. (X) 24 de janeiro de 2014
- b. () 22 de janeiro de 2014
- c. () 17 de janeiro de 2014
- d. () 27 de dezembro de 2013
- e. () 17 de dezembro de 2013

16. A evolução clínica do parto pode ser dividida em 4 períodos.

Assinale a alternativa cuja sequência destes períodos está **correta**.

- a. () Período de Greenberg; Dequitação; Dilatação; Expulsão.
- b. () Dequitação; Dilatação; Expulsão; Período de Greenberg.
- c. () Período de Greenberg; Dilatação; Expulsão; Dequitação.
- d. () Dilatação; Expulsão; Período de Greenberg; Dequitação.
- e. (X) Dilatação; Expulsão; Dequitação; Período de Greenberg.

17. Avaliação somática de Capurro é um exame realizado em recém-nascidos para avaliação da Idade Gestacional.

Assinale a alternativa **correta** em relação às variáveis utilizadas por esta avaliação.

- a. () Pele, Lanugo (no dorso), seio, orelha, sulcos plantares, genital masculino/feminino.
- b. (X) Textura da pele, Forma da orelha, Glândula mamária, Pregas plantares, Formação do mamilo.
- c. () Diâmetro biparietal, Circunferência cefálica, Comprimento do fêmur, Circunferência abdominal.
- d. () Frequência cardíaca, Esforço respiratório, Tônus muscular, Irritabilidade reflexa, Cor da pele.
- e. () Cor da pele, Pregas palmares e plantares, Tônus muscular, Circunferência cefálica.

18. A Escala de Aldrete-Kroulik é utilizada como um dos parâmetros para alta do paciente da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Em relação aos aspectos avaliados por esta escala, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Atividade muscular; Respiração; Circulação; Consciência; Saturação de O₂.
- b. () Frequência cardíaca; Respiração; Tônus muscular; Irritabilidade reflexa; Cor.
- c. () Abertura ocular; Resposta motora; Resposta verbal.
- d. () Frequência cardíaca; Frequência respiratória; Pressão arterial; Temperatura corporal.
- e. () Nível de consciência; Reflexo pupilar; Frequência cardíaca; Frequência respiratória.

19. A esterilização sob vapor saturado sob pressão, um método físico obtido através da máquina denominada autoclave, é amplamente utilizado nos Centros de Materiais e Esterilização dos serviços de saúde por ser um método eficiente.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às vantagens deste método.

- () Esteriliza materiais termossensíveis, termorresistentes, óleos e pós.
- () Destrói esporos bacterianos.
- () Dispensa controle de qualidade.
- () Não apresenta riscos ocupacionais.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – F – V
- d. (X) F – V – F – F
- e. () F – F – F – V

20. Uma importante intercorrência na gestação pode ser o Descolamento Prematuro da Placenta (DPP).

Assinale a alternativa que **não** representa um sinal ou sintoma do DPP.

- a. () É um processo doloroso.
- b. (X) A placenta está inserida de forma anormal.
- c. () O hematoma retroplacentário está presente.
- d. () A palpação dos contornos fetais é impossível.
- e. () O sangramento vaginal pode ser oculto em 20% dos casos.

21. O Oligoidrâmnio caracteriza-se pela acentuada diminuição do volume do líquido amniótico, diagnosticado quando o volume se apresenta inferior a 250 ml, entre a 21^a e a 42^a semanas gestacionais. Incide em cerca de 3,9% a 5,5% das gestações.

Entre suas principais causas estão:

1. As patologias placentárias como a rotura prematura de membranas, a insuficiência placentária e o deslocamento prematuro de placenta.
2. Patologias fetais: crescimento intrauterino restrito, anomalias cromossômicas e anomalias congênitas (principalmente as do trato urinário).
3. Patologias maternas: diabetes associada a vasculopatias; hipertensão arterial; hipovolemia; síndrome antifosfolípido; colagenoses; uso de drogas inibidoras da enzima conversora da angiotensina e da síntese de prostaglandinas.
4. Patologias obstétricas: aloisoimunização do sistema ABO e Rh.
5. Antecedentes obstétricos mórbidos: placenta prévia em gestação anterior, história de gemelaridade e de abortamento de repetição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

22. A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo que promove a hemólise eritrocitária. Isso representa, em maior ou menor grau, o principal determinante das diversas manifestações clínicas da doença (anemia, hipóxia). É fundamental que o diagnóstico se antecipe à DHP. Isso pode significar que, ao se firmar o diagnóstico de DHP, reconhecemos que medidas importantes preventivas deixaram de ser tomadas antes e durante a atual gestação.

Assim, tratando-se da assistência pré-natal, são recomendadas as seguintes atitudes preventivas:

- a. () Solicitar o teste de Coombs indireto e a tipagem sanguínea com definição do fator Rh na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes, independente do conhecimento prévio do tipo sanguíneo e fator Rh da mulher.
- b. () Encaminhar todas as gestante com Rh negativo ao serviço de referência em pré-natal de alto risco.
- c. () Solicitar o teste de Coombs indireto e a tipagem sanguínea com definição do fator Rh na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes e seus companheiros, independente do conhecimento prévio do tipo sanguíneo e fator Rh de ambos.
- d. () Solicitar curva glicêmica para todas as mulheres com sangue Rh negativo, uma vez que a presença de diabetes gestacional está fortemente associada ao desenvolvimento de DHP.
- e. (X) Detectar a mulher com risco de desenvolver isoimunização maternofetal, pela solicitação da tipagem sanguínea com definição do fator Rh na primeira consulta de pré-natal. Caso se identifique fator Rh negativo, deve-se pesquisar a presença do anticorpo anti-D, por meio do teste de Coombs indireto.

23. A tuberculose (TB), doença antiga e reconhecida como fatal desde a época de Hipócrates, apesar de ser uma doença curável há mais de 50 anos, continua sendo a principal causa de morte por doença infecto-contagiosa em adultos no mundo. No Brasil, estima-se que uma em cada quatro pessoas esteja infectada pelo bacilo de Koch, agente etiológico da tuberculose. Há muito se discute a influência da gravidez no prognóstico da TB; no entanto, após o advento da medicação antituberculose, ficou comprovado que este prognóstico nas mulheres submetidas a tratamento adequado para TB é o mesmo, estejam ou não durante uma gestação.

Em relação ao tratamento da tuberculose durante a gestação, é **correto** afirmar:

- a. () Os antituberculostáticos não devem ser administrados no segundo trimestre de gestação em virtude de seu potencial teratogênico.
- b. () No Brasil, o esquema recomendado para as gestantes prevê o uso de R (rifampicina) e H (isoniazida) como dose de ataque, seguida de Z (pirazinamida) e E (etambutol) a partir do quarto mês de tratamento.
- c. () A estreptomicina é bastante segura para uso na gravidez, mesmo havendo relatos de efeitos teratogênicos em experimentações. É um bacteriostático que atualmente está sendo usado, no Brasil, no esquema básico de pacientes gestantes.
- d. (X) No Brasil, o esquema recomendado para as gestantes não é diferente dos esquemas para os outros pacientes. O esquema atual para todos os casos novos de TB é o esquema básico: R (rifampicina), H (isoniazida), Z (pirazinamida), E (etambutol).
- e. () O etambutol é um aminoglicosídeo que atravessa a barreira placentária com facilidade. É tóxico durante toda a gestação e atinge as áreas relacionadas com o oitavo par craniano, também podendo ser responsável por nefrotoxicidade. Pode afetar tanto a mãe quanto o feto e deve ser evitada na gestação ou pelo menos no primeiro trimestre, porque é a única droga antituberculose com documentação que comprova interferência no desenvolvimento da audição fetal, podendo causar surdez congênita.

24. Diante de uma paciente no período expulsivo ou no 2º período do trabalho de parto, com contrações fortes e frequentes (duas ou mais em dez minutos), com “puxos” (sensação de pressão no períneo) e/ou visualização de distensão perineal ou da apresentação de bebê na vulva, o profissional de saúde que assiste o parto deve, entre outras ações:

1. Posicionar a paciente em Laborie Duncan, com decúbito dorsal na mesa de parto verticalizada ou, se desejado, de cócoras. Não há diferenças nos resultados perinatais, embora a posição de cócoras possa reduzir a dor no terceiro período.
2. Auscultar os batimentos cardíofetais (BCF) a cada cinco minutos durante o período expulsivo; imediatamente antes, durante e após a contração uterina.
3. Em caso de distócia de ombros, é recomendado usar o fórcepe (manobra de Ritgen), com o objetivo de evitar a deflexão súbita da cabeça.
4. Realizar episiotomia seletivamente, somente nos casos em que exista indicação para seu uso (sofrimento fetal, uso de fórcepe, fetos grandes, cardiopatia materna, período expulsivo prolongado etc.). Deve-se realizar preferencialmente a episiotomia médio-lateral, que apresenta menor risco de extensão para reto e esfíncter anal.
5. Não proceder à aspiração da boca e do nariz do bebê com pera de borracha, pois este procedimento é contraindicado pelo risco de traumatizar as estruturas faciais do recém-nascido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Da mesma forma que a gravidez, o pós-parto – também denominado puerpério – é um período especial na vida de uma mulher e merece algumas considerações específicas. No puerpério podem surgir problemas de saúde ainda relacionados com a gravidez, responsáveis por muitas sequelas e até mesmo mortes de mulheres, provocadas por hemorragias e infecções.

A avaliação clínico-ginecológica no puerpério inclui:

1. Avaliação do estado psíquico da mulher.
2. Exame das mamas, verificando a presença de ingurgitamento, sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a amamentação.
3. Exame do abdômen, verificando a condição do útero e se há dor à palpação.
4. Observação do estado geral: a pele, as mucosas, a presença de edema, a cicatriz (parto normal com episiotomia ou laceração/cesárea) e os membros inferiores.
5. Seleção do método contraceptivo, informando que o preservativo e a minipílula são os únicos métodos recomendados durante o aleitamento materno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. O Boletim de Apgar não deve ser usado para indicar o início da reanimação. No entanto, ele é útil para avaliar a resposta do recém-nascido (RN) às manobras de reanimação no 1º e 5º minutos de vida e, se necessário, no 10º, 15º e 20º minutos. De igual modo, o Boletim de Apgar serve como um relatório numérico e muito prático para descrever a condição de nascimento e a recuperação do RN, quando reanimado.

Os sinais avaliados no boletim de Apgar incluem:

- a. (X) Frequência cardíaca, Respiração , Choro, Tônus muscular, Reflexos (estímulo nasal) e Cor.
- b. () Frequência cardíaca, Choro, Tempo de dequitação da placenta, Presença de Bossas e Icterícia.
- c. () Respiração, Frequência cardíaca, Presença de céfalo-hematoma, Circular de cordão e Tônus Muscular.
- d. () Frequência cardíaca, Respiração , Choro, Tônus muscular, Presença de Bossas e Céfalo- hematoma.
- e. () Frequência cardíaca, Respiração , Choro, Estímulo vagal e Determinação de Capurro.

27. Para estabelecer grupos de risco, prognóstico e ações profiláticas específicas, o Recém-Nascido (RN) deve ser classificado de acordo com a idade gestacional (IG).

Em relação a este tipo de classificação do recém-nascido, é **correto** afirmar:

- a. () RNPT é aquele que nasce com peso inferior a 2.500 g.
- b. () O RN pós-termo é aquele que nasce com peso elevado, acima de 4.500 g.
- c. () Os RNs considerados a termo são aqueles que nascem de mães com IG de 40 semanas.
- d. () O RN deve ser classificado como pequeno para a idade gestacional (PIG) quando nascer de mães com IG menor que 35 semanas.
- e. (X) Os RNs Pré-termo ou prematuros (RNPT) são aqueles que nascem de mães com idade gestacional (IG) de até 36 semanas e seis dias. Já Os RN Pós-termo ou pós-maturos, são aqueles que nascem de mães com IG de 42 semanas ou mais.

28. Nos serviços de atenção básica, os profissionais que realizam o pré-natal frequentemente são os que seguirão acompanhando a família durante a puericultura da criança. Sendo assim, o vínculo entre a equipe de saúde e a família para o acompanhamento da criança deve preferencialmente se iniciar desde o pré-natal. O nascimento de um bebê é um momento de transição-chave do ciclo de vida da família. Por tal razão, é muito comum o surgimento de dúvidas, inseguranças e questionamentos. A família deverá reconhecer a equipe de saúde como um ponto de apoio para a superação das dificuldades desta etapa.

Assim, visando avaliar o recém-nascido e identificar possíveis situações de risco ou de vulnerabilidade, o Ministério da Saúde recomenda que a sua primeira consulta no serviço de saúde ocorra:

- a. () A partir do 12º dia de vida, uma vez que a família precisa de tempo para reorganizar sua estrutura interna e modo de funcionamento com a chegada do bebê.
- b. () Aos trinta dias de vida, após o estabelecimento do vínculo mãe-pai-bebê, uma vez que os profissionais de saúde podem interferir negativamente neste processo.
- c. (X) Na primeira semana de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo e para orientar e realizar o teste do pezinho (triagem neonatal).
- d. () No próprio ambulatório do hospital que realizou o parto, logo após a alta da maternidade, a fim de garantir que ocorra o quanto antes a primeira avaliação da criança no serviço de saúde.
- e. () No centro de saúde de referência, a partir de 45 dias de vida do recém-nascido, aproveitando o momento para realizar a consulta de puerpério da mãe.

29. O exame ginecológico é um procedimento realizado nas consultas de enfermagem em saúde da mulher. Este exame inclui a inspeção vulvar, o exame especular e o toque vaginal. Não se deve perder a oportunidade para a realização do rastreamento do câncer do colo do útero em gestantes. Segundo o Ministério da Saúde, não está contraindicada a realização deste exame em mulheres grávidas, podendo ser feito em qualquer período da gestação, preferencialmente até o sétimo mês. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, descrita no Caderno de Atenção Básica ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO – Série A - Normas e Manuais Técnicos nº 32 (2012), a coleta do material para exame colpocitopatológico deve ser realizada considerando alguns cuidados específicos.

Em relação a estes cuidados, é **correto** afirmar:

- a. () Para a coleta do material em gestantes, é introduzido um espéculo vaginal e procede-se somente a coleta da endocérvice por meio de uma escovinha de Campos de Jordão.
- b. () A coleta do material do colo do útero para exame colpocitopatológico em gestantes deve ser realizada a partir de uma amostra da ectocérvice e da endocérvice, independentemente da idade gestacional.
- c. () A coleta do material endocervical em gestantes deve ser realizada somente no terceiro trimestre de gestação.
- d. (X) A coleta do material do colo do útero para exame colpocitopatológico deve ser realizada a partir de uma amostra somente da parte externa, a ectocérvice. A coleta da parte interna, a endocérvice, não deve ser realizada nas gestantes.
- e. () A coleta do material deve ser realizada imediatamente após o exame de toque vaginal bimanual, diminuindo assim o risco de desencadear trabalho de parto prematuro em gestantes com dilatação precoce do orifício cervical externo.

30. Úlceras de Pressão são feridas isquêmicas que ocorrem em tecidos moles, normalmente em áreas de proeminências ósseas. Ocorrem quando uma pressão aplicada à pele excede a pressão capilar normal, ocasionando diminuição da irrigação sanguínea e, consequentemente, falta de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que leva à formação do processo inflamatório e morte celular.

Não é considerada medida de prevenção de úlceras de pressão:

- a. () Usar hidratantes na pele.
- b. (X) Massagear as proeminências ósseas.
- c. () Não deixar a pele em contato com umidade de urina, fezes ou secreções.
- d. () Proteger áreas de fricção com coberturas protetoras.
- e. () Reposicionar a cada duas horas pacientes acamados e a cada uma hora quando sentado, sendo que a descompressão isquiática nos paraplégicos deve ser realizada a cada quinze minutos.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>