

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação à classificação diagnóstica em psiquiatria e considerando o DSM-IV-TR e a CID-10, julgue os itens a seguir.

- 51 A CID-10 propõe critérios rígidos para a classificação diagnóstica dos transtornos mentais.
- 52 Um paciente com diagnóstico de retardo mental leve que também apresente um transtorno psicótico breve deve ter ambas as condições registradas no Eixo I, segundo o DSM-IV-TR.
- 53 O DSM-IV-TR foi desenvolvido levando-se em consideração sua utilização em vários países, bem como nos Estados Unidos da América.
- 54 As expressões transtorno mental e condição médica geral ressaltam a dualidade entre a mente e o corpo contida em todo o texto do DSM-IV-TR.

Julgue os itens seguintes, relativos à psicopatologia dos transtornos mentais.

- 55 Na hipoprosexia, manifestação comum durante episódio depressivo, há redução da tenacidade e da mobilidade da atenção.
- 56 A hiperestesia é caracterizada pelo aumento global na intensidade da percepção tátil, visual e auditiva.
- 57 As alucinoses diferenciam-se das alucinações verdadeiras por serem adequadas e imediatamente criticadas pelo indivíduo, que reconhece o fenômeno como algo patológico.
- 58 Um paciente que informa corretamente seu endereço residencial mostra competência na utilização de sua memória operacional.
- 59 Em pacientes com diagnóstico de demência de Alzheimer, constata-se hipomnésia de fixação, sem qualquer prejuízo da memória de evocação.
- 60 A tenacidade é a capacidade de manter a atenção em determinado objeto por certo tempo.

A respeito dos fármacos utilizados em psiquiatria, julgue os itens de 61 a 66.

- 61 O intenso efeito sedativo da pimozida é explicado por sua potente ação de bloquear os receptores histaminérgicos.
- 62 A clorpromazina, uma fenotiazina alifática, é considerada um antipsicótico de baixa potência.

- 63 O uso da L-tri-iodotironina (T3) com vistas a potencializar a ação dos antidepressivos em pacientes refratários ao tratamento convencional não se justifica mais, pois a tiroxina (T4) produz a mesma resposta terapêutica e provoca menos efeitos colaterais.
- 64 Para adequado monitoramento dos efeitos colaterais associados ao uso da clozapina, é obrigatória a realização de hemograma com contagem de plaquetas semanalmente, no primeiro mês, e mensalmente, após esse período inicial.
- 65 Em paciente clinicamente estável que esteja em tratamento com tioridazina, a substituição da fluoxetina pelo citalopram induz recaída em decorrência da redução do nível sérico do antipsicótico.
- 66 O metilfenidato pode ser administrado com segurança para pacientes com mais de seis anos de idade.

Julgue os próximos itens, referentes a transtorno depressivo em idosos.

- 67 Embora seja amplamente prescrito para idosos deprimidos, o citalopram deve ser usado com cautela e em doses menores que as habituais, devido ao risco de prolongamento do intervalo QT do eletrocardiograma nessa população.
- 68 Em decorrência do maior risco de recaídas, o tratamento farmacológico de manutenção da depressão deve ser continuado por maior período de tempo em pacientes idosos do que em adultos jovens.
- 69 Em pacientes idosos deprimidos e com demência, evidências científicas recentes indicam que o tratamento farmacológico da depressão tem eficácia reduzida quando comparado ao daqueles que não apresentam o diagnóstico de demência associado.
- 70 Nos idosos, assim como nos adultos jovens, a associação de lítio e de antipsicóticos atípicos é uma opção recomendada para aqueles pacientes que apresentam depressão refratária ao tratamento monoterápico com antidepressivo.
- 71 Evidências científicas atuais indicam que a depressão em idosos tem efeito negativo na recuperação de doenças médicas gerais.
- 72 O diagnóstico de depressão maior no idoso, com base na CID-10 e no DSMV-IV, deve ser feito com parcimônia, já que vários dos critérios diagnósticos estão naturalmente presentes nessa população devido a fatores como luto, doenças crônicas e perda de papéis sociais relevantes.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao modelo cognitivo da ansiedade e ao seu tratamento.

- 73** Para o caso de fobia social, a exposição a situações sociais está relacionada a uma atenção autocentrada aumentada, a sinais internos de ansiedade e a seus efeitos adversos sobre o desempenho.
- 74** Em pacientes com transtorno de pânico, a evitação e o comportamento de busca de segurança diminuem os sintomas de ansiedade a longo prazo.
- 75** Um indivíduo que concluir que viajar de avião é perigoso por se sentir ansioso cometerá um erro cognitivo definido como raciocínio emocional.
- 76** Estratégias como a supressão, o autorreasseguramento e a busca de reasseguramento dos outros são efetivas para o controle da ansiedade em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada.

Acerca dos transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, julgue os itens a seguir.

- 77** A intoxicação por inalantes manifesta-se frequentemente por intensa agitação psicomotora, devido ao fato de esses inalantes agirem como estimulantes do sistema nervoso central.
- 78** Tremores intensos, hipersonia e fala arrastada são critérios diagnósticos para a abstinência de álcool.
- 79** Em pacientes que justificam sua dependência alcoólica pela presença de sintomas depressivos, deve-se tratar, de forma agressiva e inicial, o transtorno de humor, para, posteriormente, focar a atenção no transtorno aditivo.
- 80** Os efeitos comportamentais da cocaína são atribuídos principalmente a seus efeitos nos receptores de dopamina (tipo D1 e D2), embora receptores de serotonina e noradrenalina também sejam implicados.
- 81** Midríase, taquicardia e sudorese são exemplos de manifestações associadas à intoxicação por alucinógenos.

A respeito da esquizofrenia e do transtorno esquizoafetivo, julgue os próximos itens.

- 82** Uma das hipóteses mais aceitas para a etiologia do transtorno esquizoafetivo é a de que os pacientes com esse transtorno tenham esquizofrenia e um transtorno de humor, simultaneamente.
- 83** Kurt Schneider classificou o roubo de pensamentos, a transmissão de pensamentos e as percepções delirantes como sintomas de primeira ordem da esquizofrenia.

No que se refere às perícias em psiquiatria, julgue os itens que se seguem.

- 84** O laudo pericial não deverá conter o diagnóstico do periciado, exceto nos casos em que a lei determine que sejam especificados.
- 85** Na avaliação pericial, o perito não deve se referir ao examinado como paciente, e quaisquer manifestações de cortesia, de gentileza ou de atenção excessiva devem ser evitadas, pois podem ser interpretadas como indicativas de parcialidade por parte do examinador.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), aos transtornos de hábitos e impulsos e às compulsões em geral.

- 86** Entre os medicamentos tricíclicos, a imipramina é a melhor opção para o tratamento de paciente com diagnóstico de TOC.
- 87** Os atos compulsivos são tipicamente egodistônicos.
- 88** A satíriase é o desejo sexual em nível extremamente aumentado no homem, considerado um transtorno de hábito e impulso.
- 89** Procedimentos neurocirúrgicos envolvendo capsulotomia anterior ou cingulotomia são úteis para o tratamento de pacientes com diagnóstico de TOC.
- 90** Em pacientes com diagnóstico de TOC, a dúvida patológica é o tipo de pensamento obsessivo mais frequente.
- 91** De acordo com a teoria psicanalítica, o transtorno conversivo é causado pela repressão de conflitos intrapsíquicos inconscientes, o que converte a ansiedade em um sintoma físico.

Com relação à compulsão pelo álcool, julgue o item seguinte.

- 92** A dipsomania representa o impulso periódico para ingestão de grandes quantidades de álcool.

A respeito da definição do transtorno factício, julgue o item abaixo.

- 93** No transtorno factício, o paciente tende a se colocar no papel de enfermo, obrigatoriamente.

Os transtornos de ansiedade estão entre as doenças mais prevalentes na clínica psiquiátrica. A respeito dessa doença, julgue os itens que se seguem.

- 94 Do ponto de vista psicopatológico, o pânico é definido como reação de medo intenso, de pavor relacionado geralmente a perigo imaginário de morte iminente, descontrole ou desintegração.
- 95 A angústia manifesta-se como sensação de aperto no peito, de compressão, de sufocamento.
- 96 Para concluir o diagnóstico de fobia social em indivíduos com menos de dezoito anos de idade, deve-se considerar que as manifestações clínicas tenham, no mínimo, uma duração de quatro meses.
- 97 A agorafobia é definida como uma sensação de ansiedade de estar em locais ou situações de onde pode ser difícil ou embaraçoso escapar, e onde o auxílio pode não estar disponível.
- 98 Atualmente, os antidepressivos são os medicamentos de primeira opção para o tratamento dos transtornos ansiosos.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos transtornos dissociativos.

- 99 Embora exista, nas histórias dos pacientes com diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, em quase 100% dos casos, um evento traumático, mais frequentemente ocorrido no período da infância, a causa desse transtorno é desconhecida.
- 100 Em se tratando de transtornos dissociativos, durante a fuga dissociativa, o paciente “viaja” para um lugar ao qual, inconscientemente, sempre desejou ir, mas nunca pode fazê-lo.
- 101 A dissociação da consciência representa a perda da unidade psíquica, frequente em pacientes histéricos.
- 102 A amnésia dissociativa é o sintoma dissociativo mais comum.

Com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), julgue os itens subsecutivos.

- 103 A atenção, prejudicada no paciente com diagnóstico de TDAH, resulta de alterações nas diversas áreas do sistema nervoso central, sendo a principal, o núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo anterior.
- 104 A distraibilidade é caracterizada por hipertenacidade e hipervigilância, comum em pacientes com diagnóstico de TDAH.

Julgue os itens a seguir, referentes aos transtornos alimentares.

- 105 A sitiofobia é a recusa sistemática de alimentos, geralmente associada à anorexia nervosa.
- 106 A ciproheoptadina é indicada para o tratamento da anorexia nervosa.

Com relação às alterações do sono, julgue o item abaixo.

- 107 A latência de sono REM em adultos dura cerca de cinquenta minutos.

Os transtornos da personalidade são difíceis de diagnosticar, por estarem presentes constantemente na vida da pessoa e por vezes não serem considerados patológicos. A respeito desses transtornos, julgue os próximos itens.

- 108 O transtorno da personalidade histriônica é caracterizado por uma afetividade superficial e lábil.
- 109 Indivíduos que exibem traços de comportamento impulsivo, com frequência, também apresentam níveis aumentados de 17-estradiol e estrona.
- 110 A tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas, é característica do transtorno da personalidade dissocial (antissocial).

Os transtornos do humor englobam especialmente a depressão, a distímia e os transtornos bipolares. Acerca desses diagnósticos, julgue os itens seguintes.

- 111 Hábitos repetitivos, como verificar se uma porta está fechada várias vezes, é um sintoma característico do episódio de mania.
- 112 Em pacientes com transtorno bipolar, episódio depressivo, deve-se usar como primeira opção os medicamentos antidepressivos.
- 113 Em psicopatologia, distímia é um termo que designa uma alteração básica do humor.
- 114 Tenacidade é a capacidade do indivíduo de fixar a sua atenção sobre determinada área ou objeto, e normalmente está comprometida em episódios de mania.
- 115 O estado de equilíbrio plasmático (do inglês *steady state*) associado ao uso de carbonato de lítio é atingido entre um a três dias após o início desse medicamento.
- 116 Com relação ao tratamento da depressão, cerca de um terço dos pacientes são refratários ao uso de antidepressivos.
- 117 O uso de antidepressivos tricíclicos está associado a efeitos colaterais anticolinérgicos, como, por exemplo: boca seca, aumento da pressão intraocular e constipação intestinal.

No que se refere às doenças mentais que ocorrem no puerpério, infância e adolescência e o retardo mental, julgue os itens subsequentes.

- 118 Nas manifestações psiquiátricas no puerpério, O Blues puerperal é bastante frequente e apresenta sintomas de humor mais graves em comparação com a depressão.
- 119 Um exame complementar útil para avaliação da inteligência de crianças é o teste de QI. Segundo o DSM IV, podem-se classificar os níveis de retardo mental de acordo com a pontuação obtida nesse teste. Para o diagnóstico de retardo mental severo, o QI deve variar entre 25-30 e 40-45.
- 120 Pica é um transtorno de comportamento alimentar que pode ocorrer em crianças e adolescentes e consiste em consumo de substâncias não nutritivas por, pelo menos, um mês.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



cespeUnB

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos