

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****CIRURGIÃO DENTISTA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que **NÃO** está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Estudos sobre o desenvolvimento de crianças associam mudanças a idades cronológicas específicas. Tarefas de desenvolvimento tendem a acontecer dentro da média de normalidade de faixas etárias, conforme o avanço da idade e isto tem importância prática para o dentista. Por exemplo, de forma geral, a idade com que uma criança conseguirá ter habilidade para utilizar o fio dental sozinho é a partir dos

- (A) dois anos.
- (B) três anos.
- (C) quatro anos.
- (D) cinco anos.
- (E) nove a doze anos.

QUESTÃO 27

Os anestésicos locais são drogas relativamente seguras quando utilizados da forma recomendada. As reações de superdosagem, alergia e idiosincrasia são muito importantes em relação aos anestésicos locais de uso em Odontologia. Dentre as reações adversas a drogas, as reações de superdosagem são as mais comuns. Entre os anestésicos tópicos, o que é menos propenso a produzir reação de superdosagem é a

- (A) lidocaína.
- (B) benzocaína.
- (C) articaína.
- (D) mepivacaína.
- (E) etidocaína.

QUESTÃO 28

Após a administração de alguns medicamentos e a utilização de algumas substâncias, reações alérgicas e reações de intoxicação podem se manifestar. Algumas vezes os sinais e sintomas de intoxicação podem ser confundidos, pelo paciente e pelo profissional, com reações alérgicas. No entanto, sabe-se que NÃO pode ocorrer alergia em uma pessoa viva com

- (A) bissulfito de sódio.
- (B) lidocaína.
- (C) adrenalina.
- (D) látex.
- (E) anestésicos tópicos.

QUESTÃO 29

Para que efetivamente possa ser realizada a promoção de saúde, é preciso que a primeira consulta odontológica seja realizada precocemente. A orientação da Academia Americana de Odontopediatria e da Associação Brasileira de Odontologia é de que a primeira consulta odontológica ocorra

- (A) ainda durante a gestação, para que as orientações sejam melhor aceitas, como, por exemplo, a utilização

- de bicos ortodônticos, prevenindo más oclusões.
- (B) no primeiro ano de vida, preferencialmente na época de erupção dos primeiros dentes decíduos.
- (C) no segundo ano de vida, quando mãe e bebê já estão adaptados à rotina um do outro e a presença de um estranho não será tão danosa à criança.
- (D) a partir do segundo ano de vida, mas antes da completa erupção dos dentes decíduos.
- (E) tão logo todos os dentes decíduos tenham erupcionado, coincidindo com uma maior maturidade da criança.

QUESTÃO 30

Tem-se notado, nos últimos anos, um aumento na ocorrência de lesões cervicais não cariosas, principalmente em pessoas mais velhas. Os fatores etiológicos mais comumente envolvidos no desenvolvimento desse tipo de lesão são a erosão, a abrasão e a abfração. O tratamento dessas condições tem início com a identificação e remoção ou redução dos fatores causais. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Erosão dental.
2. Abrasão.
3. Abfração.

- () Consumo frequente de refrigerantes.
- () Excesso de forças atuando sobre o(s) elemento(s) dentário(s).
- () Uso de palitos de dentes para higiene dentária.

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 1 – 3 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 31

“A infecção pelo HIV-1 cursa com amplo espectro de apresentações clínicas, desde a fase aguda (que pode ser assintomática, oligossintomática ou se manifestar como síndrome retroviral aguda), até a fase avançada da doença, com as manifestações definidoras da síndrome da imunodeficiência (aids). Em indivíduos não tratados, estima-se em dez anos o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença” (BRASIL. Recomendações para Terapia Antirretroviral em Adultos Infectados pelo HIV. 2008, p.13). Para estimar o prognóstico e avaliar a indicação de início de terapia antirretroviral, monitora-se a quantificação plasmática da carga viral do HIV e a contagem de células de defesa, particularmente,

- (A) dos neutrófilos.
- (B) das plaquetas.
- (C) dos linfócitos B.
- (D) dos linfócitos T CD8.
- (E) dos linfócitos T CD4.

QUESTÃO 32

Apesar da cárie e da doença periodontal serem inegavelmente as doenças bucais mais prevalentes, várias outras patologias bucais podem se manifestar com certa frequência. A lesão que clinicamente apresenta-se como uma desordem mucocutânea imunologicamente mediada, com padrão característico de linhas brancas que se entrelaçam (estrias de Wickham), podendo melhorar ou piorar em semanas ou meses, que geralmente não produz sintomas e que não necessita de tratamento específico é

- (A) a glossite romboide mediana.
- (B) o eritema linear.
- (C) o líquen plano reticular.
- (D) o líquen plano erosivo.
- (E) a acantose nigricans.

QUESTÃO 33

A leucoplasia oral é definida como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença e não implica uma alteração histopatológica específica do tecido. Seu diagnóstico não depende tanto de aparências definidas, mas da exclusão de outras lesões que se apresentam como placas brancas na boca. Apesar de não estar associada a um diagnóstico histopatológico específico, ela é caracteristicamente considerada uma lesão pré-cancerígena. Embora a etiologia permaneça desconhecida, alguns fatores parecem estar associados ao seu desenvolvimento, sendo considerado o mais importante fator etiológico desta condição

- (A) o tabaco.
- (B) o álcool.
- (C) a radiação ultravioleta.
- (D) a idade.
- (E) a presença de microrganismos, como a Candida.

QUESTÃO 34

Variações no número de dentes em desenvolvimento são comuns e diversos termos são úteis na descrição dessas situações. O termo que descreve a falta de desenvolvimento de um ou mais dentes é

- (A) hipodontia.
- (B) anodontia.
- (C) oligodontia.
- (D) microdontia.
- (E) hiperdontia.

QUESTÃO 35

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium leprae*. O Brasil ainda apresenta um número elevado de casos de lepra, sendo algumas regiões consideradas endêmicas pra esta doença, como é o caso de Dourados (MS). Quando não tratada precocemente, a hanseníase pode causar incapacidades ou deformidades no corpo. A campanha do Ministério da Saúde para este ano prevê peças publicitárias voltadas para a população em geral e profissionais da saúde, além de ações educativas nas escolas. De acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar precocemente os casos. Sobre as características da hanseníase, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Atualmente a lepra é classificada em duas categorias separadas, paucibacilar e multibacilar, com a distinção influenciando a forma de tratamento recomendada. As lesões bucais são mais comuns na forma multibacilar.
- () Dentre os sinais e sintomas, a presença de manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo com perda ou alteração de sensibilidade merece destaque. No entanto, em alguns casos, a hanseníase pode ocorrer sem manchas.
- () A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma infectante da doença e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio das vias respiratórias, podendo infectar outras pessoas suscetíveis. Outras formas de transmissão são: contato direto (aperto de mãos, beijo, abraços), relação sexual, aleitamento materno e doação de sangue.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – F.

QUESTÃO 36

A cárie dentária pode ser definida como o resultado de uma dissolução química da estrutura dentária causada por eventos metabólicos ocorridos no biofilme que cobre a área afetada (esmalte, dentina, cimento). Sobre a cárie dentária, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As lesões de cárie desenvolvem-se preferencialmente em sítios relativamente protegidos em que o biofilme se acumula ao longo do tempo.
- (B) A inserção de corpos estranhos na dentição, como restaurações, próteses ou aparelhos, pode resultar em

locais protegidos para o desenvolvimento do biofilme, favorecendo o surgimento de lesões cariosas.

- (C) A composição e espessura do biofilme, a taxa e composição da secreção salivar, a dieta e a concentração de íons flúor nos fluidos orais, podem contribuir na probabilidade de perda de minerais e na taxa com que isto ocorre.
- (D) A doença cárie é raramente autolimitante, a menos que o biofilme que cobre o sítio da lesão seja removido. Na ausência de tratamento, a cárie dentária progride até que o dente seja destruído.
- (E) Desde que o processo carioso tenha iniciado, é imprescindível que alguma medida clínica seja estabelecida por um odontólogo, independente da lesão ser ativa ou inativa, caso contrário, fatalmente a lesão progredirá para a cavitação.

QUESTÃO 37

A cárie é uma doença que exige um amplo exame para que a correta decisão de tratamento possa ser tomada. Todos os exames diagnósticos possuem erros inerentes. Dependendo do exame realizado, um número maior de resultados falso positivos pode ocorrer. Neste caso, corre-se o risco de deixar de instituir um tratamento adequado. Esses termos são bastante comuns para comentar a respeito do diagnóstico da cárie. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Verdadeiro positivo.
2. Falso positivo.
3. Falso negativo.
4. Verdadeiro negativo.

- () A doença está ausente e o resultado é negativo.
- () A doença está presente e o resultado é negativo.
- () A doença está presente e o resultado é positivo.
- () A doença está ausente e o resultado é positivo.

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 4 – 1 – 2.

QUESTÃO 38

A indicação de radiografias bite wing uma vez por ano em populações com baixa prevalência de cárie não se justifica mais. Em vez disso, a decisão deve ser baseada no benefício em relação aos riscos referentes à radiação e aos custos. Com base em dados epidemiológicos do risco de cárie em diversas idades e da taxa de progressão em crianças e adolescentes com baixa prevalência de cárie, quatro idades são consideradas fundamentais para a realização do exame bite wing. São elas

- (A) 3 anos; 5 anos; 12 anos e 16 anos.
- (B) 2 anos; 6 anos; 9 anos e 12 anos.
- (C) 5 anos; 8-9 anos; 12-14 anos e 15-16 anos.
- (D) 3 anos; 6 anos; 12 anos e 18 anos.
- (E) 2-3 anos; 6-8 anos; 12 anos e 17-18 anos.

QUESTÃO 39

Se as bactérias alojadas no canal radicular infectado tiverem acesso aos tecidos perirradiculares e o sistema imune do indivíduo for incapaz de suprimir a invasão, o paciente poderá apresentar um abscesso ou uma celulite. O abscesso pode evoluir para um espaço fascial e, devido à velocidade de progressão, o dente comprometido poderá ou não mostrar sinais radiográficos de aumento do espaço do ligamento periodontal. O tratamento nesses casos envolve a incisão e drenagem do abscesso e o tratamento endodôntico do dente comprometido para a remoção da fonte infecciosa. Quando um paciente apresenta-se com dor causada por um abscesso, sem que haja evidência radiográfica do dente causador, é preciso conhecer um pouco sobre a anatomia dos espaços faciais para determinar o dente que provavelmente originou o problema. Se houver comprometimento do espaço canino ou infraorbital, que é o espaço potencial entre o músculo elevador do ângulo da boca inferiormente e o músculo elevador do lábio superior superiormente, a fonte de infecção é o

- (A) incisivo central superior.
- (B) incisivo central ou lateral superior.
- (C) incisivo lateral ou canino superior.
- (D) canino superior ou primeiro pré-molar superior.
- (E) primeiro ou segundo pré-molares superiores.

QUESTÃO 40

Uma vez que tenha sido estabelecido que o paciente apresenta uma infecção que necessita de antibioticoterapia, ou seja, que há sinais de comprometimento sistêmico, e o tipo de antibiótico tenha sido escolhido, ele deve ser administrado apropriadamente. Isto implica manter a antibioticoterapia pelo tempo adequado. Deve-se manter a antibioticoterapia por até

- (A) 5 dias, independente de outros fatores.
- (B) 7 dias, independente de outros fatores.
- (C) 5 a 7 dias, dependendo do antibiótico utilizado.
- (D) 3 a 5 dias, dependendo do antibiótico utilizado.
- (E) 1 a 2 dias após a resolução clínica da infecção.

QUESTÃO 41

Traumatismos dentários são uma das principais ocorrências de urgência em Odontologia e o cirurgião-dentista deve estar preparado para realizar o tratamento adequado a cada caso. As radiografias são recursos essenciais para um exame mais preciso do tecido duro traumatizado. Para aumentar a probabilidade de diagnóstico de fraturas radiculares, translocações apicais e outras possíveis lesões, atualmente, recomenda-se que sejam realizadas pelo menos

- (A) duas radiografias, sendo uma bite wing e uma oclusal.
- (B) duas radiografias, sendo uma bite wing e uma pela técnica do paralelismo.
- (C) duas radiografias, sendo uma periapical e uma pela técnica do paralelismo.
- (D) quatro radiografias, sendo uma direta a 90° do ângulo do dente, duas a angulações verticais diferentes e uma radiografia oclusal.
- (E) quatro radiografias, sendo uma bite wing, uma periapical, uma lateral de nariz e uma radiografia oclusal.

QUESTÃO 42

Quando ocorre lesão dentária em consequência de um traumatismo, entre 0,9% e 13% apresentam envolvimento pulpar. Neste caso, várias são as opções de tratamento. O momento ideal para realizar o tratamento conservador da polpa dentária é quando a inflamação pulpar está superficial, o que ocorre ainda dentro das primeiras

- (A) 2 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 24 horas.
- (D) 36 horas.
- (E) 48 horas.

QUESTÃO 43

Embora dentes decíduos não devam ser reimplantados em caso de avulsão pelo alto índice de anquilose, dentes permanentes devem ser reimplantados o mais rapidamente possível, preferencialmente nos primeiros 15 a 20 minutos após a avulsão. Até este momento, o dente deve ser mantido em meio apropriado, sendo o meio preferido para isto

- (A) o leite, e o menos indicado a água.
- (B) a saliva, e o menos indicado o leite.
- (C) a saliva, e o menos indicado a água.
- (D) a saliva, e o menos indicado o soro fisiológico.
- (E) o soro fisiológico, e o menos indicado o leite.

QUESTÃO 44

A inflamação é um processo útil e benéfico para o organismo, que propicia o retorno à homeostasia. Quando ocorre uma lesão tecidual (seja por um trauma ou por um procedimento cirúrgico), ocorre uma série de eventos humorais e celulares que levam à contenção da lesão, à remoção do agente prejudicial, ao reparo do dano tecidual e à reposição da função do tecido lesado. Quando são utilizados anti-inflamatórios não esteroides (AINE), sua ação ocorre em função da inativação das enzimas ciclooxigenases. Porém, algumas condições sistêmicas requerem um cuidado maior na prescrição de AINE. Durante o primeiro e o segundo trimestres da gravidez, não se recomenda o uso de AINE. Caso seja absolutamente necessário, deve-se utilizar o fármaco com a maior experiência de uso, na menor dose e no menor tempo possível. O AINE mais bem indicado durante a gestação, ainda assim, contra-indicado após 30 semanas de gestação, é o

- (A) ácido acetil salicílico.
- (B) ibuprofeno.
- (C) naproxeno.
- (D) cetoprofeno.
- (E) diclofenaco sódico.

QUESTÃO 45

No Brasil, ainda há muita dificuldade para pessoas com deficiências terem acesso ao que lhes é garantido por lei, incluindo atendimento odontológico. Até mesmo os conceitos e terminologias utilizados precisam ser melhores divulgados para proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, além de uma estrutura de trabalho para a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência considera como deficiência

- (A) toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
- (B) uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
- (C) consequência da perda ou anormalidade de uma estrutura do ponto de vista funcional, ou seja, no desempenho de suas atividades.
- (D) a adaptação do indivíduo ao meio ambiente resultante da incapacidade.
- (E) uma redução efetiva apenas da capacidade intelectual que dificulta a integração social do indivíduo e reduz suas chances de viver sem o auxílio de outrem.

QUESTÃO 46

Todo artigo a ser esterilizado deverá ser acondicionado em embalagem criteriosamente selecionada para a segurança do processo. Em 15 de março de 2012 foi publicada no Diário Oficial da União a RDC n.15 de 15 de março de 2012 que, entre outras disposições, proíbe a utilização, como embalagem para produtos de saúde, de

- (A) papel grau cirúrgico.
- (B) papel Kraft.
- (C) tecido de algodão.
- (D) SMS.
- (E) caixas metálicas perfuradas.

QUESTÃO 47

A cárie precoce da infância geralmente é definida como aquela que ocorre em crianças com menos de 3 anos de idade. Crianças na faixa etária entre 12 a 30 meses possuem um padrão especial de cárie que difere das crianças mais velhas. Os dentes decíduos mais afetados pela cárie são os

- (A) primeiros molares inferiores.
- (B) primeiros molares superiores.
- (C) incisivos superiores.
- (D) segundos molares superiores.
- (E) segundos molares inferiores.

QUESTÃO 48

O tratamento restaurador atraumático (ART) é uma abordagem minimamente invasiva que tem influência na prevenção e na interrupção da lesão cariiosa. Sobre esta técnica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Para a remoção da dentina infectada, a escavação com instrumentos manuais é o método mais efetivo.
- (B) Poucos instrumentais são necessários para a realização do ART, entre eles destaca-se o machado, utilizado para conseguir acesso à lesão cariiosa.
- (C) O termo "atraumático" refere-se a uma abordagem que causa pouca ou nenhuma dor ou desconforto ao paciente, mesmo sem anestesia, que remove apenas o tecido dentário afetado e que minimiza o dano às superfícies dentárias adjacentes quando comparada ao uso dos instrumentos rotatórios.
- (D) Dentre os fatores que influenciam na longevidade das restaurações ART, a habilidade do operador parece ser o fator principal.
- (E) Após a remoção do tecido dentário cariado, a cavidade deve ser preenchida preferencialmente com cimento de óxido de zinco e eugenol ou, na sua ausência, com cimento de ionômero de vidro.

QUESTÃO 49

Qualquer fator que diminua a capacidade de transportar oxigênio pelo sangue induz à instalação da anemia, que é uma alteração relativamente comum. Vários são os tipos de anemias, mas a anemia considerada de maior gravidade é a anemia

- (A) perniciosa.
- (B) aplástica.

- (C) autoimune.
- (D) falciforme.
- (E) ferropriva.

QUESTÃO 50

A principal causa da gengivite e da periodontite é o acúmulo de bactérias sobre as superfícies dentárias. Sua remoção mecânica é considerada o principal meio para prevenir e impedir a progressão da doença periodontal, porém o tratamento mecânico pode não ser suficiente na eliminação de patógenos putativos, como o *Actinobacillus actinomycetemcomitans*. Sobre a utilização de antibióticos como coadjuvantes na terapia periodontal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As penicilinas e as cefalosporinas agem inibindo a síntese da parede celular. Ambas são de pequeno espectro e bactericidas. Entre as penicilinas, a amoxicilina tem sido escolhida para o tratamento da doença periodontal por sua considerável atividade contra vários patógenos periodontais, em níveis elevados no líquido gengival.
- () As tetraciclinas, clindamicinas e eritromicinas são inibidoras da síntese proteica. Apresentam amplo espectro de ação e são bacteriostáticas. Além do seu efeito antimicrobiano, as tetraciclinas são capazes de inibir a colagenase e isto pode interferir na decomposição do tecido na doença periodontal.
- () O metronidazol afeta especificamente a parte da microbiota bucal obrigatoriamente anaeróbia, mas não o *A. actinomycetemcomitans*, que é um anaeróbio facultativo. Assim, para tratar a periodontite associada ao *A. actinomycetemcomitans*, recomenda-se a associação do metronidazol à amoxicilina.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.