



M050007N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****CIRURGIÃO DENTISTA -
ODONTOPEDIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEERH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEERH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEERH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEERH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEERH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEERH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Análise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A maioria das alterações de desenvolvimento dos dentes é congênita. O início da formação dentária dá-se na sexta semana de vida intrauterina e várias alterações vistas clinicamente podem ter sua explicação na fase de formação dentária. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as alterações congênitas e de desenvolvimento.

- (A) A lâmina dentária principal dá origem a todos os dentes decíduos e aos molares permanentes, enquanto que (incisivos permanentes, caninos permanentes e pré-molares originam-se a partir dos botões de seus antecessores decíduos.
- (B) A erupção dos dentes decíduos leva de 4 a 12 meses após a coroa completa para ocorrer.
- (C) A ausência parcial de dentes é denominada hipodontia e a ausência completa, anodontia.
- (D) A geminação é o nome dado à união de dois dentes decíduos ou permanentes em desenvolvimento apresentam câmaras pulpares e canais radiculares separados.
- (E) O tratamento indicado para o *Dens in dente* é o selante ou a restauração do forame, para evitar o acúmulo de biofilme dentário e a instalação de lesão cariiosa no local.

QUESTÃO 27

Lesões de luxação podem acometer dentes decíduos e dentes permanentes. Quando ocorrer luxação lateral ou extrusiva em dentes permanentes, estes devem ser reposicionados tão logo seja possível. Dentes permanentes que sofreram luxação extrusiva e luxação lateral requerem, respectivamente, um tempo de imobilização fisiológica de

- (A) 48h e uma semana.
- (B) 21 dias e 45 dias.
- (C) duas semanas e quatro semanas.
- (D) 45 dias e 90 dias.
- (E) uma semana e duas semanas.

QUESTÃO 28

Uma bebê de 14 meses foi trazida por sua mãe com queixa de febre (38,5-39°C) desde a madrugada, a qual ela acreditava ser causada pela erupção dos elementos 51 e 61, já que havia passado por consulta médica de rotina no dia anterior e estava tudo bem com a criança. Sua crença vinha do fato da região em questão estar inchada e ela ter percebido uma espécie de “bolha” recobrando a região do elemento 51, com um conteúdo esbranquiçado que pouco tempo antes da consulta foi liberado e a “bolha” diminuiu muito. Apesar disso, não há indícios de que a criança sinta dor ou incômodo na região, já que, segundo a mãe, ela está se alimentando normalmente e não está levando a mão ao local. Neste caso, pode-se afirmar que a febre

- (A) não é causada por esta lesão, um cisto de erupção.
- (B) não é causada por esta lesão, um hematoma de erupção.
- (C) é causada por esta lesão, uma pérola de Epstein.
- (D) é causada por esta lesão, denominada lesão de Riga-Fede.
- (E) é causada por esta lesão, uma rânula.

QUESTÃO 29

“O odontopediatra deve conhecer o desenvolvimento psicológico de um bebê normal para poder atendê-lo com segurança e proporcionar conforto emocional para ele e sua família. (...) O desenvolvimento das crianças é marcado pelas fases pré-natal, oral e anal” (WALTER et al. Manual de Odontologia para Bebês, 2014). Alguns bebês podem apresentar comportamentos intensos, embora aparentemente não haja razão para isso. Uma explicação pode estar no histórico de sua gestação, pois sabe-se que emoções vividas pelas mães durante a gestação poderão ser sentidas pelo bebê a partir

- (A) da oitava semana de gestação.
- (B) do terceiro mês de gestação.
- (C) do quarto mês de gestação.
- (D) do quinto mês de gestação.
- (E) do sétimo mês de gestação.

QUESTÃO 30

A fase oral é aquela em que a boca é um centro de prazer para a criança. Por meio dos atos de sugar, morder e mastigar, ela explora o meio que a circunda. Nesta fase, a satisfação de prazeres e a própria subsistência estão ligadas à funcionalidade do sistema estomatognático. A fase oral ocorre entre o nascimento e os

- (A) 06 meses de idade.
- (B) 12 meses de idade.
- (C) 18 meses de idade.
- (D) 24 meses de idade.
- (E) 30 meses de idade.

QUESTÃO 31

Crianças abaixo de 5 anos de idade podem oferecer certa resistência para a higiene bucal. Estudos têm buscado qual seria a frequência mínima de escovação diária para esta faixa etária e, mesmo diante da possibilidade de associação com outros fatores de confusão, como nível social e consumo de açúcar, os dados obtidos nesses estudos suportam a recomendação de que a escovação deve ser realizada ao menos

- (A) uma vez ao dia.
- (B) duas vezes ao dia.
- (C) três vezes ao dia.
- (D) quatro vezes ao dia.
- (E) após o consumo de alimentos adocicados, quantas vezes forem necessárias por dia.

QUESTÃO 32

A exposição de crianças a várias fontes de fluoretos tem resultado em padrões variáveis de prevalência de fluorose. Uma das formas de controle propostas para a fluorose é por meio do uso racional de dentifrícios fluoretados por crianças. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito da utilização de dentifrícios fluoretados e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O efeito cariostático do dentifrício fluoretado tem sido relatado como dose-dependente, favorecendo a utilização de dentifrícios acima de 1000 ppm.
- () Dentifrícios com concentrações acima de 1500 ppm de fluoretos só devem ser indicados para pacientes com alto risco à cárie, como idosos e indivíduos com baixo fluxo salivar.
- () O número reduzido de estudos realizados com dentifrícios contendo 500 ppm de fluoretos não permite uma conclusão quanto à sua efetividade quando comparados aos dentifrícios convencionais. Assim, dentifrícios com 1000 a 1100 ppm de F devem ser preferidos mesmo para crianças.

- (A) V – V – V
- (B) F – F – V
- (C) F – V – F
- (D) V – F – F
- (E) V – V – F

QUESTÃO 33

Cada vez mais os cimentos de ionômero de vidro (CIV) têm sido utilizados devido às suas propriedades de biocompatibilidade e liberação de fluoretos. Sobre estes materiais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os níveis salivares de fluoretos permanecem significativamente aumentados por longos períodos após a realização de restaurações de CIV. Isto se deve ao fluoreto originalmente presente no material, razão pela qual CIV convencionais são considerados melhor indicados para a técnica de ART do que os CIV modificados por resina.
- (B) O uso de CIV em restaurações realizadas pela técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART) se mostra efetivo tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes, sendo o sucesso clínico destas restaurações comparável ou até mesmo superior ao de restaurações classe I convencionais de amálgama após 3 ou 6 anos de acompanhamento.
- (C) O uso de CIV como selante de fossas e fissuras mostra resultados bastante satisfatórios, apresentando efetividade clínica semelhante à de selantes resinosos, embora com menor taxa de retenção.
- (D) O contato com a saliva promove o envelhecimento do CIV, modificando-o. O CIV adquire propriedades semelhantes ao esmalte dentário, sendo denominado *pseudoesmalte*.
- (E) Cimentos ionoméricos são mais efetivos que cimentos resinosos na prevenção de lesões de cárie ao redor de braquetes ortodônticos.

QUESTÃO 34

Vários estudos clínicos e laboratoriais têm demonstrado a efetividade dos géis fluoretados no controle da cárie dentária. Sobre sua utilização, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Para pacientes com risco moderado ou alto à cárie dentária, recomenda-se a aplicação de géis fluoretados _____ ao ano, embora uma frequência maior possa ser adotada diante de quadros mais severos. Para indivíduos de baixo risco à cárie, é suficiente _____.

- (A) quatro vezes / a aplicação do flúor gel a cada seis meses associado ao dentifrício e à água fluoretada
- (B) duas vezes / a aplicação do flúor gel a cada seis meses associado ao dentifrício e à água fluoretada
- (C) quatro vezes / a aplicação do flúor gel uma vez por ano associado ao dentifrício e à água fluoretada
- (D) duas vezes / a aplicação do flúor gel uma vez por ano associado ao dentifrício e à água fluoretada
- (E) duas vezes / o consumo de água fluoretada associado ao uso regular de dentifrício fluoretado

QUESTÃO 35

Cirurgias realizadas em pacientes odontopediátricos envolvem considerações únicas para esta população. Dentre os aspectos clínicos a serem considerados, está o manejo do comportamento da criança. Muitas crianças se beneficiam com a pré-medicação oral para o controle da ansiedade. A sedação está indicada apenas quando todos os outros métodos de contenção não tiveram êxito, com o objetivo de reduzir a ansiedade, proporcionando maior conforto e tranquilidade para o paciente, principalmente em tratamentos mais demorados. Benzodiazepínicos, hidrato de cloral, sedação inalatória com óxido nitroso, sedação venosa e anestesia geral podem ser utilizados, mas os benzodiazepínicos são os mais utilizados, por sua segurança. Dentre os benzodiazepínicos, o Diazepam é bastante utilizado, sendo a dose indicada de

- (A) 20 a 40 mg por quilo de peso em dose única.
- (B) 2 a 4 mg por quilo de peso em dose única.
- (C) 0,2 a 0,4 mg por quilo de peso em dose única.
- (D) 30 a 50 mg por quilo de peso em dose única.
- (E) 3 a 5 mg por quilo de peso em dose única.

QUESTÃO 36

Para a prescrição ou utilização de medicamentos em crianças, é preciso saber o peso da criança. Algumas vezes os pais ou responsáveis não sabem relatar quanto a criança pesa e uma fórmula pode ser utilizada para se ter o peso aproximado da criança, baseada em sua idade. De acordo com essa fórmula, uma criança de dois anos de idade tem peso aproximado de

- (A) 9 quilos.
- (B) 13 quilos.
- (C) 15 quilos.
- (D) 18 quilos.
- (E) 20 quilos.

QUESTÃO 37

Um recém-nascido é trazido por sua mãe, que está com dificuldade para amamentar. A criança nasceu com dois dentes (na região de incisivos centrais inferiores) e apresenta uma lesão na base da língua. Para poder realizar o plano de tratamento, inicialmente é preciso avaliar as condições de implantação e realizar uma radiografia. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O nome dado a esses dentes é dentes natais, aqueles que estão presentes logo ao nascimento.
- (B) A ocorrência desses dentes é relativamente rara, sendo os dentes mais associados os incisivos centrais inferiores.
- (C) Em cerca de 95% dos casos, esses dentes são da série normal.
- (D) A técnica utilizada para realizar o diagnóstico é a de Mannkopf, em que o tempo de exposição é de 2 a 3 décimos de segundos.

- (E) Se na radiografia forem observados, além dos dentes já erupcionados, apenas mais dois dentes na região dos incisivos centrais, tratam-se de dentes da série normal.

QUESTÃO 38

Uma criança com três anos de idade necessita de anestesia local para a realização de uma restauração no elemento 51. O procedimento deve ser rápido, com cerca de 15 a 20 minutos. A criança não apresenta qualquer comprometimento sistêmico. O anestésico de escolha e sua dose máxima é a

- (A) lidocaína 2% sem vasoconstritor, com dose máxima de 4,4 mg/Kg.
(B) lidocaína 2% com adrenalina 1:50.000, com dose máxima de 4,4 mg/Kg.
(C) lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, com dose máxima de 2,4 mg/Kg.
(D) lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, com dose máxima de 4,4 mg/Kg.
(E) mepivacaína 3%, sem vasoconstritor, com dose máxima de 4,4 mg/Kg.

QUESTÃO 39

Estudos epidemiológicos indicam que a gengivite de intensidade variável é quase universal nas crianças e adolescentes. Assim, o controle efetivo de placa deve ser incentivado. Uma das formas de monitorar o controle de placa pelo paciente é através de índices de higiene bucal. O índice de Greene e Vermillion simplificado (1964) é bastante utilizado pela simplicidade e rapidez de realização. Neste índice, os dentes e faces utilizados para verificar a presença de placa são usualmente os

- (A) primeiros molares permanentes (face vestibular dos molares superiores e lingual dos inferiores) e a face vestibular dos elementos 31 e 11.
(B) primeiros molares permanentes (face palatina dos molares superiores e vestibular dos inferiores) e a face vestibular dos elementos 31 e 11.
(C) segundos molares permanentes (face vestibular dos molares superiores e lingual dos inferiores) e a face vestibular dos elementos 41 e 21.
(D) segundos molares permanentes (face palatina dos molares superiores e vestibular dos inferiores) e a face vestibular dos elementos 41 e 21.
(E) últimos molares erupcionados, sendo a face palatina nos molares superiores e a face vestibular nos inferiores, e a face vestibular do elemento 21 e lingual do 41.

QUESTÃO 40

Estudos indicam que a prevalência de doença periodontal destrutiva em crianças é baixa, mas nem por isso deve ser negligenciada. Crianças e adolescentes podem adquirir qualquer das formas graves de periodontite, como a periodontite agressiva, por exemplo, que apresenta como característica primária uma história familiar de perda de osso e ligamento periodontal. A

profundidade de sondagem é uma das formas de identificação de sítios com a doença instalada. Ao redor de dentes deciduos, a profundidade de sondagem é de aproximadamente

- (A) 0,5 mm.
(B) 1,0 mm.
(C) 2,0 mm.
(D) 3,0 mm.
(E) 3,0 a 5,0 mm.

QUESTÃO 41

Alguns pacientes têm dificuldade para obter um correto controle do biofilme dentário. Para esses pacientes, pode-se indicar um agente químico como medida suplementar às manobras mecânicas de remoção do biofilme. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A clorexidina, mesmo na concentração de 0,12%, não deve ser utilizada por crianças, pelo risco de ingestão acidental e provável toxicidade.
() A clorexidina ainda pode ser considerada o mais efetivo suplemento da higiene bucal mecânica habitual.
() Agentes antimicrobianos, como a clorexidina, têm sido indicados principalmente para o controle do biofilme subgengival, onde a escova e o fio dental têm pouca ação.

- (A) V – V – V
(B) F – F – V
(C) V – F – V
(D) F – V – F
(E) V – V – F

QUESTÃO 42

Traumatismos envolvendo a face e a boca de crianças são bastante prevalentes e o odontopediatra deve estar preparado para dar o pronto-atendimento, assim como o acompanhamento correto a seus pacientes. Quando ocorre traumatismo com fratura radicular no terço apical ou médio de um dente decíduo, o tratamento imediato consiste na contenção por um tempo que varia de

- (A) 2 a 4 semanas.
(B) 15 a 45 dias.
(C) 30 a 45 dias.
(D) 45 a 60 dias.
(E) 4 a 6 meses.

QUESTÃO 43

Em traumatismos envolvendo a dentição decídua, deve ser realizada uma anamnese cuidadosa associada ao exame físico e radiográfico. De todas as lesões envolvendo dentes decíduos, o tipo de traumatismo que mais leva à perda dentária é a

- (A) luxação lateral.
- (B) luxação extrusiva.
- (C) luxação intrusiva.
- (D) concussão.
- (E) subluxação.

QUESTÃO 44

Quando o traumatismo resulta em fraturas dos dentes decíduos, algumas condições indicam a necessidade da exodontia do elemento, como é o caso de fraturas

- (A) coronárias complicadas.
- (B) coronárias não complicadas.
- (C) coronoradiculares não complicadas com extensão subgingival.
- (D) coronoradiculares complicadas sem extensão subgingival.
- (E) do terço apical da raiz.

QUESTÃO 45

A cirurgia envolvendo a maxila e a mandíbula de pacientes jovens é complicada pela presença dos folículos dentários em desenvolvimento. Para evitar injúria sobre os folículos, às vezes torna-se necessário alterações ou desvios no tratamento padrão. Por exemplo, a distração osteogênica pode ser uma boa opção para o tratamento de algumas anormalidades em pacientes odontopediátricos, porém, a longo prazo esta técnica pode estar associada a uma seqüela dentária. Distração osteogênica refere-se a uma técnica cirúrgica

- (A) para remoção de fragmentos dentários resultantes de traumatismos.
- (B) para remoção de fragmentos ósseos resultantes de traumatismos.
- (C) para preenchimento de defeitos ósseos causados por traumatismos.
- (D) de crescimento ósseo que pode alargar ou alongar ossos da boca, utilizada para tratar anormalidades craniofaciais.
- (E) de remoção de partes de tecido ósseo localizadas em regiões de extrema contaminação para evitar a disseminação da infecção, o que poderia resultar em necrose óssea.

QUESTÃO 46

Lesões de cárie, assim como traumatismos em crianças, ainda são bastante frequentes e, muitas vezes, seu tratamento requer a terapia pulpar. Assinale a alternativa INCORRETA sobre terapia pulpar.

- (A) O tratamento pulpar indireto está indicado para dentes decíduos e permanentes com lesões cariosas profundas, com alteração pulpar reversível e sem

evidência radiográfica de reabsorções patológicas externas ou internas.

- (B) Dentes que apresentarem dor provocada com curta duração ou por escovação, aliviada com a remoção do estímulo e uso de analgésicos, são compatíveis com o diagnóstico de pulpíte reversível e candidatos ao tratamento para polpa vital, que vão desde o capeamento pulpar indireto até à pulpotomia.
- (C) O tratamento pulpar indireto pode ser realizado por meio de três técnicas de intervenção mínima: escavação gradativa (também conhecida como tratamento expectante), tratamento restaurador atraumático e capeamento indireto.
- (D) O capeamento pulpar direto está indicado quando a remoção de tecido cariado resulta em exposição pulpar em um dente decíduo com polpa saudável ou com pulpíte reversível.
- (E) Atualmente considera-se que não há evidência científica que indique a remoção total de tecido cariado quando isto puder resultar em exposição pulpar, ou seja, em lesões profundas.

QUESTÃO 47

Sabe-se que em torno de 90% das lesões de cárie em crianças escolares ocorrem em fossas e fissuras, principalmente de faces oclusais. Para proteger essas regiões, são utilizados selantes que promovem uma proteção mecânica contra o acúmulo de placa bacteriana e restos alimentares. Sobre suas indicações, técnica e características, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode-se afirmar que selantes são efetivos em prevenir lesões de cárie em fossas e fissuras, sem apresentar riscos ou efeitos adversos para os pacientes.
- (B) A aplicação de selantes está indicada primariamente em indivíduos e populações com alto risco à cárie.
- (C) Não há evidências que indiquem que a incorporação de fluoretos ou de carga em selantes resinosos influencie em sua efetividade.
- (D) A profilaxia prévia ao condicionamento ácido é uma etapa que pode ser dispensada, já que o ácido fosfórico a 37% é suficiente para a remoção de biofilme e matéria orgânica.
- (E) O selamento de fossas e fissuras apresenta melhor relação custo-efetividade em relação às demais medidas preventivas de lesões cariosas em fossas e fissuras.

QUESTÃO 48

Todo paciente com diminuição do fluxo salivar, por qualquer que seja o motivo, está correndo maior risco para o desenvolvimento de lesões cariosas. Assim, se o clínico suspeitar que o paciente apresenta baixo fluxo salivar, deve proceder a um exame para confirmar ou descartar suas suspeitas. Pouca informação está disponível sobre o fluxo salivar em crianças, mas em crianças entre 5 a 15 anos de idade, pode-se afirmar que o fluxo salivar está baixo quando o fluxo salivar estimulado for menor do que

- (A) 0,5 ml por minuto.
- (B) 1,0 ml por minuto.
- (C) 1,5 ml por minuto.
- (D) 2,0 ml por minuto.
- (E) 5,0 ml por minuto.

QUESTÃO 49

Em casos de traumatismos em que ocorre a intrusão do dente decíduo, deve-se verificar se este foi para vestibular ou para palatino. Se o deslocamento foi para vestibular, deve ser realizada uma radiografia para verificar se ocorreu o rompimento da tábua óssea vestibular. A técnica que permite verificar isto é a técnica

- (A) de Randall.
- (B) lateral de nariz.
- (C) de Brammer.
- (D) periapical.
- (E) de Mannkopf.

QUESTÃO 50

O controle da dor é um dos aspectos mais importantes do controle comportamental em crianças submetidas ao tratamento odontológico. Experiências desagradáveis na infância podem causar fobia ao tratamento odontológico em adultos (MALAMED, 2005). Uma experiência desagradável que pode ocorrer com a utilização de anestésicos locais é a parestesia, que é mais comum quando se utiliza a

- (A) lidocaína.
- (B) prilocaína.
- (C) articaína.
- (D) etidocaína.
- (E) mepivacaína.