


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - PNEUMOLOGIA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre asma, assinale alternativa correta.

- (A) Medicamentos beta-2 agonistas orais de longa duração isoladamente são fármacos de primeira escolha no tratamento ambulatorial da asma leve controlada.
- (B) O tabagismo e a doença do refluxo gastroesofágico não interferem no controle da asma.
- (C) O uso de betabloqueadores orais pode causar broncoespasmo, assim como o uso de betabloqueadores na forma de colírios.
- (D) Os antileucotrienos possuem excelente ação broncodilatadora.
- (E) Aminofilina e corticosteroides orais são medicamentos de escolha no tratamento ambulatorial da asma leve.

QUESTÃO 27

Sobre tabagismo, assinale alternativa correta.

- (A) A terapia combinada apresenta amplo aumento na taxa de cessação do tabagismo, sendo a combinação mais usada a vareneclina com terapia de reposição de nicotina.
- (B) Insuficiência renal grave não é contraindicação ao uso de vareneclina.
- (C) Os fármacos de primeira linha para cessação do tabagismo são vareneclina, bupropiona, terapia de reposição de nicotina e nortriptilina.
- (D) São contraindicações ao uso de terapia de reposição de nicotina: gestação, infarto agudo do miocárdio há 2 semanas, arritmia, angina instável e acidente vascular encefálico.
- (E) Epilepsia não contraindica o uso de bupropiona.

QUESTÃO 28

Sobre doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assinale a alternativa correta.

- (A) Embora o tabagismo seja o principal fator de risco, somente 15 a 20% dos tabagistas desenvolvem a doença. Outros fatores de risco incluem a queima de biomassa e a poluição do ar nas grandes cidades.
- (B) É uma doença caracterizada pela obstrução reversível das vias aéreas e o principal tratamento farmacológico consiste no uso associado de broncodilatadores inalatórios de curta duração e corticosteroides.
- (C) Vacinação anti-influenza e antipneumocócica devem ser realizadas anualmente em todos os portadores de DPOC grave.
- (D) A progressão da doença e a sobrevida devem ser avaliadas somente pelo VEF1.
- (E) Segundo a Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), considera-se DPOC moderado, segundo a espirometria, a presença de VEF1 < 30% e a relação VEF1/CVF < 70% pós-broncodilatador.

QUESTÃO 29

Sobre tromboembolismo pulmonar (TEP), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O tratamento para TEP aguda deve ser iniciado imediatamente com heparina quando a suspeita clínica é intermediária ou alta, até a realização de exames confirmatórios do diagnóstico, desde que não haja contraindicações absolutas ao uso de heparina.
- II. A dosagem de D-dímero deve ser realizada em todos os pacientes suspeitos de TEP, mesmo em portadores de neoplasia, gestantes e idosos.
- III. Heparina não fracionada endovenosa pode ser infundida concomitantemente com estreptoquinase e uroquinase durante a trombólise.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

QUESTÃO 30

Sobre hipertensão arterial pulmonar (HAP), assinale a alternativa correta.

- (A) A hipertensão arterial pulmonar não é contraindicação formal para gestação.
- (B) Verapamil é a droga de escolha para os pacientes portadores de HAP e com resposta positiva ao uso de vasodilatadores obtida pelo cateterismo de câmaras direitas.
- (C) Doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças intersticiais pulmonares podem evoluir com HAP e o tratamento deve ser feito de forma idêntica à hipertensão arterial pulmonar idiopática.
- (D) HAP é definida hemodinamicamente por uma pressão média da artéria pulmonar maior que 25 mmHg em repouso ou maior que 40 mmHg durante exercício, com pressão capilar maior que 18 mmHg.
- (E) Na suspeita de HAP, o cateterismo cardíaco direito é o único método preciso de estabelecer o diagnóstico definitivo.

QUESTÃO 31

Sobre avaliação pré-operatória pulmonar e risco cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes obesos portadores de apneia e hipopneia do sono candidatos à cirurgia bariátrica devem realizar tratamento por pelo menos 12 meses antes do procedimento.
- (B) A reposição de nicotina pode ser utilizada no pós-operatório imediato em tabagistas que não conseguiram abandonar o hábito no período pré-operatório, desde que não haja contraindicações.
- (C) Paciente portador de asma controlada tem incidência de complicações pulmonares pós-operatórias inferiores ao paciente não pneumopata.
- (D) O filtro de veia cava deverá ser implantado em todo paciente portador de hipertensão pulmonar, uma vez que a anticoagulação será suspensa para a realização da cirurgia.
- (E) Nos portadores de doenças pulmonares fibrosantes, é recomendada a utilização de ventilação mecânica com altos volumes correntes e altas frações de oxigênio durante a anestesia geral.

QUESTÃO 32

Sobre pneumonia adquirida na comunidade (PAC), assinale a alternativa correta.

- (A) Fluorquinolonas são antibióticos que podem ser utilizados isoladamente no tratamento da PAC leve em gestantes.
- (B) Para o tratamento de pacientes internados em enfermaria e sem uso prévio de antibióticos, o esquema recomendado é a associação de um macrolídeo com um beta-lactâmico ou monoterapia com fluorquinolona respiratória, desde que não haja contraindicação para o uso.
- (C) Está indicado sempre coletar lavado broncoalveolar dos pacientes internados com PAC para isolamento do agente etiológico.
- (D) A confirmação da cura da PAC deve ser realizada pelo radiograma de tórax e pelo hemograma.
- (E) Uso de drogas injetáveis não é considerado fator de risco relacionado à presença de *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 33

Sobre tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Na gravidez, é contraindicado o uso de etionamida, estreptomicina, quinolonas e pirazinamida.
- (B) A mudança de coloração da urina para alaranjada ou avermelhada durante o tratamento com esquema básico requer suspensão imediata de todas as medicações em uso.
- (C) É indicação de quimioprofilaxia gestante HIV positivo contato de paciente portador de TB pulmonar ativa.
- (D) O tratamento para todos os casos novos de tuberculose pulmonar é composto de 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etionamida + 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- (E) O tabagismo não está associado à maior taxa de recidiva de tuberculose pulmonar.

QUESTÃO 34

Sobre micoses pulmonares, assinale a alternativa correta.

- (A) Fluconazol é a droga de escolha no tratamento da paracoccidioidomicose.
- (B) O tratamento de aspergilose broncopulmonar alérgica deve sempre ser realizado com fluconazol.
- (C) Pneumonia por *Candida albicans* é frequente e deve ser tratada com itraconazol.
- (D) As formas agudas leves e moderadas da histoplasmose pulmonar são geralmente de regressão espontânea, não necessitando de tratamento.
- (E) A pneumocistose em pacientes com HIV/ SIDA deve ser tratada sempre com Anfotericina B.

QUESTÃO 35

Sobre ventilação mecânica invasiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Paciente portador de DPOC em ventilação mecânica deve ser ventilado sempre com alta frequência respiratória (>12 por minuto), alto volume corrente (>10 ml/kg) e relação inspiração/expiração curta para não haver hipercapnia.
- (B) Pneumotórax hipertensivo é uma complicação observada em pacientes em ventilação mecânica e originada principalmente pela ruptura da pleura mediastinal ou de cistos subpleurais. O tratamento com drenagem pleural em selo d'água não é obrigatório.
- (C) No paciente asmático em ventilação mecânica devido ao broncoespasmo é recomendado aspirar frequentemente as vias aéreas, mesmo que o paciente apresente pouca secreção, pois o risco de piora do broncoespasmo é pequeno.
- (D) Na síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), deve-se ventilar o paciente com volume corrente maior que 10 ml/kg e não usar pressão expiratória final positiva (PEEP) alta, pois ela não oferece benefício na oxigenação.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 36

Sobre derrames pleurais, assinale alternativa correta.

- (A) Pneumonia, tuberculose e doenças do colágeno são causas frequentes de exsudatos.
- (B) No derrame pleural parapneumônico, a presença de bactérias no líquido pleural, pH >7,2 ou presença de pus indicam necessidade de tratamento através de toracocenteses seriadas.
- (C) Derrame pleural de pequeno volume, secundário a trauma torácico constitui indicação precisa de drenagem pleural em selo d'água.
- (D) A dosagem de Adenosina Deaminase (ADA) com valor de corte >20UI/L deve incluir como diagnóstico diferencial tuberculose pleural, artrite reumatoide, empiema e linfomas.
- (E) Deve-se tratar através de drenagem pleural todo derrame pleural, independentemente de seu tamanho.

QUESTÃO 37

Sobre bronquiectasias, assinale alternativa correta.

- (A) Macrolídeos podem ser usados de maneira prolongada no tratamento, mas sem redução na taxa de exacerbações, no volume de expectoração ou na diminuição da reatividade brônquica.
- (B) Existe pouca evidência para a recomendação do uso rotineiro de agentes mucolíticos, porém é indicada a utilização de rhD-Nase (DNase recombinante humana).
- (C) O tratamento cirúrgico está indicado nas bronquiectasias difusas quando não há controle dos sintomas com o tratamento clínico.
- (D) Os corticoides inalatórios podem ser utilizados em doentes muito sintomáticos, com uso frequente de antibióticos e grave perda funcional.
- (E) Hemoptise leve nos casos de bronquiectasias infectadas necessita de broncoscopia de urgência.

QUESTÃO 38

Em relação às pneumopatias intersticiais difusas, assinale alternativa correta.

- (A) A fibrose pulmonar idiopática deve ser tratada com corticoide oral em altas doses.
- (B) Pneumonia intersticial não específica apresenta opacidades reticulares bilaterais e simétricas associadas a bronquiectasias de tração com distribuição homogênea. Tem prognóstico semelhante à fibrose pulmonar idiopática e responde pouco ao tratamento.
- (C) Bronquiolite respiratória é mais frequente em homens tabagistas e seu prognóstico é bom, geralmente regredindo após cessação do tabagismo. Pode eventualmente evoluir para fibrose pulmonar.
- (D) Pneumonia em organização criptogênica ou BOOP nunca apresenta boa resposta com uso de corticosteroides orais.
- (E) A classificação da sarcoidose é feita pelo radiograma de tórax, sendo que o estágio II, definido por adenomegalia hilar/mediastinal, apresenta taxa de remissão espontânea de 55% - 90%.

QUESTÃO 39

Sobre tosse, assinale alternativa correta.

- (A) Tosse crônica apresenta duração entre 2 e 4 semanas e as principais causas são infecciosas.
- (B) As fases do reflexo da tosse são inspiratória, compressiva e expiratória, sendo que as causas mais comuns de tosse são síndrome da tosse de vias aéreas superiores ou gotejamento pós-nasal, doença do refluxo gastroesofágico e asma.
- (C) Tosse sempre deverá ser tratada com corticoide oral.
- (D) Tosse subaguda apresenta duração maior que 8 semanas e as doenças infecciosas são as principais causas.
- (E) A tosse é rara em pacientes portadores de doenças intersticiais pulmonares.

QUESTÃO 40

Sobre tumores de mediastino, é correto afirmar que

- (A) o carcinoma tímico é o tumor mais frequente do mediastino posterior.
- (B) o linfoma não Hodgkin é o tumor benigno menos frequente do mediastino anterior.
- (C) os paragangliomas devem ser tratados com radioterapia.
- (D) a maioria dos teratomas é maligna.
- (E) os tumores neurogênicos são os mais frequentes do mediastino posterior

QUESTÃO 41

Sobre pneumopatias supurativas, assinale alternativa correta.

- (A) O abscesso pulmonar deverá sempre ser tratado com antibioticoterapia por um tempo não inferior a 4 semanas e broncoscopias seriadas para aspiração de secreção e higiene brônquica.
- (B) O regime terapêutico padrão na fibrose cística inclui antibioticoterapia e suporte nutricional. Exercícios, agentes mucolíticos, broncodilatadores e anti-inflamatórios não possuem benefício ao paciente.
- (C) A azitromicina pode ser usada de maneira prolongada no tratamento, mas sem redução na quantidade e gravidade das exacerbações.
- (D) O tratamento do abscesso pulmonar com antibioticoterapia deve ser prolongado e não inferior a 4 semanas, acompanhado de fisioterapia para drenagem das secreções. A broncoscopia não deve ser realizada rotineiramente em todos os pacientes para aspiração de secreção.
- (E) Os principais diagnósticos diferenciais de abscesso de pulmão são câncer, tuberculose e histiocitose de células de Langerhans.

QUESTÃO 42

Sobre doenças ocupacionais pulmonares, assinale a alternativa correta.

- (A) A pneumoconiose dos trabalhadores do carvão é a primeira causa de óbito no mundo por doenças pulmonares ocupacionais e o tratamento com corticosteroides orais na doença em fase crônica não apresenta boa resposta clínica.
- (B) A silicose é a principal causa de óbitos por pneumoconiose no Brasil e não existe tratamento eficaz até o momento, devendo-se dar ênfase na prevenção através da eliminação e controle da exposição.
- (C) O exame de função pulmonar e a tomografia de tórax não são exames imprescindíveis no diagnóstico das pneumoconioses, uma vez que somente dados de exposição, exame clínico e radiografia de tórax são suficientes para fazer o diagnóstico.
- (D) Asma induzida por sensibilizante é definida como asma que surge após contato com agente causal, com período de latência e representa 10% do total de casos de asma ocupacional.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 43

Sobre ventilação mecânica não invasiva (VNI), assinale a alternativa correta.

- (A) VNI não está indicada em paciente com exacerbação aguda da asma.
- (B) VNI apresenta nível de recomendação "A" para a facilitação da extubação em pacientes portadores de DPOC submetidos à ventilação mecânica invasiva.
- (C) Síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) e pneumonia são condições com alto índice de eficácia da VNI, sendo baixo o índice de falha nestas condições.
- (D) Edema agudo pulmonar cardiogênico contraindica o uso de VNI.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

QUESTÃO 44

Sobre broncoscopia, assinale a alternativa correta.

- (A) A febre que surge 4 horas após coleta de lavado broncoalveolar significa infecção e deve ser tratada com antibióticos.
- (B) O lavado broncoalveolar deve sempre ser coletado após realização de biópsia transbrônquica.
- (C) Mesmo com radiografia de tórax normal, a broncoscopia deverá ser realizada na suspeita de aspiração de corpo estranho.
- (D) No grande queimado, não é indicado realizar broncoscopia para retirada de coágulos e avaliação das vias aéreas.
- (E) Em caso de fibrose pulmonar idiopática, o lavado broncoalveolar apresenta bom rendimento diagnóstico.

QUESTÃO 45

Em relação à síndrome de apneia e hipopneia do sono (SAHOS), assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de pressão positiva nas vias aéreas através de BIPAP é o melhor tratamento para SAHOS.
- (B) Rinite alérgica, tabagismo e uso de benzodiazepínicos não interferem com a SAHOS.
- (C) A obesidade é um fator que não tem relevância na SAHOS.
- (D) A presença de hipertensão arterial sistêmica não tem relação com aumento da probabilidade de ocorrência da SAHOS.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

QUESTÃO 46

Sobre pneumotórax, assinale a alternativa correta.

- (A) Radiologicamente, considera-se pneumotórax de grande volume quando a distância entre parede torácica e pulmão for maior que 2 cm ou a distância interpleural apical for maior que 3 cm.
- (B) O pneumomediastino deve sempre ser tratado com drenagem mediastinal em selo d'água.
- (C) A toracocentese no segundo ou terceiro espaços intercostais é suficiente para o tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo.
- (D) O pneumotórax espontâneo nunca apresenta recidiva após tratamento do primeiro episódio com drenagem pleural em selo d'água.

- (E) Para o diagnóstico e tratamento do pneumotórax, é imprescindível a realização de tomografia computadorizada de tórax.

QUESTÃO 47

Assinale alternativa correta.

- (A) Pneumonia por hipersensibilidade pode apresentar sobreposição de quadros agudo, subagudo e crônico no mesmo paciente, embora os quadros agudos sejam mais frequentes.
- (B) Suberose é a doença pulmonar de hipersensibilidade causada pela exposição à serragem de madeiras vermelhas.
- (C) A exposição crônica à poluição do ar não aumenta risco de câncer de pulmão.
- (D) A poluição do ar está relacionada com aumento na taxa de exacerbação de asma e DPOC.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

QUESTÃO 48

Sobre neoplasias de vias aéreas, assinale a alternativa correta.

- (A) Nódulos pulmonares acima de 4 cm de diâmetro têm rendimento diagnóstico de até 80% pela broncoscopia.
- (B) O carcinoma epidermoide representa a minoria das neoplasias malignas da laringe.
- (C) Pacientes com adenocarcinoma pulmonar estádios IIB e IV devem ser tratados sempre com cirurgia.
- (D) Carcinoma bronquíolo-alveolar é o tipo histológico com menor rendimento diagnóstico na biópsia transbrônquica.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 49

Sobre espirometria, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste de broncoprovocação é considerado positivo quando há queda sustentada no VEF1 de 10%.
- (B) A espirometria é útil no estadiamento da DPOC e na mensuração do volume residual (VR).
- (C) Pode significar distúrbio obstrutivo leve a redução isolada de FEF (fluxo expiratório forçado) 25-75% na presença de sintomas respiratórios.
- (D) Redução de capacidade vital (CV) com relação VEF1/CVF normal indica sempre restrição.
- (E) Distúrbio ventilatório obstrutivo grave é caracterizado pelo VEF1 > 40% do previsto.

QUESTÃO 50

Sobre doenças virais, assinale alternativa correta.

- (A) A gripe é causada sempre por vírus DNA do grupo influenza, subdividindo-se em tipos A, B e C e todos estes subtipos acometem humanos e animais como suínos e aves.
- (B) Mielite transversa, encefalite, miocardite e pericardite são complicações que podem ocorrer em decorrência de infecções virais de vias aéreas superiores.
- (C) O resfriado comum é causado principalmente por rinovírus, coronavírus, vírus sincicial respiratório e adenovírus e a duração dos sintomas habitualmente é maior que da gripe.
- (D) Em gestantes com gripe, pode-se usar Oseltamivir ou Zanamivir.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.