



M0003013N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em se tratando dos cuidados ao recém nascido, fazem parte do conjunto de indicações para a punção arterial e cateterização percutânea as seguintes alternativas, EXCETO

- (A) coleta de gasometria.
- (B) monitorização da necessidade de FiO_2 de acordo com a PaO_2 medida.
- (C) quando da impossibilidade de cateterização da artéria umbilical.
- (D) realizar o teste de hiperóxia.
- (E) administrar fluidos e medicamentos.

QUESTÃO 27

O cateter central de inserção periférica (PICC) é indicado em RN prematuros extremos e bebês em uso de hidratação venosa e nutrição parenteral por mais que sete dias e com manuseio restrito. Ele evita a prática da dissecação venosa e punções periféricas de repetição e tricotomia do couro cabeludo. Qual quer acesso venoso pode ser utilizado, porém a veia de preferência neste caso é a

- (A) basílica.
- (B) radial.
- (C) braqueal.
- (D) femoral.
- (E) inguinal.

QUESTÃO 28

A paracentese abdominal é indicada para o alívio dos sintomas em situações com distensão abdominal intensa com repercussão clínica (hidropsia, insuficiência cardíaca congestiva, ascite) e deve ser feita no

- (A) quadrante superior esquerdo.
- (B) quadrante inferior esquerdo.
- (C) quadrante superior direito.
- (D) quadrante inferior direito.
- (E) quadrante lateral direito.

QUESTÃO 29

A consequência mais temida da hiperbilirrubinemia é o/a

- (A) derrame pleural.
- (B) hepatite por hiperbilirrubinemia.
- (C) encefalopatia bilirrubínica.
- (D) síndrome tóxica da bilirrubina.
- (E) icterícia.

QUESTÃO 30

No período neonatal, os estímulos dolorosos se manifestam em múltiplos órgãos e sistemas. Tais alterações podem ocasionar aumento da morbidade e mortalidade neonatal. Sobre as manifestações sistêmicas da dor no período neonatal, informe se é verdadeiro (V) ou falso

(F) o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () No sistema cardiovascular, ocorre um aumento da frequência cardíaca e pressão arterial e variação de pressão intracraniana.
- () No sistema respiratório, ocorre diminuição do consumo de oxigênio, queda na saturação de oxigênio e alteração na relação ventilação/perfusão.
- () No sistema digestivo, ocorre aumento da motilidade gástrica
- () Durante o período de dor intensa, ocorre grande liberação de adrenalina, corticosteroides, glucagon, hormônio do crescimento, supressão da produção de insulina, tanto durante como após o episódio doloroso.

- (A) V - F - V - F.
- (B) F - F - V - V.
- (C) F - F - F - V.
- (D) V - F - F - V.
- (E) V - V - F - F.

QUESTÃO 31

Intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas para o alívio e manejo da dor durante procedimentos relacionados à dor aguda. Possuem eficácia comprovada e apresentam baixo risco para os bebês, assim como baixo custo operacional no que se refere aos cuidados intensivos. Dessa forma, alguns procedimentos não farmacológicos podem ser adotados, EXCETO

- (A) administração de substâncias adocicadas por via oral.
- (B) amamentação.
- (C) contato pele a pele.
- (D) aumento da estimulação tátil.
- (E) sucção não nutritiva.

QUESTÃO 32

Em RN pré-termo abaixo de 30 semanas de idade gestacional, após avaliação criteriosa da dor e da indicação do opioide, só deve ser iniciada sua administração se os RN apresentarem pelo menos

- (A) duas medidas normais de pressão arterial média no período mínimo de duas horas previamente ao tratamento.
- (B) três medidas normais de pressão arterial média no período mínimo de uma hora previamente ao tratamento.
- (C) uma medida normal de pressão arterial média no período mínimo de duas horas previamente ao tratamento.
- (D) cinco medidas normais de pressão arterial média no período mínimo de três horas previamente ao tratamento.
- (E) duas medidas normais de pressão arterial média no período mínimo de uma hora previamente ao tratamento.

QUESTÃO 33

No início da gestação, a água representa 95% do peso corporal do feto, e no final essa proporção cai para 75%. Esses valores são, por si, um forte indicativo da importância do manuseio hidroeletrólítico no recém-nascido. Sobre as perdas hídricas do RN, é correto afirmar que

- (A) as perdas fecais e respiratórias habitualmente são as mais importantes. As fecais representam em média 15ml/kg/dia, e as respiratórias dependem da atividade do RN e da umidade do gás inalado, variando de 70 a 140 ml/kg/dia.
- (B) as perdas urinárias não são significativas no RN. A função renal no feto é bastante desenvolvida, porém no nascimento ocorre rápida diminuição da filtração glomerular.
- (C) as perdas hídricas pela pele são as mais importantes no RN pré-termo. Mais de 2/3 das perdas insensíveis são transepidermicas. Entre os fatores que aumentam as perdas insensíveis estão o calor radiante, fototerapia e ambiente com baixa umidificação.
- (D) os RN prematuros cujas mães receberam esteroides antenatais podem ter suas perdas hídricas aumentadas pela aceleração da maturidade renal e epidérmica.
- (E) o uso de filme plástico sobre a pele e a aplicação tópica de óleo vegetal são técnicas contraindicadas pois colaboram para o aumento das perdas transepidermicas.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cuidados que devem ser seguidos durante o uso de fototerapia.

- (A) Verificar a temperatura corporal a cada doze horas para detectar hipotermia ou hipertermia, e o peso semanalmente.
- (B) Proteger os olhos com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolto em gaze.
- (C) Diminuir a oferta hídrica, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar diminuição da temperatura, com conseqüente aumento do consumo de oxigênio, da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele.
- (D) Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel toalha, pois a exposição de soluções de aminoácidos ou multivitamínicas ao comprimento de luz azul reduz a quantidade de triptofano, metionina e histidina.
- (E) Praticar a continuidade da fototerapia durante a alimentação, inclusive sem a retirada da cobertura dos olhos, independente do nível de bilirrubinemia.

QUESTÃO 35

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. "Sepse neonatal precoce é a que ocorre nas primeiras _____ de vida e está relacionada diretamente a fatores gestacionais e/ou do período periparto".

- (A) 12 horas
- (B) 24 horas

(C) 72 horas

(D) 04 horas

(E) 48 horas

QUESTÃO 36

Sobre os fatores de risco maternos e neonatais para a sepse em recém-nascidos, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção urinária materna está associada com maior risco de infecção neonatal, principalmente quando são casos tratados no início da gestação ou resolvidos antes do início do trabalho de parto, por aumentar as chances de trabalho de parto prematuro e nascimentos prematuros, além da frequência maior de corioamnionite.
- (B) Um dos fatores de risco materno é a ruptura prematura de membranas amnióticas por tempo superior a 72 horas, na qual a incidência de sepse em RN destas mães é de aproximadamente 81%.
- (C) A bradicardia fetal pode estar relacionada com sofrimento fetal secundário a quadro clínico inicial de sepse. A presença de batimentos cardíacos fetais entre 90-120 bpm está relacionada com maior incidência de sepse neonatal precoce.
- (D) A prematuridade é sem dúvida o fator de risco mais importante, responsável pela maior incidência de sepse neonatal precoce, frequentemente associado à pré-eclâmpsia materna, baixo peso ao nascer e asfixia perinatal.
- (E) O sexo feminino apresenta duas a seis vezes mais chances de sepse neonatal precoce que o masculino. Especula-se que a deficiência de receptores para interleucina-1 no sexo feminino poderia predispor à infecção.

QUESTÃO 37

É um método rápido e preciso para o diagnóstico de meningite, sendo obtido por punção lombar, submetido a exames bacteriológico, bacterioscópico e bioquímico, e contagem de células total e diferencial. O enunciado refere-se a qual tipo de exame?

- (A) Proteína C reativa.
- (B) Exame de líquido.
- (C) Urocultura.
- (D) Cultura de aspirado traqueal.
- (E) Hemocultura.

QUESTÃO 38

A sífilis congênita, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, é transmitida ao feto por mãe portadora de infecção ativa em qualquer estágio (principalmente nos estágios primário e secundário). Sobre esta patologia, é INCORRETO afirmar que

- (A) a prevalência de sífilis congênita é um evento sentinela em saúde porque reflete a eficácia tanto dos programas de controle, quanto dos serviços que oferecem assistência pré-natal.
- (B) o *T. pallidum* dissemina-se através da placenta, cordão

- umbilical, membranas e fluido amniótico para o feto.
- (C) o aleitamento materno resulta em transmissão para o RN, principalmente se houver lesão na mama.
 - (D) a transmissão pode ocorrer em qualquer período da gestação, sendo mais comum nos trimestres finais.
 - (E) o risco de infecção fetal é menor e o acometimento pela doença é menos grave quanto maior a duração da infecção materna.

QUESTÃO 39

As manifestações clínicas da sífilis congênita que ocorrem após o nascimento são arbitrariamente divididas em precoces (que aparecem nos primeiros 2 anos de vida) e tardias (após 2 anos de vida). Sobre estas manifestações, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. **Precoce.**
2. **Tardia.**

- () **Icterícia.**
- () **Lesões ósseas.**
- () **Lesões neurológicas.**
- () **Hepatoesplenomegalia.**

- (A) 1 - 2 - 2 - 1.
- (B) 1 - 1 - 2 - 2.
- (C) 2 - 2 - 2 - 1.
- (D) 2 - 1 - 2 - 1.
- (E) 1 - 2 - 2 - 2.

QUESTÃO 40

Sobre o risco e a gravidade da transmissão da toxoplasmose durante a gestação, é correto afirmar que

- (A) o risco de ocorrência de infecção congênita aumenta significativamente conforme a idade gestacional em que a mulher é infectada.
- (B) a doença é menos grave quando o feto é infectado no primeiro trimestre de gestação.
- (C) a doença é geralmente grave e sintomática quando o feto é infectado durante o terceiro trimestre.
- (D) o risco de ocorrência de infecção congênita diminui significativamente conforme a idade gestacional em que a mulher é infectada.
- (E) cerca de 1% das gestantes com toxoplasmose aguda transmitirão o Toxoplasma ao feto.

QUESTÃO 41

Sequelas tardias são muito frequentes na toxoplasmose congênita não tratada. Mesmo entre RN assintomáticos ao nascimento, estima-se que 85% apresentarão

- (A) anormalidades líquóricas.
- (B) microcefalia.
- (C) hidrocefalia.
- (D) crises convulsivas.
- (E) acometimento visual.

QUESTÃO 42

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. O risco de transmissão vertical do VHB é determinado pelo nível de vírus circulante no sangue materno e é maior na presença do antígeno

- (A) HBsAg.
- (B) AgHBe.
- (C) anti-AgHBs.
- (D) AgHBc.
- (E) AgHBs.

QUESTÃO 43

Alguns cuidados especiais devem ser tomados na sala de parto de RN de mães soropositivas para o HIV. Dentre os cuidados a serem tomados, qual deles é contraindicado nesta situação?

- (A) Os profissionais devem adotar as precauções básicas e universais para evitar a sua própria contaminação na manipulação de sangue e secreções.
- (B) O RN deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que estiver estável.
- (C) Caso tenha havido deglutição de sangue ou mecônio, pode-se promover a lavagem gástrica cuidadosa, evitando-se traumas de mucosas.
- (D) A aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve ser imediatamente realizada em todos os casos, para evitar acúmulo de secreção no RN.
- (E) Somente após a remoção de secreções maternas pode-se administrar medicações injetáveis.

QUESTÃO 44

Sobre a profilaxia com antirretroviral (ARV), preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. "A profilaxia com ARV deve ser administrada à criança logo após o nascimento, preferencialmente nas primeiras _____, mesmo que seja indicada com base apenas em um resultado positivo de teste rápido. Não é necessário aguardar testes confirmatórios".

- (A) 12 horas
- (B) 16 horas
- (C) 2 horas
- (D) 24 horas
- (E) 8 horas

QUESTÃO 45

Sobre a Síndrome da Dificuldade Respiratória (SDR) nos recém nascidos, assinale a alternativa correta.

- (A) Considera-se taquipneia quando, em repouso ou durante o sono, a frequência respiratória mantém-se persistentemente acima de 160 movimentos por minuto.
- (B) A apneia é um distúrbio do ritmo da respiração. É caracterizada por pausa respiratória superior a 20 segundos, ou entre 10 e 15 segundos se acompanhada de taquicardia, cianose ou aumento da saturação de oxigênio.
- (C) O gemido expiratório (sinal muito comum nos RN acometidos pela SDR) resulta do fechamento parcial da glote durante a expiração para manter a capacidade residual funcional (CRF) e prevenir o colapso alveolar nas situações de perda de volume pulmonar.
- (D) A Manobra de Valsalva é um sinal de aumento do trabalho respiratório e representa o movimento para cima e para baixo da cabeça, a cada respiração, pela contração da musculatura acessória do pescoço.
- (E) A cianose periférica, envolvendo a mucosa oral, é observada quando a concentração de hemoglobina reduzida excede 5g/dL, condição comum durante a hipoxemia grave.

QUESTÃO 46

A pneumonia neonatal é um processo inflamatório dos pulmões resultante de infecção bacteriana, viral ou fúngica, ou de origem química. Sobre esta patologia, é correto afirmar que

- (A) as pneumonias neonatais têm sido classicamente divididas em: precoces (até 24 horas de vida), com predomínio de bactérias Gram-positivas, e tardias, com predomínio de bactérias Gram-negativas.
- (B) as pneumonias adquiridas durante o nascimento são processos pneumônicos que ocorrem no ambiente intrauterino por via transplacentária, secundárias à infecção sistêmica materna.
- (C) as pneumonias adquiridas podem estar associadas com trabalho de parto prematuro, natimortalidade ou asfixia e insuficiência respiratória grave ao nascimento.
- (D) as pneumonias congênitas são processos inflamatórios que ocorrem devido à contaminação do feto ou do neonato por microrganismos que colonizam o canal de parto.
- (E) a pneumonia com frequência é um dos primeiros sinais de infecção sistêmica, estando associada a quadros como sepse e meningite neonatal.

QUESTÃO 47

A pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) nasal, associada aos avanços nos cuidados respiratórios, na terapia de suporte e nos sistemas de monitorização, surge como uma perspectiva de ventilação não invasiva para minimizar a lesão pulmonar. Seu emprego é fundamentado nos seguintes efeitos, EXCETO

- (A) aumenta a resistência inspiratória por dilatação das vias aéreas, o que torna possível a oferta de maior volume corrente para uma determinada pressão.

- (B) previne o colapso alveolar e melhora a complacência pulmonar.
- (C) aumenta a capacidade residual funcional (CRF), adequando os distúrbios da relação ventilação/perfusão.
- (D) conserva a função do surfactante alveolar, prevenindo os ciclos repetidos de colapso e insuflação das vias aéreas distais.
- (E) estabiliza a caixa torácica e otimiza a função do diafragma.

QUESTÃO 48

A administração de corticoide para a gestante pode prevenir e modificar a evolução da síndrome do desconforto respiratório do RN (SDR), otimizar os efeitos da terapêutica com o surfactante, após o nascimento, e reduzir a incidência de hemorragia peri-intraventricular (HPIV). Sobre o uso de corticoide é correto afirmar que

- (A) o tratamento consiste de duas doses de 12mg de betametasona administradas por via endovenosa a cada 24h ou quatro doses de dexametasona administradas por via subcutânea a cada 12h.
- (B) todas as gestantes entre 24 e 34 semanas de gestação com risco de parto prematuro devem ser consideradas como candidatas ao tratamento pré-natal com corticosteroides.
- (C) na ruptura prematura de membranas antes de 30 a 32 semanas de gestação e na ausência de corioamnionite clínica, o uso antenatal de corticosteroides está contraindicado.
- (D) em gestações complicadas, quando o parto antes de 34 semanas é provável, o uso antenatal de corticoides não está recomendado, pois existem evidências de que terá um efeito adverso na mãe.
- (E) nas gestantes elegíveis para terapia com tocolíticos, não é indicado o tratamento com corticoides.

QUESTÃO 49

“É produzido naturalmente pelas células endoteliais e age localmente sobre a musculatura lisa vascular, levando a seu relaxamento e consequente vasodilatação. Além de provocar vasodilatação e redução do *shunt* extrapulmonar, redireciona o fluxo sanguíneo para as regiões melhor ventiladas, adequando assim, a relação ventilação-perfusão”. O enunciado refere-se ao

- (A) óxido de zinco inalatório.
- (B) óxido de etileno inalatório.
- (C) óxido nítrico inalatório.
- (D) óxido de prata inalatório.
- (E) óxido de alumínio inalatório.

QUESTÃO 50

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Os principais sinais clínicos de baixo débito sistêmico no RN são:

- () taquipneia progressiva.
- () cansaço às mamadas.
- () bradicardia.
- () aumento da amplitude dos pulsos centrais e periféricos.

- (A) V - F - V - F.
- (B) F - F - V - V.
- (C) F - V - F - V.
- (D) V - V - F - F.
- (E) V - V - V - F.