

Cargo 864 Médico – Pediatria

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

QUESTÃO 41 _____

Acerca da nutrição do lactente, assinale a alternativa correta.

- (A) Até os seis meses de idade, o bebê deverá tomar apenas o leite materno e líquidos leves, tais como água, chás e sucos de fruta.
- (B) A alimentação complementar introduzida a partir dos seis meses de idade deve sempre ser oferecida com rigidez de horário, independentemente da vontade da criança, ainda que seja necessário deixá-la sem comer para que tenha fome na próxima refeição.
- (C) Açúcar, café e refrigerantes somente podem ser ofertados à criança a partir dos oito meses de idade.
- (D) Deve-se orientar a família a ofertar os mais variados e coloridos alimentos possíveis à criança, para que sua alimentação seja rica e nutritiva.
- (E) Assim que a alimentação complementar for iniciada, por volta dos seis meses de idade, deve-se retirar o leite materno, que não é mais necessário nessa fase.

QUESTÃO 42 _____

Assinale a alternativa que corresponde a uma contraindicação absoluta ao aleitamento materno.

- (A) Recém-nascido portador da síndrome de xarope de bordo, ainda que esteja em tratamento.
- (B) Mãe portadora de hepatite B, ainda que após o recém-nascido receber a vacina e a imunoglobulina específica ao nascimento.
- (C) Uso de ácido acetilsalicílico pela mãe, ainda que em doses baixas.
- (D) Mãe com mastite unilateral, ainda que seja ofertado o outro seio ao recém-nascido.
- (E) Uso de sedativos diazepínicos, ainda que em baixa dosagem, pela mãe.

QUESTÃO 43 _____

A respeito das principais parasitoses com incidência relevante na infância, assinale a alternativa correta.

- (A) A amebíase apresenta-se apenas na forma intestinal em seres humanos, não invadindo outros tecidos.
- (B) Para tratamento da amebíase não complicada em crianças, pode-se utilizar metronidazol 35 mg/kg/dia, dividido em três tomadas, durante cinco dias.
- (C) A ancilostomíase se transmite de pessoa a pessoa e possui período de incubação máximo de uma semana após a contaminação inicial.
- (D) A ascariíase é causada por um nematódeo e, em crianças, é altamente sintomática, podendo causar complicações graves com frequência muito elevada.
- (E) Para tratamento da ascariíase em crianças, utiliza-se o albendazol 50 mg/kg em dose única.

QUESTÃO 44 _____

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até morte. A doença evolui em três fases sucessivas: fase catarral, paroxística e de convalescença. (Ministério da Saúde, 2010).

A doença descrita trata-se de

- (A) febre tifoide.
- (B) difteria.
- (C) bronquiolite.
- (D) coqueluche.
- (E) pneumonia viral.

QUESTÃO 45 _____

Acerca da doença meningocócica, assinale a alternativa correta.

- (A) Raramente o quadro é grave, ocorrendo meningococemia.
- (B) Lactentes com doença meningocócica, em qualquer de suas formas de manifestação, sempre apresentam sinais de irritação meníngea.
- (C) O período de incubação é de 2 a 10 meses.
- (D) Não ocorre transmissão de pessoa a pessoa.
- (E) Os sinais de Kernig e Brudzinski, que demonstram a existência de irritação meníngea, são úteis no diagnóstico.

QUESTÃO 46 _____

Quanto às doenças diarreicas na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) Em crianças, oferece risco de morte apenas se o agente etiológico for uma bactéria.
- (B) Casos crônicos ou de repetição geram desnutrição crônica e retardo do desenvolvimento estatoponderal da criança.
- (C) Deve-se sempre aguardar o resultado do exame laboratorial que identifica o agente etiológico, antes de se iniciar qualquer medida terapêutica, ainda que de suporte.
- (D) As doenças diarreicas, geradas por qualquer que seja o agente etiológico, são de notificação compulsória no território nacional.
- (E) Quando se identifica que a origem da doença se dá pela presença de trofozoítos de *G. lamblia* ou *E. histolytica*, é recomendado o metronidazol na dose de 100 mg/kg/dia, dividido em três doses, por quinze dias.

QUESTÃO 47 _____

Com relação à desnutrição energético-proteica e à desvitaminose, assinale a alternativa correta.

- (A) Com frequência, é secundária ao hipotireoidismo.
- (B) As condições socioeconômicas não influenciam a incidência desse tipo de condição no Brasil.
- (C) Acarreta alterações no fígado, como a redução da síntese proteica e a esteatose, gerando edema e hipoproteinemia.
- (D) No quadro clínico, observa-se a hipertrofia muscular acompanhada de hiperatividade.
- (E) Observa-se sempre o aumento do débito cardíaco nessas crianças.

QUESTÃO 48 _____

Acerca das imunizações da criança no Brasil, assinale a alternativa correta de acordo com o calendário vacinal oficial do Ministério da Saúde.

- (A) Nos primeiros meses de vida, 2º, 4º e 6º mês, a criança deverá receber três doses da vacina pneumocócica 10 (conjugada).
- (B) Ao nascer, o bebê recebe apenas a vacina BCG.
- (C) A primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser administrada aos seis meses de idade.
- (D) Para meninas e meninos entre 8 e 11 anos de idade está prevista a imunização contra HPV.
- (E) Não se realiza mais imunização para poliomielite no País, em razão de a doença estar erradicada em nosso território.

QUESTÃO 49 _____

Assinale a alternativa que indica uma contraindicação absoluta para vacinação na criança.

- (A) Parto prematuro.
- (B) Febre, ainda que baixa.
- (C) Alergias de qualquer tipo, mesmo que não relacionadas com a vacina a ser aplicada.
- (D) Vacina para sarampo ou caxumba, quando a criança é alérgica à proteína do ovo.
- (E) Encefalopatia verdadeira ocorrida sete dias após a aplicação da DTP, que contraindica a aplicação da DTP.

QUESTÃO 50 _____

Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa correta.

- (A) O fechamento da fontanela anterior se dá totalmente entre o 24º e 36º mês de vida.
- (B) A ausência da terceira fontanela é sinal de existência da síndrome genética.
- (C) O pan-hipopituitarismo pode afetar o crescimento normal da criança.

- (D) A fontanela posterior deve ser palpável até o 6º mês de vida, fechando-se totalmente após o 12º mês, para que se possa considerar o desenvolvimento da criança como normal.
- (E) A velocidade de crescimento considerada normal para o lactente é de 5 a 15 cm/ano.

Área livre