

Cargo 869

Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

QUESTÃO 41 _____

Com relação às reações alérgicas ao gadolínio, assinale a alternativa correta.

- (A) Alta associação com insuficiência renal.
- (B) Pacientes com alergia ao iodo têm maior risco de desenvolver.
- (C) Mesmo risco que às reações ao iodo.
- (D) 50% ocorrem na primeira hora.
- (E) A reação mais comum é angioedema.

QUESTÃO 42 _____

Em relação à ultrassonografia com Doppler, assinale a alternativa que indica a técnica que melhor reduz o *aliasing*.

- (A) Diminuir o ganho.
- (B) Diminuir o ângulo da incidência.
- (C) Aumentar a frequência Doppler.
- (D) Aumentar o *pulse repetition frequency* (PRF).
- (E) Diminuir a profundidade.

QUESTÃO 43 _____

É correto afirmar que a estrutura causadora mais comum de quadril, em resalto (*snapping hip*) do tipo interno, é decorrente de

- (A) rotura labral.
- (B) corpo livre intra-articular.
- (C) tendão iliopsoas.
- (D) ligamento iliofemoral.
- (E) trato iliotibial.

QUESTÃO 44 _____

Assinale a alternativa que apresenta a melhor descoberta, na radiografia de tórax, para diferenciar doença da membrana hialina de aspiração meconial.

- (A) Volume pulmonar.
- (B) Derrame pleural.
- (C) Padrão intersticial.
- (D) Silhueta cardíaca.
- (E) Pneumotórax.

QUESTÃO 45 _____

A respeito de leucomalácia periventricular em prematuros, assinale a alternativa correta.

- (A) Os achados costumam ser assimétricos.
- (B) É uma sequela de hemorragia intraventricular.
- (C) A ultrassonografia transfontanelar consegue distinguir com clareza as formas hemorrágicas e não-hemorrágicas.
- (D) Cistos periventriculares são os achados mais precoces.
- (E) As regiões adjacentes ao triângulo dos ventrículos laterais são as mais comumente afetadas.

QUESTÃO 46 _____

Considerando uma ressonância cardíaca, assinale a alternativa que indica o melhor plano para visualizar ambas as válvulas - mitral e tricúspide.

- (A) Sagital.
- (B) Eixo longo horizontal.
- (C) Coronal.
- (D) Eixo curto.
- (E) Eixo longo vertical.

QUESTÃO 47 _____

O resultado de uma *core-biopsy* de mama mostra cicatriz radial. Considerando esse resultado, assinale a alternativa que indica a conduta recomendada.

- (A) Biópsia excisional.
- (B) Controle em seis meses.
- (C) Controle em um ano.
- (D) Mastectomia unilateral.
- (E) Mastectomia bilateral.

QUESTÃO 48 _____

A respeito do diagnóstico de hipertensão portal pela ultrassonografia, assinale a alternativa que apresenta o achado menos importante.

- (A) Veia porta dilatada.
- (B) Fluxo hepatofugal na veia porta.
- (C) Varizes perisplênicas.
- (D) Perda da variação normal do diâmetro da veia mesentérica superior durante a respiração.
- (E) Nodularidade da superfície hepática.

QUESTÃO 49 _____

A respeito dos tumores carcinoides, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria metastatiza.
- (B) Causam doença valvular cardíaca esquerda.
- (C) A maioria dos tumores carcinoides do apêndice tem evolução benigna.
- (D) O desenvolvimento da síndrome carcinoide não se relaciona com disseminação metastática.
- (E) O sítio mais comum de metástases são os pulmões.

QUESTÃO 50 _____

Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais do choque anafilático.

- (A) Hipovolemia.
- (B) Bradicardia.
- (C) Hipertensão.
- (D) Broncoconstrição/broncoespasmo.
- (E) Diarreia.