



M0543041N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**
**MÉDICO - NEONATOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí – veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve – is.
- (D) Ob – es – i – da – de.
- (E) Pos – si – bi – li – da – de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

RNT, nascido de parto cesáreo por descolamento prematuro de placenta, nasceu hipotônico, em apneia, arreflexo e com frequência cardíaca de 60 bpm. Foi reanimado, com APGAR de 1, 3, 4 e 7 nos 1º, 5º, 10º e 15º minutos. Foi indicada hipotermia neuroprotetora para o paciente, técnica que possui como temperatura alvo \_\_\_\_\_, sendo que, após seu término, a temperatura deve ser aumentada na velocidade de \_\_\_\_\_.

- (A) 33 a 34°C / 0,5°C/hora
- (B) 33,5 a 34°C / 0,5°C/hora
- (C) 33 a 34°C / 1,0°C/hora
- (D) 34 a 35°C / 0,5°C/hora
- (E) 34 a 35°C / 1,0°C/hora

### QUESTÃO 27

A enterocolite necrosante (ECN) é uma complicação que ocorre em recém-nascidos pré-termo de baixo peso, sendo a mais frequente emergência gastrointestinal do RN. Em relação à essa patologia, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A síndrome do intestino curto é descrita como a principal complicação futura nos pacientes cirúrgicos.
- II. A imunidade dos sistemas imune, circulatório e digestório explica a vulnerabilidade dos RNPT à doença.
- III. A nutrição enteral com fórmula artificial representa um fator de risco para a ECN.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas I, II e III.

### QUESTÃO 28

RNPT de 36 semanas e peso de 2900g, nasceu bem, com APGAR 9 e 10. Foi para o alojamento conjunto. Recebeu alta com a mãe, em aleitamento materno, após 30 horas de vida, com icterícia zona I. A tipagem sanguínea da mãe e do RN era compatível. No quinto dia de vida, estava mais sonolento, com dificuldade nas mamadas e mais icterício. Ao exame físico, encontrava-se icterício em zona 5, descolorado e com irritabilidade. Peso de

2400g e BT: 26 mg/dl (com predomínio de BI). Com base nesse caso, pode-se afirmar que

- (A) manter o aleitamento materno protege o RN da hiperbilirrubinemia, pela presença de enzimas que degradam a bilirrubina no intestino.
- (B) a alta precoce, com menos de 48 horas de vida, falhou nesse caso, o que favoreceu a ocorrência da hiperbilirrubinemia.
- (C) a idade gestacional (no caso de 36 semanas) e o peso de nascimento (no caso 2900g) não são fatores de risco para a hiperbilirrubinemia.
- (D) dosar a bilirrubina não é uma prática rotineira, pois a hiperbilirrubinemia é isenta de riscos.
- (E) esse paciente não corre risco de encefalopatia bilirrubínica pelo baixo nível de bilirrubina encontrado.

### QUESTÃO 29

São manifestações iniciais comumente descritas nos pacientes com suspeita de enterocolite necrosante, EXCETO

- (A) evacuação apenas com estímulo.
- (B) intolerância ao leite.
- (C) resíduos gástricos aumentados.
- (D) vômitos biliosos.
- (E) sangramento nas fezes.

### QUESTÃO 30

RN termo, com peso de nascimento de 3400g, de parto normal. Mãe refere não ter realizado o pré-natal. Nasceu e chorou, porém manteve-se cianótico e com dificuldade respiratória. Foi ofertado oxigênio, o que promoveu discreta melhora. Ao exame, apresentava abdome escafoide e murmúrio vesicular reduzido à direita. Qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso?

- (A) Atresia de esôfago.
- (B) Pneumotórax.
- (C) Hipertensão pulmonar.
- (D) Taquipneia transitória.
- (E) Hérnia diafragmática.

### QUESTÃO 31

RNT, nascido de parto cesáreo por descolamento prematuro de placenta, necessitou de reanimação em sala de parto. Porém a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não elevaram a FC do RN acima de 60 bpm. Foi necessária a administração de adrenalina por via endovenosa na dose de

- (A) 0,1 - 1 mg/kg.
- (B) 0,01 - 0,02 mg/kg.
- (C) 0,01 - 0,1 mg/kg.
- (D) 0,1 - 0,3 mg/kg.
- (E) 0,01-0,03 mg/kg.

**QUESTÃO 32**

A profilaxia do vírus sincicial respiratório (RSV) é feita por meio da administração de imunoglobulina contra o vírus, denominada palivizumab, e é utilizada em pacientes selecionados. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação e o número de doses a ser aplicada.

- (A) Displasia broncopulmonar / 3 doses.
- (B) Prematuridade inferior a 37 semanas / 5 doses.
- (C) Prematuridade inferior a 37 semanas / 3 doses.
- (D) Displasia broncopulmonar / 5 doses.
- (E) Prematuridade inferior a 35 semanas / 3 doses.

**QUESTÃO 33**

Manter a integridade estrutural e funcional do trato intestinal depende da oferta de nutrição enteral, cuja omissão deixa o recém-nascido sob risco de complicações intestinais. Qual alternativa que NÃO indica um benefício da alimentação trófica (ou nutrição enteral mínima)?

- (A) Favorece o ganho de peso.
- (B) Diminui o risco de displasia broncopulmonar.
- (C) Eleva os níveis de hormônios intestinais.
- (D) Diminui os dias de nutrição parenteral.
- (E) Antecipa a nutrição enteral plena.

**QUESTÃO 34**

RNT, nasceu de parto cesárea, com apneia e frequência cardíaca inferior a 100 bpm. Qual alternativa indica a conduta correta frente a esse caso, de acordo com o Programa de Reanimação Neonatal?

- (A) Iniciar estímulo tátil e, caso o recém-nascido não responda, realizar ventilação com pressão positiva.
- (B) Iniciar ventilação com pressão positiva e massagem cardíaca sincronizadas.
- (C) Iniciar ventilação com pressão positiva, com concentração de O<sub>2</sub> de 21%.
- (D) Iniciar ventilação com pressão positiva, com concentração de O<sub>2</sub> de 40%.
- (E) Iniciar ventilação com pressão positiva, com concentração de O<sub>2</sub> de 100%.

**QUESTÃO 35**

As cardiopatias no período neonatal podem ser graves, a ponto de causarem risco de morte no primeiro mês de vida. Portanto, é de fundamental importância a busca de sinais e sintomas que levam a suspeita precoce de uma cardiopatia. Em relação a essas doenças, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A redução ou ausência de pulsos em membros inferiores é sinal muito sugestivo de coarctação aórtica.
- (B) A amplitude elevada dos pulsos periféricos pode ser uma característica da persistência do canal arterial.
- (C) A hepatomegalia é um sinal muito significativo e evidente de congestão venosa sistêmica.

- (D) Os sopros cardíacos devem ser analisados quanto a localização, características, intensidade e irradiação.
- (E) Manifestações pulmonares não são frequentes nos quadros de insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 36**

RNT, nascido de parto normal, com APGAR 8 e 10, no primeiro e quinto minutos, começou a apresentar salivação excessiva, com episódios de tosse e cianose. Na passagem de uma sonda nasogástrica, houve resistência. Em relação à hipótese diagnóstica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Essa malformação pode estar associada a outras, como cardíacas, gastrointestinais e geniturinárias.
- (B) É comum nessa malformação a presença de gestação com oligodrômio.
- (C) Na radiografia de abdome, a presença de bolha gástrica não exclui o diagnóstico.
- (D) O paciente deve ser mantido em jejum, com alimentação através de nutrição parenteral.
- (E) O tratamento é cirúrgico, através de correção definitiva ou gastrostomia prévia com cirurgia definitiva posterior.

**QUESTÃO 37**

Em relação ao uso de oxigênio e suporte ventilatório (ventilação mecânica) em um recém-nascido com cardiopatia congênita, assinale a alternativa correta.

- (A) O oxigênio não é utilizado frequentemente em RNs com suspeita de cardiopatia congênita.
- (B) É sempre preferível um paciente com saturação regular e aceitável e com boa perfusão periférica a uma boa saturação com perfusão periférica ruim.
- (C) Não há cardiopatias nos casos em que a oferta de altas concentrações de oxigênio podem piorar o quadro clínico do paciente.
- (D) A ventilação mecânica pode trazer prejuízo em um paciente com cardiopatia e insuficiência congestiva por aumentar o trabalho respiratório.
- (E) É contraindicado o uso de sedativos e relaxantes musculares em RNs com cardiopatia e em ventilação mecânica.

**QUESTÃO 38**

Em qual das alternativas a seguir haveria indicação de transfusão de plaquetas?

- (A) Um RN termo, PIG, que está com 24 horas de vida, com dosagem de plaquetas de 52.000 u/mm<sup>3</sup>, e mãe hipertensa e diabética.
- (B) Um RNPT, com 48 horas de vida, que nasceu com peso de 700g, e está com dosagem de plaquetas de 40.000 u/mm<sup>3</sup>.
- (C) Um RN termo, com plaquetas de 75.000, com risco infeccioso e que necessita de coleta de líquido.
- (D) Um RNPT com 8 dias de vida e peso de 2000g, com plaquetas de 60.000u/mm<sup>3</sup>.
- (E) Um RN termo, estável, sem intercorrências, que está com plaquetas de 40.000 u/mm<sup>3</sup>.

**QUESTÃO 39**

É importante em uma UTI neonatal o controle rigoroso de infecções, utilizando medidas de prevenção, já que os pacientes são muito vulneráveis e são submetidos a vários procedimentos invasivos. Em relação às infecções relacionadas ao uso de cateteres, é correto afirmar que

- (A) nas infecções associadas ao cateter venoso central o agente etiológico mais frequente é um fungo (*Candida spp.*).
- (B) o uso de clorexidina alcoólica para inserção de cateter venoso central não reduz o risco de infecção.
- (C) a formação de biofilme nos cateteres é menos perigosa nos recém-nascidos, para a ocorrência de infecção, do que na população de adultos.
- (D) nos recém-nascidos é utilizada uma via exclusiva para a nutrição parenteral, para se evitar contaminações.
- (E) é contraindicada a inserção de cateter venoso central em RN de extremo baixo peso, pela sua pele frágil e risco de infecção.

**QUESTÃO 40**

A sepse neonatal é uma síndrome clínica caracterizada por sinais sistêmicos de infecção cuja incidência é elevada, especialmente nos recém-nascidos pré-termos com baixo peso de nascimento. Em relação à sepse neonatal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As bactérias da flora urogenital materna, com o *Streptococcus* do grupo B, são os patógenos mais frequentes.
- (B) A sepse fúngica é mais comum no RNPT grave, em ventilação mecânica, com nutrição parenteral prolongada e que já usou muitos esquemas de antibióticos.
- (C) Enquanto a sepse precoce está mais relacionada com germes do trato genitourinário materno, a sepse tardia está mais relacionada com germes hospitalares.
- (D) Apesar de na sepse ocorrer anormalidades da coagulação, não é descrito haver danos no endotélio vascular.
- (E) Geralmente o tratamento é com antibióticos de forma empírica, já que as hemoculturas apresentam baixa sensibilidade.

**QUESTÃO 41**

No choque séptico, utilizamos medicações para reverter o quadro do paciente. Em relação ao uso de inotrópicos para o tratamento e manejo do choque séptico, a sequência utilizada no caso de um choque refratário é

- (A) iniciar com volume, seguido de dopamina associada à dobutamina, seguida de hidrocortisona e milrinona se houver hipertensão pulmonar.
- (B) iniciar com volume, seguido de plasma fresco e bicarbonato e se não houver resposta, dopamina associada à hidrocortisona.
- (C) iniciar com volume, seguido de dopamina associada à

dobutamina, seguida de adrenalina (ou noradrenalina) e, se não houver resposta, usar hidrocortisona.

- (D) iniciar com volume, seguido de adrenalina associada à dobutamina, e, se não houver resposta, usar hidrocortisona apenas em RNT.
- (E) iniciar com volume e dopamina, seguida de dobutamina, se não houver resposta, iniciar milrinona e adrenalina.

**QUESTÃO 42**

Os quadros de insuficiência respiratória são muito comuns no período neonatal. É importante o diagnóstico e a intervenção precoces para se evitar a hipoxemia e outras complicações. Sobre a taquipneia transitória do RN, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os pacientes mais acometidos são RNPT, com idade gestacional entre 30 e 35 semanas.
- (B) Essa doença é descrita como um distúrbio respiratório autolimitado que ocorre nas primeiras horas de vida.
- (C) Radiologicamente, há hiperinsuflação pulmonar com horizontalização das costelas.
- (D) Entre os diagnósticos diferenciais estão: pneumonias, sepse, pneumotórax e outras.
- (E) O tratamento inclui o uso de oxigênio e muitas vezes de suporte ventilatório, principalmente do tipo não invasivo.

**QUESTÃO 43**

O pulmão do RNPT é mais susceptível à lesão pulmonar secundária à ventilação mecânica, devido a algumas características, incluindo as descritas a seguir, EXCETO

- (A) a sua estrutura ser mais imatura, tendo menos colágeno e elastina, quando comparado ao pulmão maduro.
- (B) encontrar-se preenchido de líquido ao nascimento e com capacidade residual funcional bem reduzida.
- (C) apresentar surfactante em maior quantidade que no recém-nascido a termo.
- (D) o fato de apresentar ocorrência fácil de volutrauma e atelectrauma, devido a volumes ventilatórios em excesso.
- (E) apresentar má perfusão pulmonar, que ocorre até que aconteça a sua expansão e queda da resistência vascular.

**QUESTÃO 44**

RN, 30 semanas de idade gestacional, com peso de nascimento de 1200g, nasceu de parto cesáreo por pré-eclampsia materna. Apresentou APGAR 7 e 9 nos 1º e 5º minutos respectivamente. Encaminhado para UTI neonatal aonde veio a apresentar desconforto respiratório leve. A glicemia capilar de entrada foi de 55 mg/dl. Com base no caso descrito, é correto afirmar que

- (A) o recém-nascido apresenta, no momento do internamento, quadro de hipoglicemia que deve ser tratado com infusão endovenosa de glicose.
- (B) o RN é considerado prematuro pela idade gestacional e também é considerado de extremo baixo peso.
- (C) esse paciente apresenta risco de apneia da prematuridade, sendo o tratamento de escolha as metilxantinas até a idade de 34 semanas de idade corrigida.
- (D) para o tratamento do desconforto respiratório é indicada a intubação orotraqueal e ventilação mecânica de imediato.
- (E) a dieta indicada nesse caso é a nutrição enteral, sendo a nutrição parenteral contraindicada.

**QUESTÃO 45**

O primeiro exame físico de recém-nascido é importante para se detectar alguma anormalidade e prosseguir ao tratamento, se necessário. Em relação ao exame físico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cor da pele é talvez o índice mais importante para avaliar a função cardiorrespiratória.
- (B) A frequência respiratória do RN é irregular e geralmente é de 40 a 60 incursões/minuto.
- (C) A frequência cardíaca é normalmente de 120 a 160 batimentos/minuto.
- (D) Os RNs podem ter anomalias cardíacas gravíssimas sem quaisquer sopros.
- (E) Não há necessidade de despir o RN, pois ele pode resfriar. Além disso, as anormalidades podem ser detectadas nas áreas descobertas.

**QUESTÃO 46**

Em relação à classificação de peso em recém-nascidos, qual correlação está correta?

- (A) Baixo peso ao nascer: menos de 2000g.
- (B) Muito baixo peso ao nascer: menos de 1700g.
- (C) Peso ao nascer normal: 2500 a 3999g.
- (D) Peso ao nascer normal: 2600 a 3700g.
- (E) Extremo baixo peso: menor de 700g.

**QUESTÃO 47**

A nutrição parenteral é muito utilizada na neonatologia para promover o adequado crescimento, principalmente de pacientes prematuros. Em relação a esse tipo de dieta, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É indicada para todo prematuro com peso de nascimento inferior a 1800g.
- (B) Seu objetivo é fornecer calorias e aminoácidos para prevenir balanços energéticos e calóricos negativos.
- (C) Promove ganho ponderal e de crescimento enquanto se aguarda a nutrição enteral adequada.
- (D) Para ser infundida em veia periférica, sua osmolaridade não deve ser superior a 900 mOsm/l.
- (E) A dextrose é a fonte de carboidrato nas soluções intravenosas.

**QUESTÃO 48**

Em relação à diminuição do volume urinário em recém-nascido, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As causas mais comuns de insuficiência renal são: asfixia, sepse e doença respiratória grave.
- (B) Pode haver retardo da micção em RN saudáveis, o qual não é preocupante em até 24 horas de vida.
- (C) Em neonatos de muito baixo peso ao nascer, a oligúria pode ser normal nas primeiras 24 horas de vida.
- (D) A oligúria existe quando o fluxo urinário é inferior a 0,5 ml/kg/hora.
- (E) A oligúria pré-renal deve responder ao aumento do débito cardíaco.

**QUESTÃO 49**

A hipercalemia não oligúrica ocorre na ausência de lesão renal, tendo seu diagnóstico baseado no nível de potássio sérico e no traçado eletrocardiográfico. Podem ser medidas de prevenção da hipercalemia não oligúrica, EXCETO

- (A) iniciar precocemente o uso de aminoácidos.
- (B) evitar transfusões sanguíneas sempre que possível.
- (C) evitar a desidratação.
- (D) usar potássio nos soros nas primeiras 72 horas.
- (E) manter o pH sanguíneo em valores de normalidade.

**QUESTÃO 50**

Assinale a alternativa correta em relação ao uso do sildenafil no tratamento da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPP).

- (A) Apresenta como efeito associado ao seu uso a ocorrência de vasoconstrição pulmonar.
- (B) Sua ação ocorre exclusivamente na vasculatura pulmonar.
- (C) É a opção secundária no tratamento da HPP, sendo a primeira escolha o óxido nítrico.
- (D) Um dos efeitos colaterais é a ocorrência de hemorragia craniana em prematuros extremos.
- (E) Em doses altas não apresenta efeito vasodilatador sistêmico.

