



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - UROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente de 13 anos, sexo masculino, é levado ao pronto-socorro por sua mãe com história de dor iniciada há 3 horas em região testicular direita, de forte intensidade. Sobre o caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame físico deve ser postergado até melhora da dor, pois pode agravar a sensação dolorosa.
- (B) O paciente deve ser liberado com receita de analgésico + anti-inflamatório + antibiótico + suspensório escrotal, com reavaliação ambulatorial após uma semana.
- (C) O sinal de Angell é sugestivo de torção testicular e o tratamento deve ser cirúrgico e precoce.
- (D) A conduta só pode ser tomada após realização de exame de imagem, mesmo se for preciso transferência para outro serviço.
- (E) Caso o sinal de Prehn esteja presente, deve-se encaminhar o paciente ao centro cirúrgico com urgência.

QUESTÃO 27

Paciente masculino, 62 anos, por receio do exame de toque, jamais havia procurado um médico urologista. No entanto, recentemente, tem apresentado piora do padrão miccional, com dificuldade para urinar, hesitação, jato mais fraco e sensação de urina residual.

Sobre os sintomas do trato urinário inferior, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas podem ser denominados “prostatismos”, pois são oriundos unicamente do crescimento prostático benigno comum na velhice.
- (B) Tais sintomas são ditos obstrutivos e refletem alteração na fase de esvaziamento vesical, podendo estar relacionados a alterações na bexiga, próstata e uretra.
- (C) O rastreamento com PSA e toque retal é fundamental, sendo o diagnóstico de câncer de próstata o mais provável nesse caso.
- (D) A ressecção endoscópica de próstata deve ser o tratamento inicial, caso a próstata seja menor que 60g.
- (E) A avaliação urodinâmica na avaliação inicial é obrigatória e norteia a conduta terapêutica.

QUESTÃO 28

Casado há 2 anos, um casal está tentando gravidez desde a lua de mel. O homem tem 45 anos e está no segundo casamento. Nega problemas testiculares e, em sua primeira união conjugal, também não teve filhos. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade da mulher não tem importância nesse contexto, pois o problema é eminentemente masculino.
- (B) A avaliação do cariótipo e pesquisa de microdeleção do cromossomo Y está indicada pelo tempo de infertilidade.
- (C) Trata-se de caso de infertilidade secundária.
- (D) Em caso de ausência de ductos deferentes palpáveis ao exame físico, deve-se pesquisar anormalidade no gene da CFTR (condutância transmembrânica da Fibrose Cística).
- (E) A realização de um espermograma é suficiente para dar o diagnóstico, na maioria dos casos.

QUESTÃO 29

O urologista de plantão é chamado para avaliar um paciente de 57 anos, em 7º PO de transplante renal, rim transplantado oriundo de doador falecido, por quadro de extravasamento de secreção citrina por ferida operatória. A respeito do quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) Se a dosagem do potássio e da creatinina da secreção estiverem iguais às concentrações plasmáticas, fica confirmada a hipótese de fístula urinária.
- (B) No caso de fístula urinária diagnosticada,

- a conduta deve ser expectante, pois as reoperações agregam risco aos transplantados.
- (C) Dentre as possíveis causas, a ligadura inadvertida de artéria polar superior deve ser considerada.
 - (D) A hipótese de fístula urinária fica descartada, pois o paciente já está no 7° dia pós-operatório.
 - (E) A anastomose pieloureteral (pelve do rim transplantado com o ureter nativo) pode ser necessária em caso de necrose ureteral do rim transplantado.

QUESTÃO 30

Tabagista de longa data, um paciente masculino, 72 anos, sempre temia o tumor de pulmão. Entretanto se assustou ao saber da relação do tabagismo com outras neoplasias, como as de bexiga. Sobre a neoplasia de bexiga, assinale a alternativa correta.

- (A) O tabagismo passivo não tem importância como fator de risco.
- (B) A onco-BCG está indicada em todos os casos de tumor vesical ressecado, pois diminui as recidivas.
- (C) A ressecção endoscópica deve ser repetida em caso de amostragem inadequada da camada muscular profunda e/ou pT1 alto grau.
- (D) O rastreamento com cistoscopia está indicado para todos os pacientes tabagistas de longa data.
- (E) A cistectomia videolaparoscópica deve ser considerada padrão-ouro, por associar-se a menor morbimortalidade que a cirurgia aberta convencional.

QUESTÃO 31

Em consulta de rotina, na Unidade Básica de Saúde (UBS), o médico generalista ficou em dúvida quanto à conduta para um paciente, do sexo masculino, com 48 anos e dosagem de proteína prostática específica (PSA) de 25 ng/ml. Esse paciente já havia realizado dosagem de PSA há 2 meses e o resultado era de 0,8 ng/ml. Ao exame, o toque retal não detectou nódulos. Encaminhado ao urologista, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta são, respectivamente,

- (A) prostatite/ antibioticoterapia 1 semana e após repetir dosagem.
- (B) prostatite/ antibioticoterapia 4 semanas e após repetir dosagem.
- (C) câncer de próstata localizado/ biópsia e cirurgia.
- (D) câncer de próstata localizado /biópsia e radioterapia.
- (E) câncer de próstata metastático/biópsia, cintilografia e bloqueio hormonal.

QUESTÃO 32

Paciente de 2 anos, sexo masculino, é levado à consulta pelos seus pais encaminhado pelo pediatra, que detectou criptorquidia à direita. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se esperar atingir a idade de 5 anos para indicar orquidopexia.
- (B) Como o paciente já tem 2 anos de idade, a cirurgia não está indicada.
- (C) Como o paciente já tem 2 anos de idade, a cirurgia indicada deve ser orquiectomia.
- (D) Como o quadro é unilateral, a chance de infertilidade no futuro é desprezível.
- (E) Na ausência de testículo palpável na região inguinal, a conduta deve ser laparoscopia.

QUESTÃO 33

Paciente masculino, 22 anos, vítima de acidente motociclístico, evoluiu com traumatismo raquimedular resultando em paraplegia e bexiga neurogênica. A respeito da bexiga neurogênica, é correto afirmar que

- (A) a avaliação urodinâmica deve ser feita de imediato, ainda na fase de choque medular.
- (B) nas lesões medulares altas, acima de T4, deve-se atentar para a disreflexia autonômica.
- (C) o cateterismo de demora é a abordagem de eleição nos pacientes com alto resíduo.
- (D) a apresentação clínica geralmente independe do nível e do grau da lesão neurológica.
- (E) a avaliação por exame de imagem, tal como ultrassonografia renal, é desnecessária no acompanhamento desse paciente.

QUESTÃO 34

Paciente feminina, 25 anos, estudante do 3° ano de Medicina, tem se interessado pelo estudo da fisiopatologia da formação de cálculos renais desde que presenciou o quadro de cólica renal que sua mãe passara há alguns meses. Em seus estudos, achou interessante a possibilidade de prevenção de cálculos renais, principalmente nos casos de distúrbios metabólicos associados. Assinale a alternativa que reúne a associação correta entre distúrbio metabólico e medida de prevenção.

- (A) Hiperuricosúria – uso de Tiazídicos.
- (B) Hipocitratúria - uso de Tiazídicos.
- (C) Hipercalcúria – uso de Tiazídicos.
- (D) Hipercalcúria – uso de inibidor da xantina-oxidase (alopurinol).
- (E) Cistinúria – uso de inibidor da xantina-oxidase (alopurinol).

QUESTÃO 35

As infecções urinárias representam importante causa de falta ao trabalho e hospitalização, com impacto socioeconômico relevante mundialmente. Sobre as infecções urinárias, é correto afirmar que

- (A) os sintomas de disúria e polaciúria são patognomônicos de infecção urinária.
- (B) as cepas nefritogênicas de *Escherichia coli* contendo adesinas tipo 1 ou manose sensível são as mais virulentas e podem causar pielonefrite mais facilmente.
- (C) o achado de nitrito positivo na urinálise indica germe gram-positivo.
- (D) exames de imagem estão indicados nos casos de recorrência, pielonefrite e sempre nas infecções em crianças.
- (E) bacteriúria assintomática deve sempre ser tratada na gestante, preferencialmente com uso de fluorquinolonas.

QUESTÃO 36

Paciente feminina, 72 anos, tem apresentado perda urinária há mais de 6 anos. Refere que inicialmente apresentava perda apenas aos grandes esforços, porém há alguns meses notou piora do quadro, perdendo urina em diversas situações (caminhar, levantar, pegar peso) e não conseguindo chegar a tempo ao banheiro quando tem desejo miccional. Sobre o quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro se agravou devido ao surgimento de incontinência urinária paradoxal (por transbordamento).
- (B) Cistocele pode estar associada, sendo normalmente um fator que exacerba a perda urinária aos esforços nos casos de cistocele grau III.
- (C) Fatores como mobilidade, destreza e grau de motivação devem ser avaliados, pois podem agravar o quadro.
- (D) Com o uso de antimuscarínico, a paciente tende a ficar seca, pois o diagnóstico é de urge-incontinência isolada.
- (E) O tratamento cirúrgico deve ser desencorajado, pois, após os 70 anos, a morbidade cirúrgica aumenta consideravelmente.

QUESTÃO 37

Agricultor de 74 anos chega ao pronto atendimento com história de anúria há cerca de 17 horas, associada à dor suprapúbica intensa. Ao exame, presença de globo

vesical. Sem outras comorbidades, estava utilizando medicamento alfa-bloqueador (doxazosina 4 mg/dia) há 03 anos. Após sondagem vesical de demora com saída de 800 ml, foi submetido à ultrassonografia que evidenciou hidronefrose bilateral moderada e próstata de 130g e exames laboratoriais com creatinina sérica de 3,2 mg/dl. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A insuficiência renal é provavelmente pré-renal.
- (B) Há indicação relativa de cirurgia pela presença de próstata maior que 100g.
- (C) A fluxometria livre permite diferenciar obstrução de hipocontratibilidade vesical.
- (D) A ressecção endoscópica da próstata é o padrão-ouro nesse caso e deve ser realizada após liberação pelo cardiologista.
- (E) A hematúria “ex vácuo” pode ocorrer nesse caso.

QUESTÃO 38

Vítima de colisão auto vs. anteparo, de 19 anos, deu entrada na unidade de emergência com quadro de uretrorragia. Na avaliação inicial: A: vias aéreas pervias; B: murmúrio presente e simétrico bilateralmente; C: PA 90x60 mmHg, FC 120 bpm; D: Glasgow 15; E: presença de hematoma em região de bolsa testicular, aumento de volume de região de quadril e coxa à direita, com aparente fratura de sínfise púbica. Sobre a conduta nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O toque retal com presença de próstata em posição mais cranial corrobora o diagnóstico de trauma uretral.
- (B) A sondagem vesical deve ser realizada de imediato pela equipe de enfermagem, pois o controle de diurese é fator importante.
- (C) O quadro de taquicardia e hipotensão deve-se provavelmente ao sangramento da via urinária.
- (D) Deve-se providenciar, com urgência, acesso venoso profundo, via jugular ou subclávia, para otimizar a reposição volêmica.
- (E) O diagnóstico mais provável é de trauma de uretra bulbar associado à fratura pélvica.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 21 anos, procurou ajuda médica por estar apresentando ejaculação precoce. Iniciou sua vida sexual aos 18 anos e, desde então, tem sofrido por ejacular muito rapidamente, muitas vezes antes mesmo da penetração. Agora que está casado há seis meses, teme perder a esposa

devido a sua condição. De acordo com a evidência científica atual, assinale a classe de medicamentos da qual mais se beneficiaria o paciente citado.

- (A) Antidepressivos tricíclicos.
- (B) Estabilizadores do humor (lítio).
- (C) Inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS).
- (D) Ansiolíticos da classe benzodiazepínicos.
- (E) Ansiolíticos da classe ciclopirononas.

QUESTÃO 40

Paciente de 43 anos, diabético, hipertenso e cardiopata, em uso de insulino terapia, nitratos e beta-bloqueador, tem apresentado dificuldade para iniciar e manter a ereção há alguns meses. A respeito do tratamento da disfunção erétil, assinale a alternativa correta.

- (A) A 5-fosfodiesterase é a enzima que degrada o AMP-cíclico no corpo cavernoso.
- (B) Os inibidores da 5-fosfodiesterase podem ser utilizados com cautela nesse caso, se utilizados os fármacos com menor tempo de meia-vida.
- (C) Os agentes injetáveis intracavernosos estão contraindicados nos pacientes diabéticos, pelo risco de infecção.
- (D) A classe de anti-hipertensivos dos beta-bloqueadores não interfere no quadro de impotência.
- (E) A disfunção erétil pode preceder um evento coronariano, devendo ser encarada como um alerta ao cardiologista.

QUESTÃO 41

No exame de rotina, um paciente de 66 anos apresentou dosagem PSA total de 9 ng/ml, com relação L/T: 11%. Ao toque retal, foi identificado nódulo em lobo prostático esquerdo. Foi então submetido à biópsia, sendo constatado adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4). O paciente não apresenta comorbidades e sentia-se bem, assintomático. Referente ao caso apresentado, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Não há necessidade de exame adicional para estadiamento, pois o PSA é menor que 10.
- II. A cirurgia está contraindicada, pois em pacientes com Gleason 8 frequentemente há doença extraprostática.

III. O estadiamento clínico desse paciente é T1c, sendo este o mais frequentemente encontrado no diagnóstico nos dias atuais.

- (A) I, II e III estão corretas.
- (B) I, II e III estão incorretas.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) Apenas I e III estão corretas.
- (E) Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 42

Em exame de rotina solicitado pela sua ginecologista, uma paciente de 55 anos surpreendeu-se com o achado de um cisto renal. Na ultrassonografia, detectou-se, em terço médio de rim direito, imagem hipocogênica de cerca de 2,5 cm com presença de septos no seu interior. A respeito do achado ultrassonográfico, assinale a alternativa correta.

- (A) O ultrassonografista deveria ter acrescentado no laudo a classificação de Bosniak, pois esta orienta o urologista no manejo dos cistos renais.
- (B) A tomografia ou ressonância é desnecessária nesse caso, devendo ser reservada para os casos de cistos maiores que 3 cm.
- (C) Os cistos renais Bosniak IV possuem indicação cirúrgica, pois são malignos em 95-100% dos casos.
- (D) Nos cistos Bosniak IV, a cirurgia está indicada, sendo a marsupialização via laparoscópica o tratamento de escolha.
- (E) Os cistos renais só devem ser operados em caso de serem sintomáticos, independente de tamanho ou características radiológicas.

QUESTÃO 43

Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Na suspeita clínica de uretrite, o tratamento deve ser iniciado após resultado de cultura, pois o tratamento é diferente no caso de uretrite gonocócica ou não-gonocócica.
- II. Na sífilis terciária, o VDRL geralmente é normal.
- III. A pesquisa de outras DST é obrigatória diante do diagnóstico de uma infecção adquirida via contato sexual.
- IV. No cancro misto ou de Rollet, os agentes infecciosos envolvidos são *Treponema pallidum* e *Haemophilus ducreyi*.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 44

Paciente de 18 anos notou aumento de volume em hemibolsa testicular esquerda de início recente. Nega dor associada ou febre. Sem alterações inflamatórias. Ao exame, presença de lesão endurecida em topografia de testículo esquerdo de cerca de 5 cm. Foram solicitados marcadores tumorais para tumor testicular e ultrassonografia. Sobre o quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos seminomas testiculares, o marcador alfa-fetoproteína (AFP) está geralmente elevado.
- (B) A elevação da desidrogenase láctica (LDH) geralmente está relacionada ao volume tumoral.
- (C) A FDG-PET (tomografia com emissão de pósitron) está indicada no estadiamento inicial.
- (D) A orquiectomia radical esquerda via escrotal está indicada, devendo ser realizada em caráter de urgência pelo risco de crescimento tumoral acelerado.
- (E) No caso de acometimento unilateral, não há risco futuro quanto a comprometimento da fertilidade, sendo o congelamento de sêmen pré-operatório desnecessário nesse caso.

QUESTÃO 45

Na angiotomografia pré-transplante para possível doador renal intervivos, foi constatado duplicidade de artérias renais à direita e artéria única à esquerda. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O doador deve ser descartado, pois a duplicidade inviabiliza a doação.
- (B) Deve ser retirado para doação, preferencialmente, o rim direito, pois o melhor rim sempre deve ficar com o doador.
- (C) Deve ser retirado para doação, preferencialmente, o rim direito, pois a veia renal direita é a mais longa.
- (D) Deve ser retirado para doação, preferencialmente, o rim esquerdo, pois a veia renal esquerda é a mais longa.
- (E) Deve ser retirado para doação, preferencialmente, o rim esquerdo, pois a veia renal esquerda é mais curta.

QUESTÃO 46

A presença de sangue na urina é um sinal bastante comum na prática clínica do urologista, devendo ser investigada com cautela pela possibilidade de estar associada a doenças graves. Sobre as hematórias, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Nefrite lúpica e glomerulonefrites são exemplos de hemátúria de origem glomerular.
- II. A presença de cilindros hemáticos, proteinúria e hemácias dismórficas são achados típicos de hemátúria de origem glomerular.
- III. Na faixa etária pediátrica, a hemátúria macroscópica é mais comum que a microscópica.
- IV. A história de tabagismo e a idade são fatores irrelevantes no caso de hemátúria microscópica.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) Apenas II e III.

QUESTÃO 47

O estudo urodinâmico tem como finalidade detectar as alterações funcionais relacionadas aos sintomas do trato urinário inferior. A respeito desse estudo, assinale a alternativa correta.

- (A) Antibioticoprofilaxia para endocardite infecciosa não está indicada em valvulopatias, pois trata-se de procedimento pouco invasivo.
- (B) A pressão de perda sob esforço (PPE) registra a menor pressão vesical ou abdominal capaz de promover perda urinária na ausência de contração detrusora.
- (C) A presença de contrações involuntárias do detrusor na fase de cistometria sugere o diagnóstico de cistite intersticial.
- (D) De acordo com o nomograma de Abrams e Griffiths, uma pressão detrusora no fluxo máximo menor que 40 cm H₂O indica obstrução.
- (E) A velocidade de infusão não tem influência nos achados urodinâmicos, sendo de escolha do urologista que realiza o estudo.

QUESTÃO 48

Paciente de 17 anos, sexo masculino, procura o pronto-atendimento com queixa de ereção peniana dolorosa há 5 horas. Refere já ter apresentado episódios prévios, com duração inferior a 3 horas. Acerca da condição clínica do paciente apresentado, assinale a alternativa que reúne o diagnóstico, provável causa e a conduta inicial.

- (A) Priapismo de alto fluxo /anemia perniciosa/ observação para resolução espontânea.
- (B) Priapismo de alto fluxo/anemia falciforme/ aspiração do corpo cavernoso.
- (C) Priapismo de baixo fluxo/anemia perniciosa/ shunt cirúrgico distal (el-Ghorab).
- (D) Priapismo de baixo fluxo/anemia falciforme/shunt cirúrgico proximal (Quackels).
- (E) Priapismo de baixo fluxo/anemia falciforme/ aspiração do corpo cavernoso.

QUESTÃO 49

Em ultrassom gestacional morfológico, no segundo trimestre, foi confirmado sexo fetal masculino com presença de ureterohidronefrose fetal bilateral e oligodrâmnio. A respeito do quadro, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A principal suspeita diagnóstica deve ser válvula de uretra posterior, sendo o tipo mais comum o tipo 3 da classificação de Young.

II. Insuficiência renal do recém-nascido e fácies de Potter podem ser encontradas ao nascimento.

III. O neonatologista deve estar preparado para a presença de insuficiência respiratória do recém-nascido e hipoplasia pulmonar secundária.

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas I.

QUESTÃO 50

Diversos exames de imagem estão disponíveis para a avaliação do sistema genito-urinário. Sobre as diferentes modalidades radiológicas utilizadas na urologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O ultrassom é a modalidade de escolha para o diagnóstico de urolitíase em crianças.
- (B) O ultrassom apresenta alta acurácia no diagnóstico de angiomiolipoma renal, pois identifica a presença de tecido gorduroso.
- (C) O risco de fibrose sistêmica nefrogênica associado ao uso do contraste é uma complicação temida da tomografia computadorizada nos pacientes nefropatas graves.
- (D) A sensibilidade da ultrassonografia para urolitíase é maior que 90%, sendo o exame inicial de eleição.
- (E) A cintilografia renal estática (DMSA) permite a diferenciação de hidronefrose obstrutiva e não obstrutiva (com uso de diurético).