



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEONATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A ventilação não invasiva gera benefícios fisiológicos importantes para o pulmão do recém-nascido pré-termo. Em relação a essa modalidade ventilatória, é correto afirmar que

- (A) apesar de benéfica não estimula o crescimento do pulmão prematuro.
- (B) suas principais indicações são na síndrome do desconforto respiratório do RN, na apneia da prematuridade e na extubação traqueal.
- (C) seu uso, em relação à ventilação invasiva, não reduz a incidência de displasia broncopulmonar.
- (D) causa mais barotraumas que a ventilação invasiva, sendo essa uma desvantagem dessa modalidade.
- (E) não consegue prevenir o colapso dos alvéolos e das vias respiratórias quando instituída precocemente, nos casos de síndrome de desconforto respiratório.

QUESTÃO 27

Em relação aos cuidados com recém-nascido sadio, é correto afirmar que

- (A) deve-se solicitar grupo sanguíneo e teste de Coombs direto em todo recém-nascido cuja mãe seja Rh negativa.
- (B) a triagem metabólica neonatal (teste do pezinho) deve ser coletada nas primeiras 24 horas de vida.

- (C) só é administrada a vitamina K nos recém-nascidos pequenos para idade gestacional (PIG).
- (D) triagem de glicemia é realizada rotineiramente para todos recém-nascidos.
- (E) todo recém-nascido deve ter alimentação com horários rigorosos, devendo ser colocado ao seio materno a cada 3 horas.

QUESTÃO 28

RN de 27 semanas de idade gestacional, nascido de parto cesariana por doença hipertensiva gestacional, com bolsa íntegra. Nasceu bem, com peso de 1000g e APGAR 8/9, porém evoluiu com desconforto respiratório em sala de parto, sendo encaminhado para unidade de terapia intensiva para cuidados. Em relação ao caso, é correto afirmar que

- (A) não há indicação de ventilação não invasiva devido ao fato de ser RN prematuro, sendo seu uso indicado apenas em RN com idade gestacional maior de 34 semanas.
- (B) esse RN tem indicação de antibioticoterapia por ser prematuro e risco de sepse precoce.
- (C) quando for introduzida a dieta enteral esta deve ser iniciada com volume de 30 ml/kg/dia.
- (D) não está indicada nutrição enteral nos primeiros 3 dias de vida devido à prematuridade e ao risco de infecção intestinal.
- (E) é recomendada a prescrição de nutrição parenteral para esse paciente, com base em seu baixo peso.

QUESTÃO 29

RN a termo, nascido de parto normal, sem intercorrências. Foi observado, após 24 horas de vida, icterícia em zona 3 de krammer. A tipagem sanguínea da mãe é O positivo e do RN é B positivo. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Na investigação diagnóstica, é necessária a solicitação da dosagem de reticulócitos e hematócrito.
- (B) Caso for solicitada a dosagem de reticulócitos e esta estiver diminuída, sugere-se a presença de incompatibilidade Rh.
- (C) Se o Coombs direto solicitado vier negativo, exclui a possibilidade de incompatibilidade ABO.
- (D) É importante a solicitação da dosagem da bilirrubina total e suas frações e, estando aumentada às custas da fração direta, pode estar indicado o tratamento com fototerapia.
- (E) Não deve se tratar de hiperbilirrubinemia não fisiológica, já que nesse caso não há incompatibilidade Rh e ABO.

QUESTÃO 30

Considere um RN com idade gestacional de 29 semanas com peso estimado de 1120g, que nascerá nas próximas horas. Por se tratar de RNPT, pode ser que, durante seu internamento em unidade de terapia intensiva, ele venha a necessitar de transfusões sanguíneas. Em relação ao uso de hemoderivados, assinale a alternativa correta.

- (A) Para diminuir o risco de necessidade de transfusão de hemácias nesse RN, deve-se, ainda na sala de parto, solicitar o clampamento rápido do cordão umbilical, em menos de meio minuto do nascimento.
- (B) Durante o internamento, para diminuir as necessidades de transfusão de hemácias, deve-se tentar diminuir o número de coletas de exames, usar frascos pediátricos para coleta de exames e realizar correta hemostasia após punções arteriais ou venosas.
- (C) Se for necessária a transfusão de hemácias, deve-se solicitar que estejam preservadas por menos de 14 dias para diminuir o risco de enterocolite.
- (D) Na necessidade de transfusão de hemácias, não há necessidade de aquecimento, devendo ser o produto transfundido gelado para evitar contaminação.
- (E) Não há problema em infundir outro líquido na mesma via de acesso venoso junto da infusão de hemocomponentes.

QUESTÃO 31

A transfusão de hemocomponentes em RNPT deve ser criteriosa, pois seu uso pode causar efeitos adversos. Uma dessas reações transfusionais é a reação hemolítica. Sobre sua causa, é correto afirmar que

- (A) ocorre devido à destruição de leucócitos do doador por anticorpos do receptor que foi previamente sensibilizado.
- (B) ocorre devido à presença de citocinas pró-inflamatórias liberadas pelos leucócitos do doador durante período de armazenamento.
- (C) ocorre por interação de um anticorpo presente no receptor contra os antígenos eritrocitários do doador.
- (D) ocorre devido à presença de anticorpos contra o sistema HLA do receptor.
- (E) ocorre pela reação de anticorpos do receptor contra antígenos solúveis no plasma do doador.

QUESTÃO 32

RN de 37 semanas de idade gestacional, sexo feminino, após cerca de 2 horas de vida, evolui com cianose e taquidispneia. Nascido de cesárea por bolsa rota, cerca de 16 horas antes do parto, com APGAR 8/10. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) É possível descartar a hipótese de taquipneia transitória do RN, devido à idade gestacional ser superior a 35 semanas.
- (B) Os sinais de insuficiência respiratória podem ser devido ao quadro de infecção, pois não há referência à pesquisa de *Streptococcus agalactiae* e o tempo de bolsa rota é próximo a 18 horas.
- (C) Caso, na evolução do quadro, se feche o diagnóstico de hipertensão pulmonar persistente, o tratamento de escolha é o uso de prostaglandina.
- (D) Para investigação do quadro, é necessário apenas exame de imagem (radiografia de tórax) sendo dispensáveis exames laboratoriais.
- (E) Na suspeita de hipertensão pulmonar persistente, o exame de escolha para o diagnóstico é gasometria arterial e radiografia de tórax.

QUESTÃO 33

No RN a termo, o fechamento funcional do canal arterial ocorre geralmente em até 72 horas de vida. A patência do canal após esse período é chamada de persistência do canal arterial. O fechamento desse canal, após o nascimento, ocorre devido

- (A) ao aumento dos níveis de prostaglandinas na circulação do RN.
- (B) à expansibilidade pulmonar e ao aumento da tensão de oxigênio.
- (C) ao aumento da sensibilidade à ação das prostaglandinas e ao aumento da tensão de oxigênio.
- (D) ao clampamento do cordão umbilical e à diminuição da tensão de oxigênio.
- (E) ao aumento da tensão de oxigênio e à diminuição dos níveis de prostaglandinas.

QUESTÃO 34

RNPT de 34 semanas, nascido de parto cesariana sem intercorrências, apresenta durante rotina de aferição de glicemia um valor de 21mg/dl e se encontra, no momento, assintomático. A conduta, nesse caso, é

- (A) ofertar glicose, na forma de soro glicosado a 10%, por via oral.
- (B) ofertar fórmula para prematuro em mamadeira.
- (C) infundir glicose por via venosa, utilizando soro glicosado 10%.
- (D) solicitar glicemia sérica e aguardar resultado para conduta.
- (E) não fazer nada, já que o RN está assintomático.

QUESTÃO 35

RNPT de 28 semanas de idade gestacional nasceu com peso de 1050g, de parto cesárea, por trabalho de parto prematuro sem causa, e sem intercorrências. Foi admitido em UTI, deixado em jejum com soro de manutenção com oferta adequada para o peso. No momento, segue estável, sem alterações ao exame físico. Está atualmente com 7 horas de vida e ainda não apresentou diurese. Diante desse caso, qual é a melhora conduta?

- (A) Solicitar sondagem vesical e prescrever diurético.
- (B) Infundir volume, de 10 a 20ml/kg em 1 hora.
- (C) Aumentar a oferta hídrica diária.
- (D) Manter e avaliar os controles de diurese, pressão arterial, peso e aguardar mais algumas horas.
- (E) Colher exames laboratoriais com dosagem da ureia e creatinina.

QUESTÃO 36

Em relação à asfixia perinatal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O cérebro é o único órgão afetado por isquemia, os demais se utilizam da respiração anaeróbica para manter o funcionamento.
- (B) Pode ocorrer devido ao comprometimento da troca gasosa da placenta, causando redução da oferta de oxigênio e da remoção de dióxido de carbono.
- (C) Se o escore de APGAR for maior que 6 aos 5 minutos, a asfixia perinatal é improvável.
- (D) Pode ocasionar encefalopatia hipóxico-isquêmica na ocorrência de redução do fluxo sanguíneo cerebral.
- (E) Os critérios dos gases sanguíneos que definem a asfixia capaz de causar lesão cerebral são incertos.

QUESTÃO 37

Considerando um RN a termo, nascido de parto normal sem intercorrências, com choro vigoroso ao nascer, sendo recepcionado e colocado em campos aquecidos, em relação à aspiração de boca e narinas, é correto afirmar que

- (A) está indicada a aspiração por se tratar de parto vaginal.
- (B) só estaria indicada a aspiração se houvesse depressão respiratória, com líquido amniótico claro.
- (C) só haveria indicação de aspiração se houvesse líquido meconial.
- (D) só está indicada a aspiração se existir excesso de secreções nas vias aéreas.
- (E) a aspiração está indicada em todos os casos, para retirar secreções e avaliar perviedade de coanas.

QUESTÃO 38

Um RNPT, que nasceu de 29 semanas de idade gestacional, recebe alta em uso de aleitamento materno. Durante o acompanhamento ambulatorial desse paciente, quando estaria indicada a suplementação de cálcio e fósforo?

- (A) Nesse caso, já está indicada a suplementação, já que o paciente se encontra em aleitamento materno.
- (B) Caso estivesse em uso apenas de fórmula para prematuro.
- (C) Caso no acompanhamento estiver com dosagem de fósforo diminuída e fosfatase alcalina aumentada.
- (D) Se, após 3 meses de aleitamento materno, as dosagens de fósforo e fosfatase alcalina estiverem diminuídas e de cálcio aumentada.
- (E) Se no acompanhamento a dosagem de cálcio estiver diminuída e a de fósforo e fosfatase alcalina aumentadas.

QUESTÃO 39

Com relação à transmissão vertical do HIV, é correto afirmar que

- (A) a transmissão do HIV da mãe para o filho ocorre principalmente intraútero, no terceiro trimestre da gestação.
- (B) a transmissão do HIV pelo aleitamento materno ocorre apenas nas primeiras semanas do aleitamento.
- (C) a primeira dose do AZT oral para o RN deve ser oferecida preferencialmente nas primeiras 2 horas de vida.
- (D) o exame de carga viral em filho de mãe infectada

deve ser feito ao nascimento e aos 4 meses de vida.

- (E) a anemia é o único efeito conhecido durante o uso de antirretrovirais.

QUESTÃO 40

As principais causas de mortalidade neonatal são:

- (A) insuficiência respiratória, hemorragias e infecções graves.
(B) parto prematuro, doenças metabólicas e asfixia.
(C) insuficiência respiratória, asfixia e extremo baixo peso.
(D) parto prematuro, infecções graves e asfixia.
(E) síndromes genéticas, infecções graves e parto prematuro.

QUESTÃO 41

RN prematuro de 24 semanas, nascido com peso de 500 g, foi internado em UTI, já que os pais solicitaram que fossem tomadas todas as medidas para a sobrevivência dele. Foi entubado, surfactado e prescrita nutrição parenteral. Com 48 horas de vida, evoluiu com hemorragia pulmonar, necessitou de aumento de parâmetros ventilatórios e introdução de drogas vasoativas. Evoluiu com anúria e acidose, mantendo saturação de oxigênio entre 30 e 50%, sem resposta às medidas prescritas. Frente a esse caso, que medidas devem ser adotadas?

- (A) Manter cuidados intensivos, solicitar diálise peritonial e tentar melhorar a saturação realizando nova dose de surfactante.
(B) Não avisar os pais da situação e deixar que eles percebam a evolução para o óbito.
(C) Conversar com os pais sobre a gravidade do caso, mas deixar claro que há esperanças de melhora e reversão do quadro.
(D) Manter todo o tratamento prescrito, deixar que ocorra a evolução para óbito e só então conversar com os pais.
(E) Comunicar os pais e explicar a situação em que se encontra o RN e que os esforços curativos não são mais eficazes, sendo indicados apenas para conforto e alívio dos sintomas.

QUESTÃO 42

RN pré-termo com peso de nascimento de 1200g, se encontra atualmente com 20 dias de vida, em ar ambiente, recebendo leite materno intercalado com fórmula para prematuro. Em relação à dieta recebida e ao risco de

ocorrência de Enterocolite Necrosante (ECN), assinale a alternativa correta.

- (A) Se o RN receber dieta suplementada com aminoácidos, há diminuição do risco de ECN.
(B) Seria melhor o RN receber apenas leite humano, o que reduziria o risco de ECN.
(C) A melhor medida para reduzir o risco de ECN é uma progressão rápida da dieta.
(D) Um RN em uso de fórmula para prematuro apresenta o mesmo risco de ECN que se estiver usando leite materno.
(E) O uso de fórmula para prematuro reduz o risco de ECN, o que não acontece com fórmula para RN a termo.

QUESTÃO 43

A sepse neonatal é uma importante causa de morbidade e mortalidade no período neonatal. Em relação às definições da sepse, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O choque séptico é considerado resistente a catecolaminas se persistir após iniciadas drogas vasoativas, como adrenalina ou noradrenalina.
(B) Se as extremidades estiverem frias, com perfusão, pulsos e débito urinário reduzidos, o choque é chamado de frio.
(C) Choque séptico refratário é aquele que não responde a catecolaminas, mas apresenta adequada resposta com início de hidrocortisona.
(D) No choque quente, há perfusão e débito urinário reduzidos, com pulsos periféricos amplos.
(E) São consideradas choque séptico a ocorrência de sepse e a necessidade de catecolaminas para a ressuscitação cardiovascular.

QUESTÃO 44

Gestante, que deu entrada em pronto-socorro em franco trabalho de parto, informou que não realizou pré-natal e não sabe a idade gestacional em que se encontra. RN nasceu de parto normal, com peso de 2900g, com Capurro de 38 semanas. Ao nascimento, foi observado abdome escavado, dificuldade respiratória com murmúrio vesicular assimétrico e ruídos hidroaéreos audíveis em tórax. Em relação ao provável diagnóstico do caso, é correto afirmar que

- (A) o local mais comum da ocorrência dessa patologia é no hemitórax direito, e o defeito diafragmático posterior.
- (B) pode ser um sinal de mal prognóstico a presença do lobo esquerdo do fígado no tórax.
- (C) a gravidade da insuficiência respiratória dependerá do grau de hipoplasia e hipertensão pulmonar associadas.
- (D) está contraindicada a ventilação sob pressão positiva com máscara de oxigênio.
- (E) o reparo cirúrgico se dá através do abdome ou tórax, com redução do conteúdo para a cavidade abdominal.

QUESTÃO 45

Considere um RN que evoluiu com sepse e o líquido não pode ser coletado devido à plaquetopenia. Qual antibiótico deveria ser evitado na prescrição?

- (A) Ampicilina.
- (B) Piperacilina + tazobactan.
- (C) Vancomicina.
- (D) Meropenem.
- (E) Penicilina G.

QUESTÃO 46

Por ser uma infecção grave no período neonatal, muitos esforços têm sido feitos para tentar evitar as infecções fúngicas nos RNPT. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) São fatores de risco para candidemia neonatal: peso de nascimento menor 2000g e uso de antibióticos de amplo espectro.
- (B) Uma medida de prevenção seria o uso de nistatina via oral para os RN de risco.
- (C) É rara a ocorrência de plaquetopenia em infecções fúngicas.
- (D) Impregnar o cateter venoso central com antibióticos previne infecção fúngica invasiva.
- (E) Uma medida preventiva é a higiene das mãos com água e sabão ou solução alcoólica antes e após manuseio do RN.

QUESTÃO 47

RN nascido de parto cesáreo, com idade gestacional de 31 semanas e peso de 1200g, desenvolveu dificuldade respiratória com taquipneia, retração esternal e gemido. Foi encaminhado para UTI e colocado em Ventilação Não Invasiva (VNI). Ocorreu insucesso terapêutico no procedimento de VNI. É uma causa de insucesso dessa modalidade:

- (A) gasometria de controle com $\text{pH} < 7,25$, $\text{FiO}_2 > 0,6$ para $\text{PaO}_2 > 50$, $\text{PaCO}_2 > 60$.
- (B) dois episódios de apneia em um intervalo de 6 horas, revertendo com estímulo tátil.
- (C) dois episódios de apneia, com melhora espontânea em um intervalo de 8 horas, mesmo em uso de xantinas.
- (D) gasometria de controle com $\text{PaO}_2 < 80$ em qualquer valor de FiO_2 .
- (E) distensão abdominal e inflamação da mucosa nasal.

QUESTÃO 48

O objetivo inicial da nutrição parenteral é fornecer calorias e aminoácidos para evitar balanços energético e nitrogenado negativos, além de promover ganho ponderal e crescimento adequados. Com relação à prescrição da nutrição parenteral, é correto afirmar que

- (A) está indicada em neonatos com peso de nascimento inferior ou igual a 1500 g.
- (B) é indicada sua prescrição se o neonato apresentar peso maior que 1200g e há impossibilidade de iniciar a nutrição enteral por um período maior que 3 dias.
- (C) a solução poderá ser infundida tanto em veia periférica quanto central, não importando a osmolaridade da mesma.
- (D) a lactose é a fonte de carboidrato das soluções de nutrição parenteral.
- (E) não é recomendado que vitaminas e minerais sejam fornecidos nas soluções, pois alteram sua estabilidade.

QUESTÃO 49

A apneia é definida como a suspensão do fluxo de ar e é frequente em neonatos prematuros. Com relação à apneia, é correto afirmar que

- (A) os episódios de apneia geralmente se iniciam no primeiro dia de vida e, se não ocorrerem em até 3 dias, é improvável que ocorram.
- (B) a maioria dos episódios de apneia é do tipo central ou mista.
- (C) os episódios de apneia em RN a termo, geralmente, são fisiológicos ou associados a refluxos gastroesofágicos.
- (D) o uso de ventilação não invasiva é incapaz de reduzir os episódios de apneia.
- (E) o uso de doxapram (estimulante respiratório) é indicado quando há falha do tratamento com o uso das xantinas.

QUESTÃO 50

RN a termo, com peso adequado para idade gestacional, evoluiu durante o segundo dia de vida, com icterícia. Após dosagem da bilirrubina, foi iniciada fototerapia com proteção ocular. Porém, durante o seguimento dos níveis de bilirrubina, foi detectada a elevação para níveis tóxicos. Nesse caso, indica-se

- (A) manter fototerapia contínua e colher novos exames em 12 horas.
- (B) continuar a fototerapia e colher novos controles em 8 horas.
- (C) iniciar fototerapia dupla e colher novos exames em 24 horas.
- (D) trocar o aparelho de fototerapia por não estar conseguindo diminuir de forma desejável os níveis de bilirrubina.
- (E) exsanguineotransfusão para diminuição da bilirrubina.