



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA -
HEMODINÂMICA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

É correto afirmar que, em uma parada cardiorrespiratória (PCR), habitualmente, ocorre:

- (A) parada súbita dos batimentos do coração, cessação da circulação sanguínea efetiva, ausência de pulso, perda da consciência e dilatação das pupilas.
- (B) parada súbita dos batimentos do coração, cessação da circulação sanguínea efetiva, ausência de pulso, perda da consciência e contração das pupilas.
- (C) parada súbita dos batimentos do coração, redução da circulação sanguínea efetiva, com manutenção de pulso filiforme, perda da consciência e dilatação das pupilas.
- (D) redução súbita dos batimentos do coração, redução da circulação sanguínea efetiva, pulso filiforme, perda da consciência e dilatação das pupilas.
- (E) parada súbita dos batimentos do coração, cessação da respiração espontânea, ausência de pulso periférico, perda da consciência e contração das pupilas.

QUESTÃO 27

Em uma PCR, são procedimentos que rotineiramente cabem à enfermagem:

- (A) puncionar veias calibrosas (obter acesso venoso central), instalar oxigênio para correção de hipóxia, preparar e disponibilizar medicamentos e equipamentos para os profissionais que estiverem atendendo diretamente o paciente.
- (B) puncionar veias calibrosas, obter via aérea definitiva (intubação traqueal), instalar oxigênio para correção de hipóxia, preparar e disponibilizar medicamentos e equipamentos para os profissionais que estiverem atendendo direta ou indiretamente o paciente.
- (C) puncionar veias calibrosas, instalar oxigênio para correção de hipóxia, preparar e disponibilizar medicamentos e equipamentos para os profissionais que estiverem atendendo direta ou indiretamente o paciente.
- (D) puncionar artérias calibrosas, instalar oxigênio para correção de hipóxia, preparar e disponibilizar medicamentos e equipamentos para os profissionais que estiverem atendendo direta ou indiretamente o paciente.
- (E) puncionar veias calibrosas e obter acesso intraósseo, instalar oxigênio para correção de hipóxia, disponibilizar medicamentos e equipamentos para os profissionais que estiverem atendendo direta ou indiretamente o paciente.

QUESTÃO 28

Acerca da epidemiologia da PCR no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil, ocorrem cerca de 2.000.000 PCR por ano.
- (B) Aproximadamente 85% dos casos de PCR ocorrem dentro dos hospitais.
- (C) Atividade elétrica sem pulso é o principal tipo de PCR extra-hospitalar.
- (D) Em casas, shoppings, aeroportos, estádios etc., a PCR geralmente decorre de arritmias associadas a quadros isquêmicos agudos ou a problemas elétricos primários.
- (E) Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso representam a maioria das PCR intra-hospitalares.

QUESTÃO 29

Em relação às recentes mudanças no protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), assinale a alternativa correta.

- (A) Houve um aumento na complexidade dos procedimentos da RCP.

- (B) No suporte básico, o foco principal atual são as compressões torácicas de qualidade.
- (C) Mais interrupções das compressões torácicas são permitidas.
- (D) As ventilações tornaram-se totalmente desnecessárias ao profissional de saúde treinado.
- (E) A desfibrilação (360 Joules) deve ser sempre a primeira medida, independente do tipo de PCR.

QUESTÃO 30

Acerca do suporte básico de vida (SBV) em uma PCR, é correto afirmar que

- (A) no âmbito pré-hospitalar 56-74% das PCR ocorrem em assistolia.
- (B) o sucesso da RCP não está relacionado à desfibrilação precoce.
- (C) a cada minuto transcorrido do início de uma fibrilação ventricular, sem desfibrilação, as chances de sobrevivência diminuem em 70% a 100%.
- (D) com a RCP a redução da chance de sobrevivência é mais gradual, entre 30% a 40% por minuto de PCR.
- (E) a realização imediata de RCP em uma vítima de PCR, ainda que apenas compressões torácicas no pré-hospitalar, aumenta as taxas de sobrevivência.

QUESTÃO 31

Sobre o SBV em uma PCR, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os minutos iniciais de atendimento a uma PCR são críticos em relação à sobrevivência da vítima.
- (B) O suporte básico de vida (SBV) define a sequência primária de ações para salvar vidas.
- (C) Por mais adequado e eficiente que seja um suporte avançado, se o SBV não for adequado, será muito baixa a chance de sobrevivência da vítima de PCR.
- (D) O sucesso da RCP está relacionado à desfibrilação precoce, idealmente dentro dos primeiros 13 a 15 minutos após o colapso.
- (E) Programas internacionais de RCP e desfibrilação externa automática precoce, realizadas por leigos, com taxas de sobrevivência de até 85%, podem servir de modelo para melhorar o manejo da PCR.

QUESTÃO 32

Em uma PCR, um mnemônico pode ser usado para lembrar os passos do SBV - “CABD primário”. Assinale a alternativa que NÃO está inclusa no “C” desse mnemônico.

- (A) Checar responsividade e respiração da vítima.
- (B) Chamar por ajuda.
- (C) Checar o pulso da vítima.
- (D) Compressões (30 compressões).
- (E) Chocar (Desfibrilação precoce).

QUESTÃO 33

Acerca de uma PCR, sobre o SBV, é correto afirmar que

- (A) nos casos de PCR por hipóxia (afogamento, trauma, overdose de drogas e para todas as crianças) deve-se realizar cinco ciclos de RCP e depois chamar ajuda, se o socorrista estiver sozinho.
- (B) para iniciar uma RCP é obrigatória a checagem de pulso, mesmo para socorristas leigos.
- (C) a checagem de pulso pode demorar no máximo 30 segundos.
- (D) a checagem de pulso deve ser realizada em grandes artérias periféricas, como a artéria cubital.
- (E) se houver dúvida acerca da presença ou não de pulso deve-se fazer 1 ventilação a cada 6 segundos e checar o pulso a cada 2 minutos.

QUESTÃO 34

Em relação às compressões torácicas em uma RCP (SBV), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Compressões torácicas efetivas são essenciais para promover o fluxo de sangue, devendo ser realizadas em todos pacientes em parada cardíaca.
- (B) Devem ser feitas, no máximo, 100 compressões/ minuto.
- (C) Cada compressão torácica deve ter uma profundidade mínima de 5 cm.
- (D) O retorno completo do tórax deve ser permitido após cada compressão, sem que o socorrista retire as mãos do tórax do paciente.
- (E) Para evitar fadiga e manter boas compressões torácicas, se for possível, deve haver revezamento de socorristas a cada dois minutos na aplicação das compressões.

QUESTÃO 35

Sobre as ventilações em uma RCP (SBV), assinale a alternativa correta.

- (A) Para não retardar as compressões torácicas, a abertura das vias aéreas deve ser feita somente depois de se aplicar trinta compressões.
- (B) Ventilações devem ser feitas em uma proporção de 30 compressões para uma ventilação.
- (C) Cada ventilação deve durar no mínimo 6 segundos, o suficiente para promover e manter a elevação do tórax.
- (D) Se necessário for, hiperventilação (uma ventilação por segundo) é indicada em todos os casos de PCR/RCP (SBV).
- (E) Quando o socorrista não conseguir realizar a manobra de elevação do ângulo da mandíbula na abertura de via aérea de um paciente com suspeita de trauma cervical e evidência de lesão na cabeça, deve-se utilizar a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo.

QUESTÃO 36

Em relação à fibrilação ventricular (FV), assinale a alternativa correta.

- (A) Desfibrilação precoce é o tratamento de escolha para vítimas em FV de longa duração, como vítimas que apresentaram colapso súbito em ambiente intra-hospitalar.
- (B) Nos primeiros 13 a 15 minutos de uma PCR em FV, a FV é grosseira, estando “propícia” ao choque.
- (C) Após 15 minutos, por depleção do substrato energético miocárdico, a amplitude da FV aumenta.
- (D) O tempo ideal para a aplicação do primeiro choque é nos primeiros 13 a 15 minutos da PCR.
- (E) A desfibrilação, na prática, é o único tratamento para uma PCR em FV/taquicardia ventricular sem pulso.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um ramo da artéria coronária esquerda.

- (A) Descendente anterior (DA).
- (B) Circunflexa (CX).
- (C) Ramo do cone (C).
- (D) Atrioventricular (AV).
- (E) Diagonal (D).

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta um ramo da artéria coronária direita.

- (A) Lateral (L).
- (B) Marginal (M).
- (C) Septal (S).
- (D) Circunflexa (CX).
- (E) Diagonal (D).

QUESTÃO 39

Em relação à anatomia cardíaca e coronariana, assinale a alternativa correta.

- (A) A musculatura dos átrios e dos ventrículos não é separada.
- (B) As valvas atrioventriculares consistem em um anel fibroso que circunscrive o óstio atrioventricular, as cúspides, as cordoalhas tendíneas e os músculos papilares.
- (C) As cordoalhas tendíneas, inseridas nas margens livres das cúspides, promovem a eversão dessas cúspides.
- (D) Os espaços existentes entre as cúspides e as paredes dos vasos são, respectivamente, os seios pulmonar e aórtico.
- (E) O coração é irrigado pelas artérias coronárias direita, mediana e esquerda.

QUESTÃO 40

Em relação à anatomia coronariana, assinale a alternativa correta.

- (A) A artéria coronária direita nasce no seio aórtico esquerdo e se dirige para o ventrículo direito.
- (B) A artéria do nó sinusal é um ramo da artéria coronária esquerda em 90% dos indivíduos normais.
- (C) A artéria que supre o nó atrioventricular habitualmente é um ramo da artéria descendente anterior.
- (D) O ramo circunflexo da artéria coronária esquerda tem dois ramos principais: o atrioventricular e o marginal.
- (E) Há uma nítida linha de demarcação entre as áreas nutridas pelas artérias coronárias, havendo poucas variações anatômicas.

QUESTÃO 41

Paciente feminina de 43 anos, parda, chega ao pronto-socorro com história de dor do tipo “constritiva”, intensa, contínua, em região retroesternal, junto ao rebordo esternal esquerdo, que irradia para o pescoço e para o dorso, e que se agrava com a respiração, com os movimentos do tronco, principalmente na

cama (acordou com a dor), e com a deglutição. Relata que a dor começou há mais de 14 horas e que alivia um pouco quando inclina o tórax para frente ou quando se coloca na posição genupeitoral. Ao exame físico, o médico notou que as bulhas cardíacas estavam abafadas e ouviu uma espécie de “atrito” retroesternal. Com base nessas informações, o diagnóstico mais provável é

- (A) pericardite.
- (B) pneumonia.
- (C) infarto do miocárdio.
- (D) angina pectoris.
- (E) espasmo esofágiano.

QUESTÃO 42

Paciente de 71 anos, masculino, negro, com insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, refere que vem se sentindo bem em repouso, porém, quando faz pequenos esforços, sente dispneia, fadiga, palpitações e, eventualmente, angina de peito. Conforme a classificação dos cardiopatas de acordo com a capacidade funcional (NYHA), o paciente em questão se encontra na classe funcional

- (A) Um (I).
- (B) Dois (II).
- (C) Três (III).
- (D) Quatro (IV).
- (E) Cinco (V).

QUESTÃO 43

Um enfermeiro está com dificuldade para reconhecer as bulhas cardíacas durante o exame físico de seu paciente. Em relação a uma nota prática e verdadeira, que facilita esse reconhecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira bulha não coincide com o pulso carotídeo.
- (B) A primeira bulha é mais aguda e dura menos do que a segunda bulha.
- (C) A segunda bulha é mais grave e vem após a primeira, sem intervalo.
- (D) Todo o precórdio deve ser auscultado e os chamados pontos de ausculta não têm valor prático.
- (E) O reconhecimento das bulhas cardíacas é facilitado se o examinador tiver em mente uma sequência onomatopáica do tipo “TUM-TA, TUM-TA, TUM-TA”.

QUESTÃO 44

Paciente de 37 anos, masculino, apresenta suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM). Após o ECG, é necessária uma monitorização cardíaca contínua. Em relação ao assunto, relacione a anatomia do paciente e a fixação dos eletrodos, para cabos de cinco canais/vias, e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Linha infraclavicular esquerda (próximo ao ombro).
2. Linha infraclavicular direita (próximo ao ombro).
3. Quarto espaço intercostal direito.
4. Linha infradiafragmática esquerda (próximo à crista ilíaca).
5. Linha infradiafragmática direita (próximo à crista ilíaca).

- MSE – LA.
- MSD – RA.
- V – V1.
- MIE – LL.
- MID – REF.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (C) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (E) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.

QUESTÃO 45

Paciente obesa, hipertensa, de 44 anos, chega ao pronto atendimento referindo mal-estar, cefaleia, tontura e náuseas. Diz à enfermeira que mediu a pressão arterial (PA) na farmácia e que estava muito alta (240/140mmHg). Para medir corretamente a PA nesse caso, qual deve ser a largura do manguito do esfigmomanômetro, sabendo que a circunferência do braço da paciente (medida pela enfermagem) é de 34 cm?

- (A) Sete cm.
- (B) Nove cm.
- (C) Onze cm.
- (D) Treze cm.
- (E) A largura do manguito não interfere na aferição da PA.

QUESTÃO 46

Paciente masculino, de 66 anos, apresentando queda da pressão arterial e formação de grande hematoma na região crural direita, após retirada do introdutor arterial usado para procedimento coronário percutâneo. Qual é a conduta mais correta a ser tomada pelo enfermeiro assistente?

- (A) Aguardar a resolução espontânea do sangramento, comum nesses casos.
- (B) Comprimir adequadamente o local do sangramento e avisar de imediato o médico assistente do fato.
- (C) Avisar o médico assistente do fato e esperá-lo chegar para tomar qualquer medida.
- (D) Prescrever algum dispositivo de fechamento do orifício arterial, como “Angio-Seal” (colágeno).
- (E) Proceder a sutura imediata da artéria, antes mesmo da chegada do médico assistente.

QUESTÃO 47

Paciente feminina, 73 anos, muito magra (43kg), refere dor na mão direita após retirada do introdutor arterial (radial) usado para procedimento coronário percutâneo. Ao exame físico: ausência de pulso radial no MSD, com sinais isquêmicos distais evidentes. Nesse caso, a melhor conduta de enfermagem é

- (A) comprimir a artéria radial de imediato.
- (B) repuncionar a artéria radial para recanalizá-la.
- (C) prescrever anticoagulação plena, urgentemente.
- (D) avisar o médico assistente do ocorrido, com urgência.
- (E) proceder trombólise local (intra-arterial) com Alteplase.

QUESTÃO 48

Paciente masculino, 49 anos, retorna ao hospital em “choque hipovolêmico” após alta de uma intervenção coronária percutânea (ICP). NÃO faz parte da assistência inicial e básica da enfermagem no pronto-socorro

- (A) deitar a vítima com as pernas para cima (elevadas aproximadamente 30cm da superfície em que estiver deitada).
- (B) manter as vias aéreas (nariz, boca e garganta) livres e desobstruídas.
- (C) infundir droga vasoativa (Dopamina, Dobutamina ou Noradrenalina).
- (D) manter a vítima aquecida com medidas físicas.
- (E) obter acessos venosos calibrosos, se possível dois antecubitais.

QUESTÃO 49

Deve-se indicar a angiografia coronária de rotina, exceto nos casos de “baixo risco” (Braunwald), para pacientes

- (A) em insuficiência respiratória.
- (B) em insuficiência renal.
- (C) em insuficiência hepática.
- (D) com câncer de prognóstico fechado.
- (E) que têm perspectivas de tratamento por revascularização miocárdica.

QUESTÃO 50

Registra-se, atualmente, contínuo e intenso crescimento numérico das indicações de intervenção coronária percutânea (ICP) no contexto das Síndromes Isquêmicas Miocárdicas Instáveis (SIMIs). Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Muito mais do que para pacientes com SIMIs, é na doença coronária estável que a ICP tem se mostrado mais valiosa, alterando de forma decisiva a história natural dessas condições clínicas e, conseqüentemente, seu prognóstico.
- (B) Os resultados da ICP, a médio e longo prazos, são afetados positivamente pela refratariedade ao tratamento clínico, à inobservância de princípios básicos de prevenção secundária e à não adesão aos medicamentos.
- (C) O potencial de sucesso imediato alcançado pela ICP pode ser razoavelmente predito por escores fundamentalmente angiográficos, como os derivados a partir do estudo “The SYNergy between Percutaneous Coronary Intervention and Cardiac Surgery” (SYNTAX).
- (D) O escore SYNTAX estratifica os pacientes em seis tercils de complexidade, aos quais se conferem prognósticos diferenciados conforme a revascularização seja percutânea ou cirúrgica.
- (E) Os pacientes pertencentes ao sexto tercil, de maior complexidade, devem ser encaminhados para tratamento percutâneo.

