



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Hospitalar de Teresina - FHT / 2015



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA)

DATA: 04/10/2015 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.**OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em hipótese alguma, papéis para rascunhos.**
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O tempo de duração para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de **2h (duas horas)** do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		26	
02		27	
03		28	
04		29	
05		30	
06		31	
07		32	
08		33	
09		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

CONCURSO PÚBLICO - FHT / 2015

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Nº DE INSCRIÇÃO						

(TEXTO 01- Para as questões de 01 a 07).

A Saúde e seus Determinantes Sociais

Paulo Marchiori Buss

Alberto Pellegrini Filho

(...)

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito. É através do conhecimento deste complexo de mediações que se pode entender, por exemplo, por que não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB total ou PIB *per capita* muito superior a outros que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios. O estudo dessa cadeia de mediações permite também identificar onde e como devem ser feitas as intervenções, com o objetivo de reduzir as iniquidades de saúde, ou seja, os pontos mais sensíveis onde tais intervenções podem provocar maior impacto. (...).

(PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007 81 - www.scielo.ler/pdf/physis/v.17, n 01 a 06 - acesso: 12.9.2015)

01. Depreende-se, a partir da leitura integral do texto que

- a) as condições de saúde de um grupo de pessoas vinculam-se a um conjunto de fatores sociais, numa relação essencialmente de causa e consequência.
- b) o PIB, enquanto macroindicador da riqueza de um país, é o parâmetro efetivo de aferição dos indicadores de saúde do seu povo.
- c) desconhece-se, ainda, o grau de determinações entre os fatores sociopolíticos e econômicos e a maneira como esses fatores incidem na saúde de grupos e pessoas.
- d) os estudos que tratam da relação entre determinantes sociais e condições de saúde podem até deixar de considerar o peso do PIB, nessa relação.
- e) quanto mais alto o PIB de um país, mais favoráveis serão seus indicadores de saúde, inevitavelmente.

02. O propósito comunicativo que predomina no texto é

- a) especificar o nível de relação que existe entre os fatores econômicos e as condições de saúde de uma população, numa sociedade.
- b) explicar a relação que se considera existir entre os determinantes de natureza social e a saúde de um povo, numa sociedade.
- c) apresentar um estudo que revela a correlação entre os fatores sociopolíticos e econômicos e a saúde.
- d) argumentar em favor de uma política que, em termos de saúde, privilegie intervenções apenas pontuais, conforme a carência social.
- e) argumentar em favor de um conhecimento mais amplo e mais aprofundado sobre a relação que se pode verificar entre a saúde e seus determinantes sociais.

Trecho para as questões 03 e 04.

Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB total ou PIB per capita muito superior a outros que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios.

03. No trecho: *existem países com um PIB total ou PIB per capita muito superior a outros que, **no entanto**, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios.*, a expressão destacada tem a função de, entre a oração que a segue e a que a antecede

- a) estabelecer comparação entre as informações apresentadas em cada uma delas.
- b) justapor as informações apresentadas em cada uma.
- c) anunciar o acréscimo de novas informações importantes às duas orações.
- d) contrapor informações entre as duas orações.
- e) evidenciar uma relação de causa e consequência entre as orações.

04. Se substituirmos a palavra **Embora** por **Se**, a reescrita do trecho, atendendo os preceitos gramaticais normativos será

- a) **Se** o volume de riqueza gerado por uma sociedade **fosse** um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações **permitiria**...
- b) **Se** o volume de riqueza gerado por uma sociedade **for** um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações **permitiu** ...
- c) **Se** o volume de riqueza gerado por uma sociedade **fosse** um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações **permitirá**...
- d) **Se** o volume de riqueza gerado por uma sociedade **for** um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações **permitiria**...
- e) **Se** o volume de riqueza gerado por uma sociedade **fosse** um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações **permite**...

05. No trecho: "... com o objetivo de reduzir as iniquidades de saúde, **ou seja**, os pontos mais sensíveis onde tais intervenções podem provocar maior impacto", a expressão destacada anuncia uma
- a) retificação em relação à informação anteriormente apresentada.
 - b) explicação relativa à informação anteriormente apresentada, de forma a torná-la mais compreensível e mais clara.
 - c) explicação sobre uma informação que será apresentada pela primeira vez.
 - d) reordenação das informações apresentadas.
 - e) reorganização das ideias anteriormente anunciadas.
06. No trecho: "O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das **quais** esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas (...)" A palavra destacada retoma (ou antecipa) o termo em destaque, em
- a) ... sobre as **relações**...
 - b) ... entre **determinantes sociais** e saúde...
 - c) ... uma hierarquia de **determinações** entre os fatores...
 - d) ... e as **mediações** através...
 - e) ... saúde de **grupos** e **pessoas**,...
07. A ordem dos termos em destaque, considerando-se a sua função gramatical, é a mesma em todas as alternativas, **EXCETO** em
- a) ... sobre as relações entre **determinantes sociais** e saúde ...
 - b) ... por que não há uma **correlação constante** entre os macroindicadores ...
 - c) ... seja um **elemento fundamental** ...
 - d) ... entre os fatores mais gerais de **natureza social**,...
 - e) ... **melhores condições** de vida e de saúde, ...

TEXTO 02 (Para as questões de 08 a 10)

DIETA DA MÃE, VÍCIO DO FILHO

Uma pesquisa divulgada na última semana disparou mais um alerta em relação aos prejuízos causados por uma dieta rica em gordura. Desta vez o dano identificado foi aos filhos de gestantes que adotam este tipo de alimentação ao longo da gravidez. Realizado por cientistas da Rockefeller University, nos Estados Unidos, o estudo, feito em cobaias, revelou que os filhotes de mães alimentadas com excesso de gordura apresentam um risco mais elevado de manifestar dependência e uso abusivo de álcool e de nicotina durante a adolescência. Segundo os autores do trabalho, é a primeira vez que isso fica demonstrado.

A conclusão foi obtida após os pesquisadores analisarem as reações de cobaias geradas por mães alimentadas com uma dieta rica em gordura e por outras, nutridas com uma alimentação normal. Eles constataram que o primeiro grupo tende a encarar o consumo de nicotina como mais compensador, especialmente se combinado à ingestão de álcool. Quando os filhotes foram estimulados a trabalhar mais para conseguir doses elevadas de nicotina e de álcool, aqueles

gerados por mães que comeram muita gordura continuaram se esforçando para obter as próximas doses quando os outros, ao contrário, já haviam desistido. Eles também ingeriram quantidades maiores de álcool e nicotina do que apenas de nicotina, comportamento não identificado entre os gerados por cobaias com dieta normal. (...)

(Revista ISTO É, 2380-15.7.2015- Medicina & Bem-estar. Por Cilene Pereira, p. 63)

08. Depreende-se corretamente dos resultados da experiência científica relatada no texto que
- a) a mãe que optar por uma dieta à base de gordura, na gestação, poderá ter filhos que consumirão substâncias nocivas à própria saúde no futuro.
 - b) a mãe, no período de gestação, precisa ter uma dieta que inclua gordura para assim, evitar a possibilidade de seu filho adquirir algum tipo de vício.
 - c) todos os seres humanos podem ser vulneráveis a vícios desde que no período de gestação a respectiva mãe tenha uma dieta alimentar normal.
 - d) o filho, no período de gestação, só se torna vulnerável à má formação fetal, a doenças e a vícios, se exposto a condições inadequadas de alimentação.
 - e) a adesão de jovens ou de adultos a determinados vícios não está necessariamente vinculada à dieta alimentar de sua mãe no período de gestação.
09. Considerando-se o sentido geral das informações do texto e da expressão destacada em: “**Desta vez o dano identificado foi aos filhos de gestantes que adotam este tipo de alimentação ao longo da gravidez**”, depreende-se que
- a) os resultados das pesquisas científicas não têm sido suficientemente convincentes sobre os efeitos nocivos da ingestão de gorduras em excesso.
 - b) em todos os momentos, o alerta só diz respeito ao fato de que, na gravidez, os cuidados com a dieta da gestante devem ser redobrados.
 - c) já se vêem, há muito, divulgando resultados de descobertas científicas sobre os efeitos nocivos da ingestão de gorduras em excesso à saúde humana.
 - d) agora é que se está tomando conhecimento de que os cuidados com a alimentação, no período da gravidez, deve antecipar-se a quaisquer outros cuidados.
 - e) no momento, os cientistas defendem que o dano causado aos filhos, pela ingestão de dietas com gordura em excesso, pode se fazer notar desde o período de amamentação.
10. A opção na qual figura uma afirmação/informação elaborada por meio de recursos de linguagem figurada, atentando para o trecho destacado, é
- a) *A conclusão foi obtida após os pesquisadores analisarem as reações de cobaias geradas por mães alimentadas com uma dieta rica em gordura e por outras, nutridas com uma alimentação normal.*
 - b) *Segundo os autores do trabalho, é a primeira vez que isso fica demonstrado.*
 - c) *... o estudo, feito em cobaias, revelou que os filhotes de mães alimentadas com excesso de gordura apresentam um risco mais elevado de manifestar dependência e uso abusivo de álcool e de nicotina durante a adolescência.*
 - d) *Desta vez o dano identificado foi aos filhos de gestantes que adotam este tipo de alimentação ao longo da gravidez.*
 - e) *Uma pesquisa divulgada na última semana disparou mais um alerta em relação aos prejuízos causados por uma dieta rica em gordura.*

LEGISLAÇÃO DO SUS

11. A Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, estabelece a perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do Sistema Único de Saúde - SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto Pela Saúde 2006, que será anualmente revisado com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a uma prioridade pactuada no Pacto Pela Vida:

- a) Saúde do idoso.
- b) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
- c) Redução da mortalidade infantil e materna.
- d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- e) Saúde do adolescente.

12. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, define Regiões de Saúde como um espaço geográfico contínuo constituído por aglomerado de municípios com a *finalidade* de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde e serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços. Assinale a assertiva **INCORRETA**.

- a) Atenção primária e secundária.
- b) Urgência e emergência.
- c) Atenção psicossocial.
- d) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- e) Vigilância em saúde.

13. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, é **INCORRETO** afirmar que a estratégia Saúde da Família deve

- a) ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- b) atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.
- c) desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- d) buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- e) ser um espaço de construção de conhecimentos científicos.

14. De acordo com a Política de Humanização do SUS, a Humanização é vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. Todas as alternativas referentes à operacionalização da Humanização do SUS estão corretas, **EXCETO**,

- a) a troca e a construção de saberes.
- b) o trabalho em rede com equipes multiprofissionais.
- c) o resgate dos fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no SUS, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos passivos das ações de saúde.
- d) a identificação das necessidades, desejos e interesses dos diferentes sujeitos do campo da saúde.
- e) o pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS (federal, estadual e municipal), entre as diferentes instâncias de efetivação das políticas públicas de saúde (instâncias da gestão e da atenção), assim como entre gestores, trabalhadores e usuários desta rede.

15. A epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Correlacione à coluna de acordo com os conceitos e marque a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (1) Infectividade.
- (2) Patogenicidade.
- (3) Virulência.
- (4) Imunogenicidade.
- (5) Letalidade.

- () É a capacidade de um agente infeccioso produzir casos graves ou fatais (poder agressor do agente).
- () Capacidade que certos organismos tem de penetrar e se desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro causando infecção.
- () Mede o risco de morrer, proporção de óbitos entre os casos que adoecem.
- () É a capacidade de um agente produzir imunidade no hospedeiro.
- () É a capacidade que o agente infeccioso tem de, após instalado no organismo, produzir sintomas em maior ou menor proporção entre os hospedeiros infectados.

- a) 3, 5, 1, 4, 2.
- b) 1, 5, 4, 3, 2.
- c) 3, 1, 5, 4, 2.
- d) 4, 1, 5, 2, 3.
- e) 5, 1, 3, 4, 2.

16. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, **EXCETO**,

- a) participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- b) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- c) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- d) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde - SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- e) promover a centralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência apenas estadual.

17. A saúde da mulher compreende todo o conjunto de patologias e situações que envolvam o controle do risco à saúde e ao bem-estar da população feminina. Assim, julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

I - A principal suspeita da gestação é o atraso menstrual em mulheres eumenorreicas e com vida sexual ativa.

II - A mulher deve ser estimulada a procurar a assistência ao pré-natal tão logo seja feita o diagnóstico da gestação.

III - Alertar sobre o uso de medicamentos e medidas prejudiciais para o concepto trata-se de objetivo da assistência ao pré-natal.

a) Todas assertivas são verdadeiras.

b) Todas assertivas são falsas.

c) Apenas I e II são verdadeiras.

d) Apenas II e III são verdadeiras.

e) Apenas I e III são verdadeiras.

18. A promoção à saúde é concebida, cada vez mais, como “a soma das ações da população, dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e outros setores sociais e produtivos, voltados para o desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e coletiva”. Assim, julgue as assertivas abaixo acerca dos princípios da promoção da saúde dos idosos e marque a alternativa **CORRETA**.

I - Promover o envelhecimento saudável.

II - Manter e melhorar a capacidade funcional dos idosos.

III - Promover uma velhice saudável, na visão de que velhice é doença.

a) Todas assertivas são verdadeiras.

b) Todas assertivas são falsas.

c) Apenas I e II são verdadeiras.

d) Apenas II e III são verdadeiras.

e) Apenas I e III são verdadeiras.

19. Na equipe interdisciplinar, é necessário definir alguns papéis com a finalidade de atingir os objetivos propostos na assistência domiciliar. Marque a alternativa **CORRETA** em relação ao papel do médico.

a) Proporcionar educação permanente em serviço à equipe de enfermagem nas tarefas relativas à assistência domiciliária de enfermagem.

b) Execução e orientação de prescrição médica e de enfermagem.

c) Avaliação clínica do paciente.

d) Avaliação, diagnóstico e acompanhamento social.

e) Facilitar para a equipe nas demandas psicológicas dos pacientes.

20. Correlacione as responsabilidades dos governos Federal, Estadual e Municipal, na atenção básica, e marque a alternativa com a sequência **CORRETA**.

1. Propor instrumentos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção básica.
2. Criar sistemas para controle do fluxo de pessoas entre os municípios de uma mesma região (Regular as relações intermunicipais).
3. Elaborar os contratos dos trabalhadores da atenção básica garantindo os direitos trabalhistas previstos em Lei.

() Municipal

() Estadual

() Federal

a) 3, 2, 1.

b) 1, 2, 3.

c) 3, 1, 2.

d) 2, 3, 1.

e) 1, 3, 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os agentes farmacológicos usados na reanimação cardiopulmonar pediátrica, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) As drogas lipossolúveis como adrenalina, atropina, lidocaína e naloxona podem ser administrados por via traqueal quando não for possível o acesso vascular ou intraósseo.
 - b) A adrenalina é um mediador alfa-adrenérgico que promove aumento da pressão diastólica aórtica e aumento da pressão de perfusão coronariana.
 - c) A amiodarona é o antiarrítmico de escolha indicado no tratamento da fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, refratários a desfibrilação.
 - d) A vasopressina é recomendada como a droga de segunda escolha no tratamento de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso quando a amiodarona não estiver disponível.
 - e) O uso rotineiro de bicarbonato de sódio não está indicado nas paradas cardiorrespiratórias prolongadas, mas seu uso deve ser considerado após entubação e administração de adrenalina, pelo risco de acidose metabólica.
22. Em crianças vítimas de traumatismo cranioencefálico, há indicação de drenagem cirúrgica de hematoma epidural em todas as situações abaixo, **EXCETO**,
- a) déficit neurológico focal.
 - b) distúrbios eletrolíticos e metabólicos.
 - c) paralisia do terceiro par craniano.
 - d) aumento significativo da letargia.
 - e) sinais de desvio e/ou compressão do fluxo vascular.
23. Na investigação diagnóstica de uma criança sob suspeita de meningite, há indicação de exames de imagem antecedendo a coleta do líquido cefalorraquidiano nas seguintes situações, **EXCETO**,
- a) paciente imunocomprometido.
 - b) papiledema.
 - c) crise convulsiva focal.
 - d) presença de derivações ventriculares.
 - e) idade inferior a 3 meses.
24. Em uma criança com dengue, os sinais abaixo são considerados de alerta, **EXCETO**,
- a) vômitos persistentes.
 - b) hepatomegalia dolorosa.
 - c) mialgia e dor retrorbitária.
 - d) hematêmese e/ou melena.
 - e) diminuição da diurese.

25. São indicações de internação na pielonefrite aguda, **EXCETO**,
- a) urgência e/ou incontinência urinária.
 - b) idade inferior a 2 meses.
 - c) comprometimento do estado geral.
 - d) patologias obstrutivas do trato urinário.
 - e) imunodeprimidos.
26. A droga de escolha a ser administrada em caso de suspeita de anafilaxia é:
- a) Ranitidina.
 - b) Metilprednisolona.
 - c) Difenidramina.
 - d) Epinefrina.
 - e) Aminofilina.
27. Assinale a alternativa que contém a droga de primeira linha no tratamento das crises epiléticas neonatais:
- a) Diazepam.
 - b) Valproato de sódio.
 - c) Midazolam.
 - d) Fenitoína.
 - e) Fenobarbital.
28. Em caso de invaginação intestinal, a redução incruenta com enema está contraindicada em todas as situações abaixo, **EXCETO**,
- a) crianças acima de 2 anos.
 - b) tempo de evolução do quadro acima de 48 horas.
 - c) bom estado geral.
 - d) sinais de peritonite.
 - e) invaginação crônica ou recorrente.
29. Durante o tratamento da cetoacidose diabética, a complicação mais temida pela alta taxa de morbimortalidade é:
- a) Hipocalemia.
 - b) Arritmia cardíaca decorrente de distúrbios eletrolíticos.
 - c) Hipoglicemia.
 - d) Edema cerebral.
 - e) Rabdomiólise.

30. A glomerulonefrite pós-estreptocócica é doença de evolução autolimitada e benigna na maioria dos casos. Haverá indicação de biópsia renal em todas as situações abaixo, **EXCETO**,
- a) hematúria macroscópica por mais de 4 semanas.
 - b) oligoanúria por mais de 72 horas.
 - c) hipocomplementemia por mais de 8 semanas.
 - d) história familiar de doença renal e sinais de doença sistêmica.
 - e) proteinúria não-nefrotica por 8 semanas.
31. A principal complicação pós-operatória entre os pacientes com anemia falciforme é:
- a) Sequestro esplênico.
 - b) Síndrome torácica aguda.
 - c) Infarto ósseo.
 - d) Priapismo.
 - e) Acidente vascular encefálico.
32. Em caso de intoxicação exógena por barbitúricos, as estratégias abaixo são aceitas para descontaminação ou eliminação do agente, **EXCETO**,
- a) Alcalinização da urina por administração de bicarbonato de sódio endovenoso.
 - b) Diálise peritoneal ou hemodiálise.
 - c) Diurese forçada por administração de hiperidratação e furosemida.
 - d) Carvão ativado.
 - e) Xarope de ipeca.
33. A respeito de maus-tratos e violência contra a criança, assinale a alternativa **CORRETA**.
- a) De maneira geral, deve-se suspeitar de maus-tratos sempre que forem encontradas introspecção e passividade exageradas na criança, estágios diferentes de cicatrização de múltiplas lesões ou atraso inexplicável para procurar atendimento após um acidente.
 - b) A notificação de violência contra crianças pelos profissionais de saúde não é obrigatória, mas recomendável, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
 - c) Em caso de violência sexual, devem ser administrados medicamentos profiláticos contra doenças sexualmente transmissíveis, além de contracepção de urgência para todas as vítimas do sexo feminino.
 - d) As lesões intracranianas, provocadas por abuso físico, costumam ser leves e as sequelas motoras e/ou cognitivas são observadas em menos de 5% dos casos.
 - e) Após confirmação de maus-tratos contra a criança, ela deverá ser imediatamente conduzida para Instituições, tais como abrigos ou orfanatos, a fim de que possa se afastar da situação de risco instituída.

- 34.** Na fase aguda (ou descompensada) da insuficiência cardíaca em crianças, estão indicadas as seguintes medidas, **EXCETO**,
- a) redução da demanda metabólica.
 - b) uso de beta-bloqueadores e inibidores da enzima conversora de angiotensina.
 - c) uso de diuréticos.
 - d) uso de agentes inotrópicos.
 - e) correção de distúrbios eletrolíticos.
- 35.** São causas comuns de hipertensão arterial no recém-nascido, **EXCETO**,
- a) trombose de artéria renal.
 - b) hipertensão arterial primária.
 - c) coarctação de aorta.
 - d) displasia broncopulmonar.
 - e) malformações renais congênitas.
- 36.** São critérios de admissão hospitalar da criança em crise asmática, **EXCETO**,
- a) um episódio de internação por asma no ano anterior.
 - b) uso intenso de musculatura acessória.
 - c) saturação de oxigênio inferior a 93% em ar ambiente, após abordagem terapêutica inicial.
 - d) baixa ingestão hídrica com risco de desidratação.
 - e) alteração do nível de consciência.
- 37.** É causa de hiponatremia euvolêmica:
- a) Diarreia e vômitos.
 - b) Insuficiência hepática.
 - c) Síndrome nefrótica.
 - d) Hipotireoidismo.
 - e) Insuficiência cardíaca.
- 38.** Qual a principal etiologia para acidose metabólica com anion gap normal?
- a) Acidose tubular renal.
 - b) Jejum prolongado.
 - c) Erros inatos de metabolismo.
 - d) Diarreia aguda.
 - e) Intoxicação exógena.

39. A diálise deve ser indicada precocemente na insuficiência renal aguda para favorecimento da recuperação renal e redução da mortalidade. São indicações de terapia dialítica, **EXCETO**,

- a) sobrecarga hídrica significativa (acima de 10% de ganho ponderal).
- b) acidose metabólica refrataria.
- c) encefalopatia uremica.
- d) hiperpotassemia severa.
- e) alcalose metabólica descompensada.

40. São indicações para utilização de plasma fresco congelado, **EXCETO**,

- a) sangramento decorrente da deficiência de múltiplos fatores (ativo ou pré-procedimento invasivo) em hepatopatas.
- b) tratamento de sangramento ativo em portadores de deficiência congênita de fatores de coagulação para os quais não se dispõe de concentrado liofilizado específico (fatores V, X e XI).
- c) necessidade de reversão do uso de anticoagulantes orais.
- d) reposição de proteínas em pacientes queimados, desnutridos ou em sepse.
- e) hemorragia neonatal por deficiência de fatores vitamina K – dependentes.

41. Assinale a alternativa **INCORRETA** no que diz respeito aos cuidados a serem tomados com os portadores de coagulopatias hereditárias:

- a) Os procedimentos invasivos deverão ser precedidos de terapia de reposição, com elevação de fator para níveis adequados.
- b) Não devem ser feitas aplicações intramusculares, excetuando-se as vacinas quando não puderem ser utilizadas de forma subcutânea.
- c) Os anti-inflamatorios não-hormonais e o ácido salicílico não devem ser prescritos.
- d) As hemartroses não devem ser rotineiramente puncionadas a menos que haja grande distensão de tecidos e/ou no caso de fazer diagnostico diferencial com pioartrite.
- e) A realização de punção lombar deve ser precedida da elevação do fator deficiente em 50%.

42. Todas as condições abaixo estão associadas a maior risco de formação de aneurismas na doença de Kawasaki, **EXCETO**,

- a) hipoalbuminemia.
- b) febre persistente após infusão de imunoglobulina.
- c) sexo feminino.
- d) idade inferior a 1 ano.
- e) infusão de imunoglobulina no 14º dia de evolução do quadro.

- 43.** O exame primário avalia a existência de lesões que ameaçam a vida da criança vítima de politraumatismo. A respeito dessa situação, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) O exame primário inicia com a avaliação da permeabilidade das vias aéreas concomitantemente com a manutenção do alinhamento da coluna cervical.
 - b) Assegurada a permeabilidade das vias aéreas, inicia-se a avaliação da ventilação. O pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto e o hemotórax maciço devem ser tratados assim que identificados.
 - c) A avaliação da circulação deve permitir o controle de sangramentos aparentes além da obtenção de acessos (vasculares ou intraósseos).
 - d) A avaliação neurológica sucinta em lactentes testa reflexos primitivos e verifica a simetria e fotorreatividade das pupilas uma vez que a escala de coma de Glasgow não consegue ser definida, pois não dispõe de parâmetros de referência em todos os quesitos que a compõem.
 - e) A exposição do corpo com controle térmico é necessária para evitar o desenvolvimento de hipotermia.
- 44.** Em crianças pré-escolares, as principais causas de hemorragia digestiva baixa são:
- a) Enterocolite infecciosa e pólipos.
 - b) Alergia ao leite de vaca e má-rotação.
 - c) Doença inflamatória intestinal e hemorróidas.
 - d) Alergia à proteína do leite de vaca e pólipos.
 - e) Enterocolite infecciosa e hemorroidas.
- 45.** São indicações de hospitalização em unidade especializada de queimados, **EXCETO**,
- a) queimaduras em lactentes, independente do grau de queimadura devido imaturidade renal.
 - b) queimaduras moderadas a graves acima de 10% da superfície corpórea queimada.
 - c) queimaduras por inalação de fumaça.
 - d) queimaduras por abuso ou maus-tratos.
 - e) queimaduras elétricas.
- 46.** A insuficiência respiratória pode ser decorrente de hipoventilação, por distúrbios na difusão e por distúrbios na relação ventilação/perfusão. Dentre opções abaixo, assinale aquela que contém uma causa de insuficiência respiratória por hipoventilação.
- a) Asma brônquica.
 - b) Síndrome de Guillain Barre.
 - c) Doença da membrana hialina.
 - d) Pneumotórax.
 - e) Insuficiência cardíaca com baixo débito.

47. A varicela costuma ser uma doença benigna na infância. Entretanto, complicações graves podem eventualmente ocorrer. Dentre elas, podemos citar, **EXCETO**,
- a) infecções bacterianas secundárias.
 - b) hepatoesplenomegalia.
 - c) encefalites.
 - d) trombocitopenia e coagulopatia de consumo.
 - e) síndrome de Reye.
48. A terapia de reidratação oral deve ser interrompida em todas as situações abaixo, **EXCETO**,
- a) íleo paralítico.
 - b) irritação peritoneal.
 - c) crise convulsiva.
 - d) vômitos incoercíveis com retenção inferior a 10% do ingerido.
 - e) dois episódios de diarreia em 4 horas.
49. Em pacientes com choque séptico, qual dentre as drogas abaixo deve ser evitada pelo risco de supressão adrenal?
- a) Quetamina.
 - b) Atropina.
 - c) Etomidato.
 - d) Milrinona.
 - e) Dopamina.
50. Em crianças com gastroenterite aguda, evoluindo com vômitos, qual antiemético pode ser administrado em dose única para melhora da aceitação da terapia oral e com maior segurança neurológica para o paciente?
- a) Ondansertrona.
 - b) Bromoprida.
 - c) Proclorperazina.
 - d) Metoclopramida.
 - e) Dimenidrato.