



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

De onde provém o suprimento sanguíneo arterial do corpo uterino?

- (A) Ramo ascendente da artéria uterina e Ramo uterino da artéria ovariana.
- (B) Ramo ascendente da artéria cervical superior, que é ramo da artéria uterina comum.
- (C) Artéria uterina, que é ramo direto da artéria aorta abdominal.
- (D) Suprimento direto pela artéria ilíaca comum.
- (E) Suprimento direto pela artéria ilíaca interna.

QUESTÃO 27

Paciente de 27 anos tenta engravidar sem sucesso há 18 meses, desde que parou uso do anticoncepcional oral. Apresenta intervalo de aproximadamente 3 semanas entre as menstruações e queixa de sangramento em pequenas manchas escuras por vários dias antes de menstruar. Chegou a usar medicamento à base de progesterona micronizada por 15 dias no mês, durante 3 meses, e obteve melhora do padrão de sangramento. Realizada biópsia de endométrio que mostrou relativa atrofia e imaturidade endometrial, com defasagem de 3 dias em relação ao esperado. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Insuficiência lútea.
- (B) Anovulação crônica.
- (C) Pólipo endometrial atrofico.
- (D) Falência ovariana precoce.
- (E) Endometriose.

QUESTÃO 28

Sobre a Terapia de reposição hormonal (TRH) e o tratamento sintomático no climatério e menopausa, assinale a alternativa correta.

- (A) Os inibidores seletivos de receptação de serotonina e a gabapentina são eficazes na redução de sintomas vasomotores.
- (B) Hipertensão arterial controlada com medicamentos contraindica a TRH.
- (C) Antecedente de câncer cervicouterino de células escamosas contraindica a TRH.
- (D) Não há indicação de uso de terapia androgênica na pós-menopausa.
- (E) Os fitoterápicos têm eficácia comprovadamente semelhante à TRH para redução de sintomas vasomotores.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta sobre a infecção por *Chlamydia Trachomatis*.

- (A) A presença de *Chlamydia* no trato genital produz sintomas na grande maioria das vezes, sendo raros casos assintomáticos.
- (B) Para o diagnóstico por cultura, o material deve ser coletado por swab na uretra e no canal endocervical.
- (C) A Bacterioscopia vaginal tem boa sensibilidade para o diagnóstico.
- (D) O tratamento do parceiro é recomendado apenas se este tiver infecção sintomática.
- (E) No caso de infecção durante a gestação, recomenda-se aguardar o parto para iniciar o tratamento.

QUESTÃO 30

Paciente de 19 anos, nuligesta, sexualmente ativa, nega uso de contraceptivos hormonais. Última menstruação há 4 dias, ainda com fluxo discreto. Tem ciclos menstruais regulares, sempre com dismenorrea importante e progressiva, com melhora apenas parcial com anti-inflamatórios. Frequentemente, tem dispareunia de profundidade, mais acentuada no período perimenstrual, às vezes com necessidade de parada do coito. Refere hábito intestinal com aumento da frequência de evacuações no período perimenstrual. Nega leucorreia atual ou prévia. Feitos exames para investigação, constatou-se: tomografia contrastada da pelve sem alterações. CA 125 normal. Colonoscopia sem alterações. Exame de citologia cervicovaginal normal há 1 mês. Assinale a alternativa correta sobre o caso.

- (A) A síndrome do intestino irritável é o diagnóstico mais provável.
- (B) Deve ser indicada laparoscopia para diagnóstico de endometriose superficial.
- (C) Os exames realizados excluem o diagnóstico de endometriose.
- (D) Trata-se provavelmente de dismenorrea idiopática. Deve ser indicado tratamento com analgésicos sempre que menstruar.
- (E) Tratamento empírico da paciente e parceiros, para Doença Inflamatória Pélvica, deve melhorar os sintomas.

QUESTÃO 31

Paciente de 45 anos, 3 partos vaginais prévios. Apresenta-se com queixa de percepção de prolapso genital. Nega alterações urinárias ou de hábito intestinal. Nega queixas sexuais. Ao exame físico, nota-se protrusão da parede vaginal anterior, a partir do terço distal da vagina, ultrapassando as carúnculas himenais. A mucosa protrusa mantém sua rugosidade habitual. Qual é a técnica cirúrgica mais adequada para a correção do defeito, de maneira sítio-específica?

- (A) Plicatura do defeito central da fásia vesicovaginal (ou pubocervical).
- (B) Reinserção da fásia vesicovaginal (ou pubocervical) no anel pericervical.
- (C) Reinserção da fásia vesicovaginal (ou pubocervical) no arco tendíneo da fásia pélvica.
- (D) Plicatura com aproximação dos músculos elevadores do ânus.
- (E) Histerectomia simples.

QUESTÃO 32

Paciente de 34 anos, hígida, 2 partos vaginas prévios, ciclos menstruais regulares. Queixa de perda urinária súbita e involuntária, em quantidade moderada. Tem desejo miccional noturno frequente que a desperta. Não consegue adiar a micção por mais de 3 minutos. Tem jato urinário com força normal. Nega perdas durante atividade sexual. Teve melhora importante dos sintomas com uso de medicação anticolinérgica. Caso seja realizado um estudo urodinâmico, qual seria o achado esperado?

- (A) Ausência de perda urinária aos esforços.
- (B) Perda urinária aos esforços com pressão de perda menor que 60 cmH₂O.
- (C) Perda urinária aos esforços com pressão de perda maior que 100 cmH₂O.
- (D) Contrações não inibidas do detrusor.
- (E) Capacidade vesical reduzida.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta sobre os cistos da glândula de Bartholin.

- (A) A maioria das infecções é causada por *Chlamydia Trachomatis*.
- (B) A maioria das infecções é causada por *Neisseria Gonorrhoeae*.
- (C) O tratamento por drenagem leva a maior recorrência, porém é uma escolha adequada para o primeiro episódio.
- (D) O tratamento cirúrgico está sempre indicado.
- (E) Cistos de Bartholin, após a menopausa, são raros, mas nesse caso a maioria são neoplásicos.

QUESTÃO 34

Paciente de 35 anos, sexualmente ativa, assintomática, apresenta-se para consulta de rotina e traz o seguinte resultado de exame preventivo do colo uterino: estão representados epitélios escamoso e glandular, com presença de Metaplasia escamosa. Flora com abundantes bacilos de doederlein. Qual é a correta interpretação e tratamento dos achados?

- (A) Achado normal e infecção cervical, fazer tratamento com antibiótico e manter preventivo rotineiramente.
- (B) Alteração secundária à infecção, repetir o preventivo após tratamento.
- (C) Resultado normal, seguir preventivos rotineiramente.
- (D) Alteração pré-maligna, indicar colposcopia com biópsia.
- (E) Alteração pré-maligna, realizar eletrocauterização do colo.

QUESTÃO 35

Mulher de 45 anos, 2 filhos, sem antecedentes familiares de doença mamária, tem ciclos menstruais regulares, sem queixas, apresenta-se para exame de rotina, no qual notam-se mamas densas simétricas, expressão mamilar negativa. Foi submetida a sua primeira Mamografia, que demonstrou Birads 3 por assimetria focal. Qual é a conduta?

- (A) Ressonância magnética ou tomografia das mamas.
- (B) Biópsia guiada da área de Assimetria.
- (C) Nova Mamografia em 2 anos.
- (D) Nova Mamografia em 1 ano.
- (E) Repetir a Mamografia semestralmente por até 2 anos.

QUESTÃO 36

Na gestação ocorrem alterações nas proporções dos elementos celulares do sangue, levando à alteração dos valores considerados normais para hemoglobina e leucócitos. O conhecimento desses valores é fundamental para correta identificação de anemias e de possíveis infecções. Considerando o terceiro trimestre da gestação, assinale a alternativa que informa o valor de Hemoglobina (Hb) abaixo do qual considera-se anemia, e o valor de leucócitos (Leuc) acima do qual considera-se o exame alterado.

- (A) Hb < 14 g/dL; Leuc > 10.000
- (B) Hb < 12 g/dL; Leuc > 20.000
- (C) Hb < 12 g/dL; Leuc > 22.000
- (D) Hb < 11 g/dL; Leuc > 10.000
- (E) Hb < 11 g/dL; Leuc > 14.000

QUESTÃO 37

Em relação à vacinação contra o tétano durante o pré-natal, assinale a alternativa correta.

- (A) É necessário revacinar todas as gestantes.
- (B) Gestantes com esquema vacinal completo, porém aplicado há mais de 5 anos devem receber dose de reforço.
- (C) Gestantes com esquema vacinal completo devem receber dose de reforço, caso a última dose tenha sido aplicada há mais de 10 anos.
- (D) Gestantes com esquema vacinal completo não precisam receber dose de reforço.
- (E) A vacina contra o tétano é contraindicada na gestação.

QUESTÃO 38

Paciente de 25 anos teve gestação molar esvaziada há 30 dias. Está em uso correto de contraceptivo oral combinado. Assintomática no momento, retorna para seguimento. Ultrassonografia transvaginal realizada hoje demonstra cistos teca-luteínicos em ovários bilateralmente, útero de volume normal, endométrio 5mm. Dosagem de beta-hCG hoje = 500 mUi/mL (primeiro exame após o esvaziamento da mola). Qual é o diagnóstico e conduta corretos?

- (A) Persistência de tecido molar, realizar novo esvaziamento uterino.
- (B) Evolução dentro do previsto. Colher novo beta-hCG a cada 15 dias e novo Ultrassom em 2 meses.
- (C) Persistência anormal dos cistos teca-luteínicos. Indicar ooforoplastia laparoscópica.
- (D) Suspeita de coriocarcinoma. Realizar estadiamento cirúrgico.
- (E) Suspeita de coriocarcinoma. Indicar tratamento quimioterápico.

QUESTÃO 39

Gestante de 25 anos, hoje com 13 semanas de gestação segundo ultrassonografia. Traz resultados de exames de pré-natal, colhidos há 2 semanas. Observa-se sorologia para Toxoplasmose com igM positivo e igG positivo, com baixa avidéz. Qual é a hipótese diagnóstica e conduta adequada?

- (A) Infecção materna anterior à gestação. Seguir pré-natal normalmente.
- (B) Infecção materna anterior à gestação. Iniciar espiramicina e ácido fólico.
- (C) Infecção materna crônica. Iniciar tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
- (D) Infecção materna recente. Iniciar tratamento com espiramicina e indicar amniocentese para pesquisa de infecção fetal.
- (E) Infecção materna recente. Iniciar tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico. Indicar amniocentese para pesquisa de infecção fetal.

QUESTÃO 40

Gestante de 31 semanas, hipertensa, sem uso de medicações contínuas. Vem ao pronto atendimento com queixa de cefaleia. Nega alterações visuais ou outras dores. Refere boa movimentação fetal e nega outras queixas. Ao exame, PA = 150 x 95 mmHG. Edema 1+ em 4. Dinâmica uterina ausente, BCF 148 bpm, com boa movimentação fetal e acelerações transitórias. Qual é a conduta medicamentosa indicada para controle pressórico agudo durante a crise hipertensiva?

- (A) Metildopa via oral.
- (B) Nifedipina sublingual.
- (C) Sulfato de magnésio endovenoso.
- (D) Nitroprussiato endovenoso.
- (E) Hidralazina endovenosa.

QUESTÃO 41

Define-se pré-eclâmpsia como a hipertensão na gestação a partir da vigésima semana, acompanhada de proteinúria. Mesmo dentre as gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia, é possível identificar aquelas de maior gravidade (por meio de critérios de gravidade estabelecidos), a fim de se introduzir terapêutica e monitorização mais rigorosas. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que NÃO apresenta critério de gravidade da pré-eclâmpsia

- (A) Edema 4+ em membros inferiores bilateralmente.
- (B) Dor epigástrica ou em hipocôndrio direito.
- (C) PA = 160/110 mmHg.
- (D) Proteinúria de 2+ em exame de urina.
- (E) Aumento de enzimas hepática TGO e TGP.

QUESTÃO 42

Primigesta, 26 anos, 11 semanas de gestação, hoje com índice de massa corpórea – IMC = 26 kg/m². Está assintomática e retorna hoje com resultados de exames do pré-natal. A glicemia de jejum foi de 76 mg/dL. Assinale a alternativa correta em relação ao rastreo para diabetes gestacional.

- (A) Deve-se solicitar o teste de tolerância oral com 75 g de glicose após as 24 semanas, com dosagem em 3 tempos (jejum, 1h e 2h após a ingestão).
- (B) Deve-se solicitar teste de tolerância oral com 100g de glicose após as 24 semanas, com dosagem em 4 tempos (jejum, 1h, 2h, 3h e 4h após a ingestão).

- (C) Deve-se prosseguir a investigação com hemoglobina glicada já no primeiro trimestre.
- (D) Deve-se repetir a glicemia de jejum a cada trimestre.
- (E) O rastreio dessa paciente é negativo, não havendo necessidade de proceder a investigação para diabetes.

QUESTÃO 43

Durante o plantão na maternidade você atende uma primigesta de 40 semanas, em trabalho de parto com contrações regulares e dilatação de 6cm, vitalidade fetal preservada. No cartão de pré-natal, observam-se as seguintes sorologias: HBS-ag positivo, anti-HBc igG positivo. Qual é a conduta em relação ao parto e assistência perinatal?

- (A) Parto vaginal. Administrar imunoglobulina para a gestante. Permitir aleitamento materno.
- (B) Parto Cesariana. Administrar vacina para o recém-nascido. Contraindicar aleitamento materno.
- (C) Parto Cesariana. Administrar imunoglobulina e vacina para o recém-nascido. Contraindicar aleitamento materno.
- (D) Via de parto por indicação obstétrica. Administrar imunoglobulina e vacina para o recém-nascido. Permitir aleitamento materno.
- (E) Via de parto por indicação obstétrica. Administrar imunoglobulina e vacina para o recém-nascido. Contraindicar aleitamento materno.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta em relação ao Hipertireoidismo na gravidez.

- (A) Devido às alterações imunológicas da gestação, o encontro de anticorpos antitireoide não tem valor diagnóstico neste período.
- (B) O tratamento de escolha é a radioiodoterapia localizada.
- (C) O propiltiouracil (PTU) é a droga de escolha, por ter menor passagem transplacentária que o metimazol.
- (D) O tratamento sintomático com betabloqueadores está contraindicado.
- (E) Só deve ser indicado tratamento quando houver evidência de tempestade tireotóxica com risco materno.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta sobre o uso do AZT (zidovudina) para profilaxia de transmissão vertical do HIV.

- (A) Nas gestantes HIV+ sem imunodeficiência, utiliza-se AZT isoladamente durante a gestação até o trabalho de parto.
- (B) Só está indicado AZT durante o trabalho de parto, nos casos de ruptura de membranas com evolução para parto vaginal.
- (C) A cesariana eletiva dispensa o uso do AZT.
- (D) O AZT só previne transmissão vertical nos casos com elevada carga viral, quando deve ser utilizado durante todo o trabalho de parto.
- (E) AZT venoso está indicado durante o trabalho de parto e também previamente à cesariana eletiva.


QUESTÃO 46

Assinale a alternativa correta sobre a construção do partograma.

- (A) Cada coluna representa um toque vaginal subsequente, independente do tempo.
- (B) A linha de alerta só é traçada após verificação de atraso na evolução do trabalho de parto, e deve ser colocada logo após o primeiro toque vaginal suspeito.
- (C) Em um trabalho de parto eutócico é esperado que a curva de dilatação cervical atravesse a linha de alerta.
- (D) A linha de ação é traçada diagonalmente de forma ascendente para a direita, no local que representa 4 horas após a linha de alerta.
- (E) No caso de a parturiente apresentar repentina pausa nas contrações, deve-se suspender o preenchimento do partograma até que as contrações voltem a ser efetivas.

QUESTÃO 47

Primigesta, com 41 semanas de gestação, vem à maternidade para indução do trabalho de parto. Ao exame, apresentava colo firme, anteriorizado, apagado em 50%, com 2 cm de dilatação, apresentação cefálica em plano -2 de De Lee. Recebeu misoprostol intravaginal para maturação cervical e após 1 hora foi traçada a seguinte cardiocotografia:



Assinale a alternativa que apresenta a explicação mais provável para esse traçado e a conduta adequada.

- (A) Exame feito em posição supina. Deitar a paciente em decúbito lateral esquerdo e repetir o exame.
- (B) Compressão do polo cefálico fetal. Levar a paciente à sala de parto e avaliar uso de fórcepe.
- (C) Compressão do cordão umbilical. Indicar cesariana.
- (D) Hipóxia fetal. Indicar cesariana de urgência.
- (E) Hiperestimulação pelo misoprostol. Fazer hidratação venosa e terbutalina subcutânea e reavaliar.

QUESTÃO 48

Primigesta de 26 anos, 36 semanas de amenorreia, hígida, sem intercorrências no pré-natal. Apresenta-se com queixa de contrações uterinas a cada 4 minutos. A última ultrassonografia realizada com 28 semanas mostra placenta de inserção baixa, a 1cm do orifício interno do colo, e cordão com inserção velamentosa. O médico realizou toque vaginal e constatou dilatação cervical de 4cm. Amnioscopia mostrou líquido claro e finos vasos na membrana amniótica. Após alguns momentos, a paciente evoluiu com ruptura da bolsa e perda de líquido amniótico mesclado a pouca quantidade de sangue, e desaceleração dos batimentos cardíofetais (BCF). O médico prontamente indicou cesariana. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico deveria ter solicitado ultrassonografia e não realizar o toque vaginal. O toque pode ter precipitado o sangramento da placenta prévia.
- (B) Trata-se de provável prolapso do cordão umbilical. A conduta foi acertada.
- (C) Trata-se de provável descolamento prematuro da placenta. A conduta foi acertada.
- (D) A perda sanguínea é de origem fetal, que mesmo em pouca quantidade constitui grave emergência e é indicação precisa de cesariana.
- (E) O sangramento é de origem materna, devido à dilatação cervical. A desaceleração dos BCF deve-se à compressão do polo cefálico. A conduta correta seria atenção ao período expulsivo do trabalho de parto.

QUESTÃO 49

Modernamente são 3 as principais técnicas para avaliação da vitalidade fetal: Cardiotocografia de repouso (CTG); Dopplervelocimetria das artérias umbilicais e Cerebral média fetais; e Perfil Biofísico fetal (PBF). O PBF é constituído por análise dos seguintes quesitos: batimentos cardíofetais, movimentos respiratórios, movimentos corpóreos, tônus fetal e quantidade de líquido amniótico (ILA). Assinale a alternativa correta a respeito desses parâmetros.

- (A) No sofrimento fetal, o primeiro parâmetro a se alterar é a redução dos movimentos fetais.
- (B) O marcador agudo mais importante é a quantidade de líquido.
- (C) A ausência de movimentos respiratórios, comumente, pode indicar infecção ovular ou hipoglicemia.
- (D) Nos casos de hipoxemia fetal crônica, a centralização fetal, percebida ao estudo Doppler, ocorre mais tardiamente em relação à alteração do ILA.
- (E) Na avaliação ultrassonográfica do PBF, a avaliação ininterrupta durante 10 minutos sem observação de movimentos respiratórios é considerada como pontuação zero nesse quesito.

QUESTÃO 50

São várias e severas as complicações fetais decorrentes da prematuridade. Dispomos de algumas intervenções para reduzir a incidência e/ou gravidade dessas complicações. Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Corticoterapia com Betametasona 12mg intramuscular por 2 dias, realizada entre 26 a 34 semanas de gestação reduz enterite necrotizante e hemorragia intracraniana.
- () O efeito máximo da corticoterapia inicia-se com 07 dias.
- () Todas as gestantes com trabalho de parto pré-termo, que NÃO tiverem uma cultura vaginal e retal negativas para Streptococo do grupo B com menos de 5 semanas, devem receber profilaxia com antibiótico
- () A antibioticoprofilaxia para sepse neonatal com penicilina só é

considerada efetiva após pelo menos 2 doses com intervalo de 4 horas.

- () Nas gestações com menos de 30 semanas, o Sulfato de Magnésio endovenoso tem efeito protetor contra hemorragia intracraniana.

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) F – F – F – F – F.