

QUESTÃO 01

São fatores que interferem na poliúria todos os abaixo, exceto:

- A) Café.
- B) Álcool.
- C) Glicose administrada I.V..
- D) Consumo excessivo de sal.
- E) Tiazídicos.

QUESTÃO 02

Sobre o pH da urina, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Durante o sono observa-se alcalose respiratória, o que torna a urina mais alcalina.
- 2. O citrato de potássio e a acetazolamida produzem urina ácida.
- 3. Dieta rica em frutas cítricas e vegetais, especialmente legumes, ajuda a manter a urina alcalina.
- 4. A medida precisa do pH urinário só pode ser realizada em uma amostra recém-eliminada.

Está(ão) correta(s):

- A) as afirmativas 1, 2 e 3, apenas.
- B) as afirmativas 2 e 4, apenas.
- C) as afirmativas 1 e 2, apenas.
- D) as afirmativas 3 e 4, apenas.
- E) a afirmativa 2, apenas.

QUESTÃO 03

Observa-se resultado falso positivo para hemoglobinúria ou hematúria em todas as situações abaixo, exceto:

- A) Administração de altas doses de ácido ascórbico ou vitamina C.
- B) Na presença de mioglobina.
- C) No uso de hipocloretos para a limpeza dos frascos de urina.
- D) Ingestão de iodetos.
- E) No uso de bacitracina ou anfotericina.

QUESTÃO 04

Sobre os exames bioquímicos é correto afirmar:

- A) Pode haver aumentos transitórios do PSA após palpação da próstata ou exame retal.
- B) A administração de radioisótopos não afeta o resultado da mensuração dos níveis de insulina.
- C) A coleta de sangue para o teste de tolerância à glicose só pode ser realizada imediatamente após a administração da glicose por via oral.
- D) Jejum prolongado ou anorexia reduz sensivelmente o nível de bilirrubina.
- E) O nível de glucagon encontra-se extremamente baixo na pancreatite aguda.

QUESTÃO 05

Sobre o processo de cicatrização das feridas, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Na fase de hemostasia e inflamação ocorre a angiogênese, estimulada por fatores quimiotáticos liberados pelas plaquetas.
- 2. Os fibroblastos migram para o interior da ferida pelo auxílio da fibronectina.
- 3. A hipóxia associada à hipercapnia e à acidose, acelera e/ou potencializa a síntese do colágeno.
- 4. Na reepitelização, as células replicadas migram por epibolia para atingir a borda da ferida.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

QUESTÃO 06

Sobre úlceras arteriais e venosas é correto afirmar:

- A) As úlceras arteriais são indolores e suas feridas localizam-se quase sempre na porção superior da perna.
- B) A insuficiência venosa produz úlceras nas porções mais distais do corpo.
- C) Na úlcera venosa, observam-se manchas de hemossiderina e endurecimento da pele circundante com uma base granulosa da ferida.
- D) A insuficiência venosa gera úlceras mais profundas.
- E) O tecido de granulação é abundante na úlcera arterial.

QUESTÃO 07

A respeito da ferida, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A coloração rósea mais clara da ferida indica boa circulação arterial.
- 2. A necrose iminente, sugestiva de infecção do tecido de granulação é exteriorizada pela coloração amarelo-acastanhada.
- 3. Feridas com diagnóstico de gangrena seca exigem debridamento mecânico.
- 4. Secreção serosa abundante indica insuficiência venosa ou inflamação e a necessidade de diminuir a manipulação da ferida.
- 5. Mesmo que a ferida esteja preenchida por tecido de granulação, a pele circundante pouco sadia pode retardar a cicatrização.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 4 e 5, apenas.
- E) 3 e 5, apenas.

QUESTÃO 08

Sobre o tratamento da dor no câncer, é correto afirmar:

- A) A caracterização da dor não tem importância neste caso.
- B) Os opiáceos fortes devem ser associados aos opiáceos fracos para potencializar sua ação.
- C) A opção da via inicial para administração das drogas é a endovenosa.
- D) O uso do analgésico atende ao critério de aparecimento da dor.
- E) A morfina tem finalidade analgésica, dificilmente provocando dependência psicológica ou depressão respiratória.

QUESTÃO 09

Sobre o câncer de pele, o enfermeiro deve saber que:

- A) a ceratose é uma hiperqueratose, potencialmente maligna, que pode ser causada pela exposição crônica à luz do sol, por ingestão ou injeção de arsênico.
- B) no xeroderma pigmentoso, observam-se lesões planas, acastanhadas e de tamanho variável, presentes desde o nascimento ou surgidas depois, na infância ou juventude.
- C) o carcinoma basocelular localiza-se preferencialmente no tronco e membros inferiores e se apresenta como uma lesão vegetante.
- D) o melanoma se apresenta como um tumor brilhante, sangrante e formando uma crosta que descama constantemente.
- E) o carcinoma espinocelular ocorre preferencialmente nas palmas das mãos, plantas dos pés, mucosas bucal e anal.

QUESTÃO 10

Sobre a transmissão da AIDS, é correto afirmar:

- A) A contaminação perinatal pelo HIV restringe-se à via transplacentária e à passagem através do canal do parto, pelo contato com o sangue materno na altura da vagina.
- B) As Infecções Sexualmente Transmissíveis não ulcerativas ao contrário das ulcerativas, não estão associadas ao aumento do risco da transmissão sexual da infecção por HIV.
- C) O sexo anal receptivo desprotegido é a prática de maior risco para contaminação pelo HIV para homens e mulheres se houverem lesões ulcerativas.
- D) A inseminação artificial é um procedimento excluído da transmissão pelo HIV, considerando os processos necessários para tratar o sêmen.
- E) Usuários de drogas injetáveis ilícitas têm o risco de contaminação pelo HIV potencializado pela situação econômica desfavorável, convivência com os múltiplos riscos e condições higiênicas precárias para a sua administração.

QUESTÃO 11

A respeito das Hepatites virais, analise as afirmativas abaixo:

- 1. O período de incubação do vírus varia de acordo com o tipo da Hepatite.
- 2. A icterícia é um sintoma presente em quase 95% dos casos.
- 3. A colúria pode ser observada na fase prodrômica ou pré-ictérica.
- 4. A icterícia acentuada pode vir acompanhada de colestase, fezes claras e prurido cutâneo.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 12

A respeito dos exames para investigação das infecções sexualmente transmissíveis, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Na coleta do muco cervical, o espécule vaginal precisa estar bastante lubrificado.
- 2. A coleta da amostra no canal anal requer a espera por alguns segundos para o swab absorver os microorganismos.
- 3. O canal anal fornece amostra que, tende a apresentar resultado positivo em um portador de infecção sexualmente transmissível, quando uma amostra cervical é negativa.

Está(ão) correta(s):

- A) as afirmativas 1 e 2, apenas.
- B) as afirmativas 2 e 3, apenas.
- C) as afirmativas 1 e 3, apenas.
- D) a afirmativa 1, apenas.
- E) a afirmativa 3, apenas.

QUESTÃO 13

Sobre as características dos ruídos respiratórios, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Quanto à duração do murmúrio vesicular, os ruídos expiratórios duram mais que os inspiratórios.
- 2. Os sons sussurrados mais intensos e nítidos são denominados pectorilóquia afônica.
- 3. Os sibilos são sons descontínuos, suaves e breves.
- 4. Os estertores inspiratórios finos tardios que persistem entre uma respiração e a outra sugerem tecido pulmonar anormal.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 14

Sobre o exame físico da criança, é correto afirmar:

- A) O choro não altera a verificação da frequência do pulso.
- B) A temperatura retal média é menor no lactente do que no pré-escolar.
- C) A discromia de Arlequin pode ser atribuída a uma instabilidade vascular temporária.
- D) A pressão arterial sistólica diminui gradualmente até os seis anos de idade.
- E) Frequências respiratórias profundas e lentas são observadas em situações de acidose metabólica.

QUESTÃO 15

Sobre a avaliação do bebê ao nascer, o Apgar, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A pontuação baseia-se em uma escala de 3 pontos (0, 1 ou 2) para cada componente.
- 2. São avaliados no exame três aspectos: frequência cardíaca, esforço respiratório e tônus muscular.
- 3. O esforço respiratório obtém 2 pontos quando a criança apresenta movimentos respiratórios lentos e irregulares.
- 4. A determinação do Apgar pode ser repetida a intervalos de 20 minutos, até que a pontuação fique acima de 7.

Está(ão) correta(s):

- A) as afirmativas 1, 2 e 3, apenas.
- B) as afirmativas 2, 3 e 4, apenas.
- C) as afirmativas 1, apenas.
- D) as afirmativas 3, apenas.
- E) as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 16

A respeito das alterações fisiológicas da gravidez, é correto afirmar:

- A) As paredes vaginais ficam adelgadas e lisas.
- B) O sinal de Hegar aparece no último trimestre da gestação.
- C) Ao final da gravidez, a capacidade uterina é de aproximadamente 20 litros.
- D) O sinal de Chadwick surge após a concepção e se mantém durante toda a gravidez.
- E) A leucorréia, quando presente após as 3 primeiras semanas de gestação, constitui-se em sintoma que precisa ser tratado rapidamente.

QUESTÃO 17

Sobre o exame da gestante, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A tireóide necessariamente encontra-se diminuída.
- 2. A alopecia é um sintoma sempre presente.
- 3. A hipertrofia gengival com sangramento é comum na gravidez.
- 4. A hipotensão de decúbito é uma forma grave da diminuição circulação e a mulher pode apresentar tonturas e síncope, em especial quando em decúbito dorsal.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1 e 4, apenas.

QUESTÃO 18

Sobre os principais distúrbios hidreletrolíticos é correto afirmar:

- A) A hipervolemia é caracterizada por perda aguda de peso, PVC baixa, câmbros musculares, pulso rápido e fraco.
- B) Na hipovolemia ocorre elevação da temperatura corporal, alucinações, letargia, inquietação, irritabilidade e convulsões focais.
- C) A hipercalemia é caracterizada por assistolia ou fibrilação ventricular e diminuição da pressão arterial.
- D) Na hipernatremia observa-se bradicardia, disritmias, parestesias, câmbros e íleo paralítico.
- E) A hipocalcemia é caracterizada por dormência, formigamento perioral, nos dedos das mãos e dos pés, sinais de Trousseau e Chvostek positivos.

QUESTÃO 19

Sobre as úlceras duodenal e gástrica é correto afirmar:

- A) Enquanto a incidência da úlcera gástrica situa-se entre os 30 e 60 anos, a úlcera duodenal ocorre acima dos 50 anos.
- B) Na úlcera duodenal a dor surge de 2 a 3 h após a refeição e é incomum o vômito, enquanto na gástrica a dor aparece entre meia e uma hora após a refeição, sendo aliviada pelo vômito.
- C) Na úlcera duodenal a ingesta alimentar algumas vezes aumenta a dor, ao passo que na gástrica, a ingesta alimentar alivia a dor.
- D) Na úlcera duodenal há menor probabilidade de perfuração do que na úlcera gástrica.
- E) Grupo sanguíneo "O", DPOC, cirrose, insuficiência renal crônica, são fatores de risco da úlcera gástrica.

QUESTÃO 20

Sobre a gastrite aguda, é **correto** afirmar:

- A) O agente etiológico é sempre um microorganismo associado a baixo nível de imunidade.
- B) A mucosa só regenera após tratamento medicamentoso adequado, juntamente com dieta livre de frituras e condimentos.
- C) A mucosa torna-se edemaciada e hiperemiada e sofre erosão superficial, secretando muito pouco ácido e muito muco.
- D) É sempre a causa de uma infecção sistêmica grave.
- E) Quando causada por ingestão de ácidos ou álcalis fortes, podem chegar à perfuração, resultando em obstrução do cárdia.

QUESTÃO 21

A respeito da administração de soluções por via endovenosa, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A solução de glicose a 5% fornece em torno de 2.000 kcal e é uma fonte muito importante de calorías para as necessidades diárias do corpo.
- 2. O soro fisiológico a 0,9% tem sua osmolalidade totalmente constituída por eletrólitos, por isso permanece no espaço intracelular.
- 3. As soluções hipotônicas têm como objetivo restabelecer o líquido celular e oferecer água livre para excreção das escórias.
- 4. Soluções concentradas como a glicose a 50%, devem ser administradas através de veias centrais para serem diluídas pelo rápido fluxo sanguíneo.
- 5. As soluções hipertônicas exercem uma pressão osmótica maior que aquela do líquido extracelular.

Estão **corretas**, as afirmativas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 5, apenas.
- D) 3, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2 e 5, apenas.

QUESTÃO 22

Foi prescrito uma ampola de Aminofilina (10 ml / 240mg), diluída em 150 ml de Soro Fisiológico a 0,9%. Após a diluição, cada ml da solução resultante contém:

- A) 1,5 mg / ml.
- B) 2,5 mg / ml.
- C) 2,75 mg / ml.
- D) 3,25 mg / ml.
- E) 3,50 mg / ml.

QUESTÃO 23

Para a administração de Cloranfenicol xarope em frascos de 100 ml (150 mg / 5 ml), cada ml do xarope contém:

- A) 15 mg.
- B) 25 mg.
- C) 30 mg.
- D) 35 mg.
- E) 40 mg.

QUESTÃO 24

Sobre o choque, é **correto** afirmar:

- A) No choque neurogênico ocorre vasoconstricção decorrente da perda do tônus simpático.
- B) O choque neurogênico espinal caracteriza-se por uma pele seca e quente, no lugar de fria e úmida.
- C) No choque séptico, a resposta imune do paciente provoca a diminuição da permeabilidade capilar, desencadeando a retenção de líquidos nos capilares.
- D) O tratamento do choque séptico inclui administração de heparina, uso de meias elásticas compressivas e compressão pneumática das pernas para evitar a formação de trombos.
- E) No choque cardiogênico, a frequência cardíaca e o volume sistólico diminuem e a PA pode se elevar ou baixar.

QUESTÃO 25

A respeito das mudanças cognitivas que ocorrem no envelhecimento, é **correto** afirmar:

- A) O delírio se caracteriza por deterioração da função cognitiva.
- B) O início do quadro de demência é agudo ou subagudo, dependendo da etiologia.
- C) No delírio, o pensamento é desorganizado, distorcido, fragmentado, lento ou acelerado.
- D) Na depressão, a percepção é distorcida, observam-se ilusões e alucinações.
- E) O indivíduo com delírio apresenta dificuldade de abstração, o raciocínio é empobrecido e o julgamento comprometido.

QUESTÃO 26

Sobre as alterações fisiológicas normais do envelhecimento, é **correto** afirmar:

- A) No sistema gastrointestinal observa-se aumento da secreção salivar, menor peristalse e produção de enzimas digestivas.
- B) Ocorre distensão dos espaços intervertebrais e menor amplitude do movimento articular
- C) Observa-se diminuição dos pelos nasais e da capacidade olfativa.
- D) Verifica-se hipertrofia das papilas das bordas laterais da língua e diminuição da acuidade visual.
- E) Ocorre perda subsequente de proteínas do rim e aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax.

QUESTÃO 27

Ao exercer a profissão, o Enfermeiro precisa saber que:

- A) a agressão física é qualquer contato não intencional sem consentimento.
- B) as cópias do prontuário só podem ser disponibilizadas e divulgadas para fins científicos.
- C) aos estudantes de Graduação em Enfermagem, aplica-se o Código de Ética de Enfermagem vigente.
- D) deve atender ao princípio da não-maleficência, implementando prescrições menos danosas ao cliente.
- E) negligência e imperícia são delitos dolosos antagônicos.

QUESTÃO 28

Sobre a necessidade de sono e repouso, é correto afirmar:

- A) A consolidação da memória e a restauração psicológica podem ocorrer no final do sono NREM.
- B) Os ritmos circadianos não sofrem influência da luz, temperatura e clima.
- C) A vigília resulta, da liberação da serotonina pela região sincronizadora bulbar.
- D) O sono pode ser produzido pela liberação das catecolaminas, como a norepinefrina.
- E) Para cada estágio de sono NREM (sono de movimentos oculares lentos) ocorrem quatro períodos de sono REM (sono de movimentos oculares rápidos).

QUESTÃO 29

A respeito do preparo para a cirurgia, analise as afirmativas abaixo:

1. O exercício da respiração diafragmática melhora a expansão pulmonar e a liberação de oxigênio, porém faz com que o paciente desperdice muita energia.
2. A contração dos músculos da perna promove o retorno venoso, dificultando a formação de coágulos.
3. É necessário explicar cada exercício, entretanto a demonstração e devolução da técnica não são essenciais, independente do nível cognitivo do paciente.
4. O uso do dispositivo de pressão expiratória positiva e prendedor nasal estão restritos às cirurgias cardíacas.

Está(ão) correta(s):

- A) as afirmativas 1 e 2, apenas.
- B) as afirmativas 2 e 3, apenas.
- C) as afirmativas 3 e 4, apenas.
- D) as afirmativas 1 e 3, apenas.
- E) a afirmativa 2, apenas.

QUESTÃO 30

A respeito da aplicação de insulina é correto afirmar:

- A) A absorção ocorre rapidamente, pois é utilizada a via subcutânea.
- B) A insulina regular é uma solução clara que age rapidamente e pode ser administrada por via S.C. ou I.V.
- C) As insulinas semilenta, lenta e ultralenta não são miscíveis entre si.
- D) O portador de diabetes toma apenas um tipo de insulina.
- E) Cada tipo de insulina possui início e pico diferentes, entretanto a duração da ação é igual para todas.