





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP  
DIVISÃO TÉCNICA DE CONCURSO E INGRESSO – CRH.1



EDITAL Nº 01/2016

ANALISTA DE SAÚDE - MÉDICO  
PEDIATRIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....  
DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VERSÃO A**

# RASCUNHO

1) Considerando o relatório final da 8ª conferência Nacional de Saúde, no que diz respeito aos princípios referentes às condições de acesso e qualidade, assinale a alternativa que **não** expressa o que diz o texto do referido relatório:

- a) Direito a acompanhante ao doente internado, especialmente os idosos.
- b) Equidade em relação ao acesso.
- c) Universalização em relação à cobertura populacional.
- d) Direito à assistência psicológica.
- e) Atendimento oportuno segundo as necessidades.

2) Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - II. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
  - III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, integralidade, gratuidade e controle social.
- a) Apenas III é correta.
  - b) Apenas II e III são corretas.
  - c) Apenas I e II são corretas.
  - d) I, II e III são incorretas.
  - e) I, II e III são corretas.

3) Sobre a lei 8080/90, é **incorreto** afirmar:

- a) Expressou a participação da comunidade como um princípio do SUS.
- b) Não faz menção à humanização do atendimento.
- c) Expressou a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, como um princípio do SUS.
- d) Expressou a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, como um princípio do SUS.
- e) Expressou a Saúde da Família, como estratégia fundamental de reorganização da Atenção Básica.

4) Considerando a lei 8142/90, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente pelo Conselho de Saúde.
  - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e não deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
  - III. O Sistema Único de Saúde - SUS de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e o Consórcio de Saúde.
- a) Apenas III é correta.
  - b) Apenas II e III são corretas.
  - c) Apenas I e II são corretas.
  - d) I, II e III são incorretas.
  - e) I, II e III são corretas.

5) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, **EXCETO**:

- a) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades.
- b) Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação com as gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da atenção básica.
- c) Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica.
- d) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica.
- e) Estimular a participação popular e o controle social.

6) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Essa proibição deixa de existir, nas seguintes situações, **EXCETO**:

- a) Autorização expressa do paciente.
- b) Quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente.
- c) Informação às seguradoras sobre as circunstâncias da morte de paciente seu, além daquelas contidas no próprio atestado de óbito, quando há expressa autorização do responsável legal ou sucessor.
- d) Informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- e) Quando o segredo se refere a menor de idade e é revelado aos pais.

7) Paciente deu entrada à unidade de emergência com queixa típica de angina e sudorese. Fez ECG que confirmou infarto de parede inferior. Iniciou-se medicação específica, porém faleceu cerca de 1 hora após ser atendido e antes de ser internado, após apresentar queda de pressão intensa e não revertida. Neste caso, o atestado de óbito:

- a) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica choque cardiogênico.
- b) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica infarto agudo do miocárdio.
- c) Deve ser emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em decorrência do reduzido tempo de permanência no hospital.
- d) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica parada cardiorrespiratória.
- e) Deve ser emitido preferencialmente pelo SVO e, na ausência deste na localidade, pelo médico que constatou o óbito.

8) Segundo a lista nacional **não** é uma doença ou agravo de notificação compulsória.

- a) Violência doméstica.
- b) Hepatite por vírus A.
- c) Brucelose humana.
- d) Intoxicação por agrotóxico.
- e) Febre purpúrica brasileira.

- 9) Sobre os indicadores de saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.
- O coeficiente geral de mortalidade não é muito utilizado para comparar o nível de saúde de diferentes populações, pois não leva em consideração a estrutura etária dessas populações.
  - No cálculo do coeficiente de mortalidade materna entram, portanto, todos os casos de óbitos maternos, tanto por causas obstétricas diretas, como indiretas, que ocorreram em até 42 dias após o término da gestação.
  - Para compararmos o risco de ocorrência de doenças entre populações usamos, o coeficiente de prevalência.
- Apenas III é correta.
  - Apenas II e III são corretas.
  - Apenas I e II são corretas.
  - I, II e III são incorretas.
  - I, II e III são corretas.

10) Entre as diretrizes para a gestão do SUS, estabelecidas no Pacto de Gestão (2006), não se inclui:

- Regulação.
- Planejamento.
- Regionalização.
- Humanização.
- Gestão do Trabalho.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale abaixo a alternativa correta.

Todos os recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV devem receber profilaxia com antirretroviral (ARV). A quimioprofilaxia com Zidovudina (AZT) deverá ser administrada, de preferência, imediatamente após o nascimento. Não há estudos que comprovem benefício do início da quimioprofilaxia após:

- 4 horas do nascimento.
- 6 horas do nascimento.
- 12 horas do nascimento.
- 24 horas do nascimento.
- 48 horas do nascimento.

12) Assinale abaixo a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

*The Golden Minute* ou "Minuto de Ouro" corresponde ao primeiro minuto após o nascimento, quando o recém-nascido deve estar respirando bem ou ser ventilado com balão e máscara. Após a avaliação do recém-nascido, há necessidade de ventilação com pressão positiva se com \_\_\_\_\_ de vida, a frequência cardíaca estiver menor do que \_\_\_\_\_ ou a respiração estiver superficial, irregular ou ausente.

- 30 segundos; 100 bpm (batimentos por minuto).
- 30 segundos; 120 bpm (batimentos por minuto).
- 60 segundos; 100 bpm (batimentos por minuto).
- 60 segundos; 110 bpm (batimentos por minuto).
- 60 segundos; 120 bpm (batimentos por minuto).

13) Assinale abaixo a alternativa correta.

Historicamente, diversos calendários de vacinação foram propostos em função de diferentes situações, tais como: situação epidemiológica, mudanças nas indicações das vacinas ou incorporação de novas vacinas. De acordo com a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, para a Vacina Hepatite A, a partir do ano de 2016 passará a ser adotado o esquema vacinal de dose única aos:

- 3 meses de idade.
- 6 meses de idade.
- 9 meses de idade.
- 12 meses de idade.
- 15 meses de idade.

14) Assinale abaixo a alternativa correta.

Adolescente de 11 anos de idade, sexo masculino, é atendido em Unidade Básica de Saúde com história de dor na região do calcanhar há mais ou menos 3 meses, que geralmente ocorre após atividades físicas, muitas vezes acompanhada de claudicação intermitente. No exame físico observa-se dor intensa à palpação do calcanhar, sem edema ou limitação de movimento do tornozelo. O diagnóstico mais provável é de:

- Dor de crescimento.
- Fibromialgia Juvenil.
- Doença de Osgood-Schlatter.
- Doença de Sever.
- Doença de Legg-Calvé-Perthes.

15) De acordo com a maioria dos autores, para o diagnóstico clínico de dermatite atópica, deve haver prurido ou referência do mesmo nos últimos 12 meses, associado a pelo menos três dos seguintes critérios listados abaixo, EXCETO:

- Pele seca ou história de xerose no último ano.
- História pessoal de rinite ou asma ou história familiar de rinite, asma ou dermatite nos menores de 4 anos.
- Idade de início precoce, em geral antes do segundo ano de vida.
- Prega Infrapalpebral dupla ou prega de Denie-Morgan.
- Presença de eczema com envolvimento das pregas cubital e poplíteia e região anterior dos tornozelos, e nos menores de 4 anos na região malar e frontal e face extensora de membros.

16) Leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- Deve ser considerado caso suspeito de dengue toda criança proveniente ou residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 dias, e sem foco de infecção aparente.
- É considerado caso suspeito de dengue com sinais de alarme todo caso que, no período de defervescência da febre, apresenta dois ou mais dos seguintes sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; sinal clínico de acúmulo de fluido; sangramento de mucosa; letargia ou irritabilidade; hipotensão postural; hepatomegalia; aumento progressivo do hematócrito.
- Em crianças, a prova do laço é considerada positiva se houver o surgimento de qualquer número de petéquias, com atenção para o surgimento de possíveis petéquias em todo o antebraço, dorso das mãos e nos dedos.
- Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo, preconizado para adultos e crianças, ela pode ser interrompida. A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesas e durante o choque.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I e II apenas.
- II e III apenas.
- I e IV, apenas.
- I, III e IV, apenas.
- II, III e IV, apenas.

17) Assinale abaixo a alternativa correta.

A suspeita de possível imunodeficiência Primária pelo pediatra é essencial para que a criança seja rapidamente encaminhada para centros especializados no diagnóstico e tratamento destas doenças. A dificuldade de cicatrização e retardo da queda do coto umbilical (acima de 30 dias) são importantes sinais de alerta para:

- Deficiências da imunidade celular (células T).
- Deficiências envolvendo células fagocitárias (especialmente polimorfonucleares).
- Deficiências dos componentes terminais do sistema complemento.
- Deficiências predominantemente de anticorpos.
- Deficiência seletiva de IgA (Imunoglobulina A).

18) Assinale abaixo a alternativa correta.

Em crianças, a presença de sopro sistólico em ejeção em borda esternal esquerda associada ao desdobramento fixo da segunda bulha são sugestivos para o diagnóstico de:

- a) Comunicação interatrial.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Defeito do septo atrioventricular.
- d) Anomalia de Ebstein.
- e) Sopros de Still.

19) Assinale abaixo a alternativa correta.

No aleitamento materno, o médico deve avaliar e, se necessário, ensinar à puérpera a técnica correta de amamentação e deverá fazer a correção desta técnica se durante a avaliação da amamentação observar que:

- a) A mãe sustenta todo o corpo da criança e não apenas pescoço e ombros.
- b) O corpo da criança está alinhado com o da mãe.
- c) O queixo da criança toca o seio.
- d) A aréola está mais visível abaixo da boca que acima.
- e) O lábio inferior está voltado para fora.

20) Assinale abaixo a alternativa correta.

Em algumas situações especiais, que podem estar ligadas à mãe ou à criança, a amamentação não deve ocorrer. Uma das contraindicações ao aleitamento materno é:

- a) Recém nascido com lábio leporino bilateral.
- b) Recém nascido com fenda palatina.
- c) Recém nascido com diagnóstico de galactosemia.
- d) Mães portadoras de citomegalovírus antes do parto.
- e) Toxoplasmose materna.

21) Assinale abaixo a alternativa correta.

Além da ação para o bom funcionamento do intestino, admite-se que o uso de fibras em quantidades adequadas na dieta poderia diminuir o risco, na idade adulta, de doenças crônicas, tais como alguns tipos de câncer, doença cardiovascular e diabetes tipo 2. De acordo com as recomendações atuais, uma criança de 3 anos de idade deveria ingerir ao dia:

- a) 8 gramas de fibra.
- b) 15 gramas de fibra.
- c) 18 gramas de fibra.
- d) 25 gramas de fibra.
- e) 30 gramas de fibra.

22) Para o tratamento medicamentoso da constipação intestinal, em crianças, a escolha do laxativo depende de algumas situações, entre elas, o poder aquisitivo da família. Com relação ao uso de laxativos, assinale abaixo a alternativa **INCORRETA**:

- a) O sorbitol encontrado em concentração maior em alguns sucos como de ameixa preta, pera e maçã, aumenta a frequência e o conteúdo de água nas fezes e é especialmente recomendado para lactentes.
- b) Para os lactentes e crianças menores, a dose de óleo mineral é de 1 mL/Kg/dia (mililitro por quilograma de peso corporal por dia).
- c) Os estimulantes químicos derivados do polifenol (fenolfaleína e o bisacodil) são contraindicados em crianças.
- d) A lactulose é uma opção terapêutica, mas é contraindicada em crianças com galactosemia.
- e) O hidróxido de magnésio pode se tornar mais palatável se misturado ao leite de vaca, ao suco de limão ou ao chocolate em pó.

23) Assinale abaixo a alternativa **correta**.

A diarreia persistente acomete principalmente lactentes no primeiro ano de vida, levando a distúrbios hidroeletrólíticos e ao comprometimento do estado nutricional. A diarreia persistente (diarreia pós-enterite) conceitua-se como um episódio de diarreia aguda que se prolonga por mais de:

- a) 7 dias.
- b) 14 dias.
- c) 21 dias.
- d) 30 dias.
- e) 60 dias.

24) Assinale abaixo a alternativa que completa **correta e respectivamente as lacunas**.

A otite média aguda recorrente (OMAR) é definida por \_\_\_\_\_ episódios de otite média aguda (OMA) em \_\_\_\_\_ meses, ou \_\_\_\_\_ episódios em \_\_\_\_\_.

- a) Dois; seis; três; um ano.
- b) Dois; seis; três; dois anos.
- c) Três; seis; quatro; um ano.
- d) Três; doze; quatro; dois anos.
- e) Três; seis; quatro; dois anos.

25) Leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa **correta**.

I. As bactérias mais comumente isoladas dos seios maxilares, em pacientes com rinosinusite aguda, são *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus aureus*.

II. Febre e secreção purulenta nas fossas nasais podem acontecer nas rinosinusites agudas virais, não indicando inicialmente a prescrição de antibióticos.

III. Na presença de sinais e sintomas de resfriado que persistem por mais de 10 dias com qualquer tipo de rinorreia e tosse que piora à noite deve-se suspeitar de rinosinusite aguda bacteriana.

IV. O uso da radiografia simples é considerado inadequado na abordagem diagnóstica da rinosinusite aguda na infância.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

26) Assinale abaixo a alternativa **correta**.

Após certificar-se que o diagnóstico e o tratamento das faringoamigdalites recorrentes foram adequados, devem ser encaminhados para avaliação da possibilidade de tonsilectomia os pacientes com as seguintes manifestações:

- a) Faringotonsilites recorrentes, três a quatro vezes durante seis meses ou quatro a seis vezes em um ano ou duas vezes no ano em dois anos consecutivos.
- b) Faringotonsilites recorrentes, três a quatro vezes durante um ano ou duas a três vezes por ano em dois anos consecutivos ou duas vezes no ano em três anos consecutivos.
- c) Faringotonsilites recorrentes, quatro a seis vezes durante um ano ou três vezes por ano em dois anos consecutivos ou duas vezes no ano em três anos consecutivos.
- d) Faringotonsilites recorrentes, quatro a seis vezes durante um ano ou quatro vezes por ano em dois anos consecutivos ou duas vezes no ano em três anos consecutivos.
- e) Faringotonsilites recorrentes, cinco a sete vezes durante um ano ou quatro vezes por ano em dois anos consecutivos ou três vezes no ano em três anos consecutivos.

27) Assinale abaixo a alternativa correta.

A taquipneia é o sinal isolado mais sensível para o diagnóstico de pneumonia em crianças menores de cinco anos de idade. O valor de referência para se considerar taquipneia na faixa etária de 13 meses a 5 anos é de:

- a) Frequência respiratória maior ou igual a 20 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- b) Frequência respiratória maior ou igual a 30 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- c) Frequência respiratória maior ou igual a 40 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- d) Frequência respiratória maior ou igual a 50 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- e) Frequência respiratória maior ou igual a 60 irpm (incursões respiratórias por minuto).

28) A imunização passiva, com o uso do anticorpo monoclonal, tem-se mostrado eficaz na prevenção de doenças graves pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a profilaxia passiva é altamente recomendada nas seguintes situações descritas abaixo, EXCETO:

- a) Crianças menores de dois anos de idade, com Doença Pulmonar Crônica, que necessitem de tratamento nos seis meses anteriores ao início do período de sazonalidade.
- b) Prematuros com IG < 28 semanas (Idade Gestacional menor que 28 semanas), sem Doença Pulmonar Crônica, estando a menos de 12 meses do início do período sazonal do Vírus Sincicial Respiratório.
- c) Prematuros nascidos com idade gestacional entre 29 e 32 semanas, sem Doença Pulmonar Crônica, que frequentam ambiente de creche.
- d) Crianças menores de dois anos de idade, com cardiopatia congênita cianótica.
- e) Crianças menores de dois anos de idade, com cardiopatias com hipertensão pulmonar grave ou em tratamento para Insuficiência Cardíaca Congestiva.

29) Assinale abaixo a alternativa correta.

De acordo com a Classificação da Gravidade da Asma, idealmente realizada em pacientes não submetidos à corticoterapia inalatória, a criança maior de 3 anos de idade que apresenta sintomas diários, mas não contínuos, com sintomas noturnos (sem despertar noturno regular) em mais de uma vez por semana, que apresenta crises frequentes necessitando de broncodilatador de alívio mais de duas vezes por semana e menos de duas vezes por dia, que apresenta Pico de Fluxo Expiratório (PFE) pré-broncodilatador entre 60% a 80% e Espirometria com Distúrbio Ventilatório Obstrutivo (DVO) leve deve ser inicialmente classificada portadora de:

- a) Asma intermitente moderada.
- b) Asma Intermitente grave.
- c) Asma persistente leve.
- d) Asma persistente moderada.
- e) Asma persistente grave.

30) Assinale abaixo a alternativa correta.

O teste tuberculínico é de grande ajuda no diagnóstico da tuberculose da criança. Geralmente, a maioria das crianças com tuberculose pulmonar tem o teste tuberculínico reator acima de:

- a) 3 milímetros.
- b) 5 milímetros.
- c) 8 milímetros.
- d) 10 milímetros.
- e) 15 milímetros.

31) Assinale abaixo a alternativa correta.

O exantema com áreas extensas de vermelhidão difusa, sem solução de continuidade, poupando a região perioral, no qual a hipertrofia de folículos pilosos confere aspecto de relevo e que, ao tato, se tem a sensação de lixa deve ser descrito como:

- a) Exantema maculopapular.
- b) Exantema morbiliforme.
- c) Exantema escarlatiniforme.
- d) Exantema rubeoliforme.
- e) Exantema urticariforme.

32) A investigação por imagens do trato urinário justifica-se pela frequente associação de Infecção do Trato Urinário (ITU) a anomalias do trato urinário. Com relação à avaliação morfofuncional do trato urinário, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. A uretrocistografia miccional (UCM) deve ser realizada somente após o término do tratamento erradicador da ITU, para se evitar disseminação da infecção e com a criança em uso de antibioticoprofilaxia para reduzir os riscos de ITU iatrogênica.
- II. A Urografia Excretora (UE) deve ser evitada na insuficiência renal crônica, nos pacientes com alergia aos contrastes iodados e nos recém-nascidos e lactentes muito jovens.
- III. A cintilografia miccional estática, que emprega o ácido dimercaptosuccínico (DMSA), apresenta sensibilidade de 98% e especificidade de 100% no diagnóstico de cicatrizes renais.
- IV. A cintilografia renal dinâmica, que emprega o ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA) está indicada nos casos de ITU associada à hidronefrose e não tem indicação no estudo do Refluxo Vesico Ureteral (RVU).

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

33) Em relação às alterações laboratoriais encontradas em escolares com diagnóstico de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica está correto afirmar que:

- a) As hemácias dismórficas e os cilindros hemáticos caracterizam a origem glomerular da hematúria.
- b) O achado de cilindros largos no exame de urina sugere o diagnóstico de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
- c) A presença de leucocitúria e de cilindros leucocitários no exame de urina sugere infecção bacteriana do trato urinário.
- d) A concentração urinária de sódio atinge valores extremamente elevados.
- e) Os níveis séricos de creatinina estão proporcionalmente mais elevados que os níveis de ureia.

34) Assinale abaixo a alternativa correta.

Para o diagnóstico de hipertensão arterial em crianças e adolescentes considera-se a média de pelo menos três medidas da pressão arterial em situações distintas, sendo a hipertensão definida quando a:

- a) Média das pressões sistólicas e diastólica forem iguais ou superiores ao percentil 90 para sexo, estatura e idade.
- b) Média das pressões sistólicas e diastólica forem iguais ou superiores ao percentil 95 para sexo, IMC (Índice de Massa corpórea) e idade.
- c) Média das pressões sistólicas e/ou diastólica forem iguais ou superiores ao percentil 95 para sexo, estatura e idade.
- d) Média das pressões sistólicas e/ou diastólica forem iguais ou superiores ao percentil 99 para sexo, estatura e idade.
- e) Média das pressões sistólicas e/ou diastólica forem iguais ou superiores ao percentil 99 para sexo, IMC (Índice de Massa corpórea) e idade.



35) Assinale abaixo a alternativa correta.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para o intervalo etário de zero a quatro anos e 11 meses de idade são consideradas anêmicas as crianças com hemoglobina inferior a:

- a) 10 g/dL (gramas por decilitro).
- b) 10,5 g/dL (gramas por decilitro).
- c) 11 g/dL (gramas por decilitro).
- d) 11,5 g/dL (gramas por decilitro).
- e) 12 g/dL (gramas por decilitro).

36) Assinale abaixo a alternativa correta.

A fimose é um evento fisiológico que acomete 90% dos recém-nascidos homens. Por volta dos três aos quatro anos de idade, a fimose irá resolver espontaneamente em:

- a) 33,3% dos casos.
- b) 50% dos casos.
- c) 66,6% dos casos.
- d) 75% dos casos.
- e) 90% dos casos.

37) Assinale abaixo a alternativa correta.

A prevenção de acidentes na faixa etária pediátrica constitui a única medida realmente eficaz para se evitarem o sofrimento, as sequelas e o óbito. O principal agente de queimaduras graves e extensas, em todas as faixas etárias é o:

- a) Álcool líquido comercializado para uso domiciliar.
- b) Uso de velas dentro de casa.
- c) Uso de lamparinas perto das camas e/ou cortinas.
- d) Banho de bacia em água quente.
- e) Uso do fogão com a presença da criança na cozinha.

38) Assinale abaixo a alternativa correta.

Nos meninos, o quadro de puberdade precoce é classicamente caracterizado como o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, dependentes ou não da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas antes dos:

- a) 9 anos de idade.
- b) 10 anos de idade.
- c) 10,5 anos de idade.
- d) 11 anos de idade.
- e) 12 anos de idade.

39) As crianças admitidas em crise convulsiva devem ser adequadamente abordadas com o objetivo de se prevenir possíveis sequelas neurológicas e complicações sistêmicas. Em relação ao tratamento da crise aguda está correto afirmar que:

- a) A terapia específica deve ser iniciada após 10 a 15 minutos de atividade epiléptica contínua.
- b) Deve-se oferecer oxigênio por cateter nasal a 15 L/min. (litros por minuto).
- c) A crise poderá ser interrompida com a utilização de diazepam intravenoso, na dose de 1 mg/Kg (miligrama por quilograma de peso corporal), lentamente.
- d) O midazolam pode ser empregado na dose de 0,2 a 0,3 mg/Kg/dose por via intravenosa ou intraóssea.
- e) Se a crise não cessar, pode-se repetir mais uma dose de benzodiazepínico e, na sequência, utilizar difenilhidantoína na dose de 30 a 50 mg/Kg/dose, intravenoso rápido.

40) Assinale abaixo a alternativa correta.

Na criança que apresenta dermatite seborreica extensa, de difícil tratamento, associada com diarreia e imunodeficiências, principalmente deficiência de complemento, deve-se pensar no diagnóstico de:

- a) Dermatite atópica-seborreica.
- b) Doença de Leiner.
- c) Síndrome de Stevens-Johnson.
- d) Síndrome de Lyell.
- e) Eritema polimorfo.

41) Leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. A ambliopia é tanto mais grave quanto mais cedo começar e quanto mais tarde for tratada.
- II. A ambliopia é muito mais frequente com o estrabismo divergente do que com outros desvios oculares.
- III. Além do estrabismo, outra causa muito comum de ambliopia é a diferença de grau entre os dois olhos (anisometropia).
- IV. O tratamento da ambliopia, de qualquer natureza, é a oclusão (tampão) do olho normal, para forçar o uso do olho com visão deficiente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I, III e IV, apenas.

42) Assinale abaixo a alternativa correta.

A púrpura de Henoch-Schönlein (púrpura anafilatoide) é um distúrbio de origem imunoalérgica caracterizado por púrpura não trombocitopênica, podendo apresentar também comprometimento articular, gastrointestinal e renal. O tratamento consiste em terapia de suporte, repouso e observação rigorosa, além do uso de:

- a) Anti-histamínicos.
- b) Analgésicos.
- c) Analgésicos e salicilatos.
- d) Anti-histamínicos e corticosteroides.
- e) Corticosteroides e salicilatos.

43) Assinale abaixo a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Para as crianças sem fatores de risco ou de baixo risco ao nascimento, o Ministério da Saúde propõe, além do atendimento na primeira semana de vida, pelo menos \_\_\_\_\_ atendimentos de rotina no primeiro ano. No segundo ano devem ser realizados pelo menos \_\_\_\_\_ consultas e atendimentos \_\_\_\_\_ a partir dos três anos de idade.

- a) Seis; duas; anuais.
- b) Seis; três; semestrais.
- c) Nove; três; semestrais.
- d) Nove; quatro; semestrais.
- e) Nove; quatro; anuais.

44) Assinale abaixo a alternativa correta.

Uma situação bastante frequente na prática pediátrica é a necessidade da abordagem de adenomegalias. A constatação de adenopatia supraclavicular esquerda isolada sugere o diagnóstico de:

- a) Doença granulomatosa crônica.
- b) Síndrome linfoproliferativa auto-imune.
- c) Doença de Kawasaki.
- d) Neoplasia intra-abdominal.
- e) Doença maligna primária do mediastino.

**45) Assinale abaixo a alternativa correta.**

**A causa mais frequente de hipotireoidismo adquirido no mundo ocidental, inclusive na faixa etária pediátrica é:**

- a) Deficiência de iodo.
- b) Tireoidite autoimune (Hashimoto).
- c) Tumores hipotálamo-hipofisários.
- d) Drogas antitireoidianas.
- e) Alimentos bociogênicos.

**46) Assinale abaixo a alternativa que completa corretamente a lacuna.**

**É da competência do pediatra estar atento para diagnosticar e orientar os pacientes e familiares na prevenção e no manejo do uso e abuso de substâncias psicoativas. O uso de \_\_\_\_\_ por menores de idade está mais associado à morte do que todas as outras substâncias psicoativas em conjunto.**

- a) Maconha.
- b) Álcool.
- c) Anfetaminas.
- d) Cocaína.
- e) Crack.

**47) Assinale abaixo a alternativa correta.**

**Na abordagem diagnóstica das inúmeras doenças que acometem o fígado é muito importante que suas dimensões sejam cuidadosamente medidas e avaliadas. O aumento súbito do tamanho do fígado é indício precoce de:**

- a) Hepatite viral.
- b) Hepatite autoimune.
- c) Uso de drogas.
- d) Insuficiência cardíaca direita.
- e) Neoplasias primárias.

**48) Assinale abaixo a alternativa correta.**

**Considerando as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) a criança menor de 5 anos de idade que apresentar Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a +1 DP (desvio padrão) até +2 DP (desvio padrão) deve ser classificada como:**

- a) Eutrofia.
- b) Risco de sobrepeso.
- c) Sobrepeso.
- d) Obesidade.
- e) Obesidade grave.

**49) Assinale abaixo a alternativa correta.**

**A hérnia inguinal caracteriza-se por tumoração inguinal ou inguinoescrotal redutível indolor ou levemente dolorosa. A correção cirúrgica da hérnia inguinal deve ser indicada:**

- a) Aos 12 meses de idade.
- b) Aos 2 anos de idade.
- c) Aos 4 anos de idade.
- d) Aos 6 anos de idade.
- e) Logo após o diagnóstico, em qualquer idade.

**50) Assinale abaixo a alternativa correta.**

**De acordo com as mais recentes publicações da Academia Americana de Pediatria, na impossibilidade de expor o lactente ao sol regularmente e quando a dieta se restringir ao leite materno exclusivo, a fórmula não suplementada ou quando o volume de fórmula suplementada ingerido, por dia, não garantir o devido aporte de vitamina, a vitamina D medicamentosa, no primeiro ano de vida, deve ser administrada na dose de:**

- a) 200 UI / dia (unidades internacionais ao dia).
- b) 400 UI / dia (unidades internacionais ao dia).
- c) 600 UI / dia (unidades internacionais ao dia).
- d) 800 UI / dia (unidades internacionais ao dia).
- e) 1000 UI / dia (unidades internacionais ao dia).