



Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RIOSAÚDE
2016

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

NÍVEL SUPERIOR
TARDE

CADERNO DE QUESTÕES

ENFERMEIRO

ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 3 horas, considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém **60 (sessenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Ética do servidor na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60

3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no Cartão-Resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para posterior exame grafológico:

“Não há sucesso sem grandes privações”

O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da prova e na eliminação do Concurso.

4. A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, **fabricada em material incolor e transparente** de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de lápis, lapiseira, corretivo e/ou borracha.
5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado e sem bateria, desde o momento da entrada até a saída do candidato do local de realização das provas.
7. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Somente após decorrida **1 (uma) hora do início da prova**, o candidato, ainda que tenha desistido do Concurso, poderá entregar o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA **devidamente assinado e com a frase transcrita**, e retirar-se do recinto. No entanto, **APENAS** durante os 30 (trinta) minutos finais de prova será permitido ao candidato retirar-se da sala portando o caderno de questões.
9. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
11. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
12. **O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
13. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no *site* <http://concursos.rio.rj.gov.br>.
14. **Ao término da prova e após a entrega do material ao fiscal de sala, todos os candidatos, independente de possuir títulos, deverão dirigir-se até a sala determinada pela coordenação.**

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

O surpreendente “sucesso” dos sobreviventes

Muitos anos após o Holocausto, o governo israelense realizou um extenso levantamento para determinar quantos sobreviventes ainda estavam vivos. O estudo, de 1977, concluiu que entre 834 mil e 960 mil sobreviventes ainda viviam em todo o mundo. O maior número – entre 360 mil e 380 mil – residia em Israel. Entre 140 mil e 160 mil viviam nos Estados Unidos; entre 184 mil e 220 mil estavam espalhados pela antiga União Soviética; e entre 130 mil e 180 mil estavam dispersos pela Europa. Como foi que esses homens e mulheres lidaram com a vida após o genocídio? De acordo com a crença popular, muitos sofriam da chamada Síndrome do Sobrevivente ao Campo de Concentração. Ficaram terrivelmente traumatizados e sofriam de sérios problemas psicológicos, como depressão e ansiedade.

Em 1992, um sociólogo nova-iorquino chamado William Helmreich virou essa crença popular de cabeça para baixo. Professor da Universidade da Cidade de Nova York, Helmreich viajou pelos Estados Unidos de avião e automóvel para estudar 170 sobreviventes. Esperava encontrar homens e mulheres com depressão, ansiedade e medo crônicos. Para sua surpresa, descobriu que a maioria dos sobreviventes se adaptara a suas novas vidas com muito mais sucesso do que jamais se imaginaria. Por exemplo, apesar de não terem educação superior, os sobreviventes saíram-se muito bem financeiramente. Em torno de 34 por cento informaram ganhar mais de 50 mil dólares anualmente. Os fatores-chave, concluiu Helmreich, foram “trabalho duro e determinação, habilidade e inteligência, sorte e uma disposição para correr riscos.” Ele descobriu também que seus casamentos eram mais bem-sucedidos e estáveis. Aproximadamente 83 por cento dos sobreviventes eram casados, comparado a 61 por cento dos judeus americanos de idade similar. Apenas 11 por cento dos sobreviventes eram divorciados, comparado com 18 por cento dos judeus americanos. Em termos de saúde mental e bem-estar emocional, Helmreich descobriu que os sobreviventes faziam menos visitas a psicoterapeutas do que os judeus americanos.

“Para pessoas que sofreram nos campos, apenas ser capaz de levantar e ir trabalhar de manhã já seria um feito significativo”, escreveu ele em seu livro *Against All Odds* (Contra Todas as Probabilidades). “O fato de terem se saído bem nas profissões e atividades que escolheram é ainda mais impressionante. Os valores de perseverança, ambição e otimismo que caracterizavam tantos sobreviventes estavam claramente arraigados neles antes do início da guerra. O que é interessante é quanto esses valores permaneceram parte de sua visão do mundo após o término do conflito.” Helmreich acredita que algumas das características que os ajudaram a sobreviver ao Holocausto – como flexibilidade, coragem e inteligência – podem ter contribuído para seu sucesso posterior. “O fato de terem sobrevivido para contar a história foi, para a maioria, uma questão de sorte”, escreve ele. “O fato de terem sido bem-sucedidos em reconstruir suas vidas em solo americano, não.”

A tese de Helmreich gerou controvérsia e ele foi atacado por diminuir ou descontar o profundo dano psicológico do Holocausto. Mas ele rebate essas críticas, observando que “os sobreviventes estão permanentemente marcados por suas experiências, profundamente. Pesadelos e constante ansiedade são a norma de suas vidas. E é precisamente por isso que sua capacidade de levar vidas

normais – levantar de manhã, trabalhar, criar famílias, tirar férias e assim por diante – faz com que descrevê-los como “bem-sucedidos” seja totalmente justificado”.

Em suas entrevistas individuais e seus levantamentos aleatórios em larga escala de sobreviventes ao Holocausto, Helmreich identificou dez características que justificavam seu sucesso na vida: flexibilidade, assertividade, tenacidade, otimismo, inteligência, capacidade de distanciamento, consciência de grupo, capacidade de assimilar o conhecimento de sua sobrevivência, capacidade de encontrar sentido na vida e coragem. *Todos* os sobreviventes do Holocausto compartilhavam *algumas* dessas qualidades, me conta Helmreich. Apenas *alguns* dos sobreviventes possuíam *todas* elas.

Adaptado de: SHERWOOD, Ben. *Clube dos sobreviventes: Segredos de quem escapou de situações-limite e como eles podem salvar a sua vida*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 160-161.

01. “A tese de Helmreich gerou controvérsia e ele foi atacado por diminuir ou **descontar** o profundo dano psicológico do Holocausto.” Nesta frase, o verbo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:
 - (A) negociar
 - (B) desconsiderar
 - (C) deduzir
 - (D) resgatar
02. Na frase “Como foi que esses homens e mulheres lidaram com a vida após o **genocídio**?”, a palavra em destaque deve ser entendida como:
 - (A) matança entre povos da mesma raça, cidadãos do mesmo país
 - (B) massacre de grande número de pessoas; carnificina
 - (C) extermínio, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso
 - (D) chacina de grandes proporções
03. A pesquisa de Helmreich revelou que os sobreviventes apresentavam as características de assertividade, tenacidade, determinação e perseverança, entre outras. Está corretamente associado o nome da característica ao valor semântico que assume no texto em:
 - (A) tenacidade – mesquinha; avareza; apego aos bens materiais
 - (B) determinação – explicação ou indicação exata; definição
 - (C) perseverança – continuidade, permanência
 - (D) assertividade – segurança, decisão e firmeza nas atitudes e palavras
04. Na frase “Os valores de perseverança, ambição e otimismo que caracterizavam tantos sobreviventes estavam claramente **arraigados** neles antes do início da guerra.”, a palavra em destaque deve ser entendida como:
 - (A) estabelecidos em estadia longa ou permanente
 - (B) gravados na memória e na cultura de forma a ser impossível abandonar ou esquecer
 - (C) empenhados, comprometidos; aplicados, esforçados
 - (D) fortemente apegados às próprias ideias e propósitos

05. A palavra **Holocausto**, nesse contexto, é necessariamente grafada com inicial maiúscula, por se referir a um fato histórico – massacre de judeus e outras minorias efetuado nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra. É também obrigatório o emprego de inicial maiúscula no vocábulo destacado na seguinte frase:
- (A) A prevenção de doenças como dengue e mal de **chagas** é, geralmente, focada no combate ao vetor.
- (B) Sobreviventes de grandes tragédias podem vir a sofrer de síndrome do **pânico**.
- (C) A iniciativa de estudar sobreviventes veio de um sociólogo da **cidade** de Nova York.
- (D) O fim do Holocausto foi anunciado em 27 de **janeiro** de 1945.
06. No segmento “Professor da Universidade da Cidade de Nova York, Helmreich viajou pelos Estados Unidos...”, emprega-se a vírgula para:
- (A) isolar adjunto adverbial
- (B) isolar apostro explicativo
- (C) separar oração reduzida
- (D) separar termos coordenados
07. A expressão destacada exprime o campo ou aspecto da realidade referida em:
- (A) “**Em 1992**, um sociólogo nova-iorquino chamado William Helmreich virou...”
- (B) “**Em torno de 34 por cento** informaram ganhar mais de...”
- (C) “**Em suas entrevistas individuais e seus levantamentos aleatórios em larga escala de sobreviventes ao Holocausto**, Helmreich identificou dez características...”
- (D) “**Em termos de saúde mental e bem-estar emocional**, Helmreich descobriu que os sobreviventes...”
08. De acordo com a norma padrão da língua, está correta a concordância do verbo no segmento “... a maioria dos sobreviventes se adaptara a suas novas vidas com muito mais sucesso...”. É também correta a concordância do verbo na seguinte frase:
- (A) Quantos de nós teriam sobrevivido nas mesmas circunstâncias?
- (B) Quem haveria de ser aqueles refugiados?
- (C) Mais de cem pessoas respondeu afirmativamente à pergunta.
- (D) Os Estados Unidos recebeu muitos judeus após a guerra.
09. São frequentes, no texto, advérbios formados com o emprego do sufixo **-mente**. O valor semântico do advérbio em destaque está corretamente identificado em:
- (A) Por exemplo, apesar de não terem educação superior, os sobreviventes saíram-se muito bem **financeiramente**. – opinião a respeito do fato ocorrido
- (B) Os sobreviventes estão permanentemente marcados por suas experiências, **profundamente**. – delimitação do que é afirmado
- (C) Em torno de 34 por cento informaram ganhar mais de 50 mil dólares **anualmente**. – frequência do fato referido
- (D) Sua capacidade de levar vidas normais faz com que descrevê-los como “bem-sucedidos” seja **totalmente** justificado. – temporalidade do que é descrito

10. Na frase “Para sua surpresa, descobriu que a maioria dos sobreviventes se **adaptara** a suas novas vidas com muito mais sucesso do que jamais se imaginaria.”, o verbo em destaque pode ser substituído, sem alteração do tempo verbal, por:
- (A) tinha adaptado
- (B) houvera adaptado
- (C) adaptava
- (D) adaptaria
11. As palavras **genocídio**, **após** e **Soviética** acentuam-se, respectivamente, pelas mesmas regras que justificam o acento gráfico das palavras na seguinte série:
- (A) estáveis – número – é
- (B) aleatórios – descrevê-los – síndrome
- (C) crônicos – já – características
- (D) história – dólares – também
12. “Em 1992, um sociólogo nova-iorquino chamado William Helmreich virou essa crença popular de cabeça para baixo.” Nesta frase, emprega-se o pronome demonstrativo **essa** com a finalidade de:
- (A) pôr em relevo o substantivo que vem em seguida
- (B) aludir ao que foi anteriormente mencionado
- (C) marcar o tempo passado em relação à pessoa que fala
- (D) referir-se a algo que está próximo do interlocutor
13. Em “... apenas ser capaz de levantar e ir trabalhar de manhã já seria um feito **significativo**”, o adjetivo posposto ao substantivo poderia também precedê-lo sem prejuízo do sentido. O mesmo se observa na seguinte frase:
- (A) Mesmo sem educação **superior**, foram bem-sucedidos.
- (B) Muitos ficaram sofrendo de problemas **psicológicos**.
- (C) Algumas dessas características foram cruciais para seu sucesso **posterior**.
- (D) Por casamento entendemos também a união **estável**.
14. No segmento “Helmreich acredita que algumas das características que os ajudaram a **sobreviver** ao Holocausto...”, o verbo em destaque exige a preposição **a**. O mesmo **NÃO** ocorre com o verbo na seguinte frase:
- (A) O senso comum vinculava a sobrevivência ao genocídio ___ uma tendência à depressão.
- (B) De modo geral, os sobreviventes conseguiram adaptar-se ___ suas novas comunidades.
- (C) Deve-se atribuir o sucesso dos sobreviventes ___ um conjunto de fatores.
- (D) A pesquisa funda-se ___ dados bastante consistentes.
15. Na palavra **sobrevivente**, o prefixo **sobre-** tem valor semântico equivalente ao do prefixo da seguinte palavra:
- (A) **hipoglicemia**
- (B) **ultrassonografia**
- (C) **supersecreção**
- (D) **diálise**

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, resultando em grave prejuízo público, é crime punido com a seguinte pena, além da multa:
- (A) prisão administrativa
(B) detenção
(C) reclusão
(D) prisão domiciliar
17. Dar às verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei é conduta que corresponde ao seguinte tipo penal:
- (A) emprego irregular de verbas ou rendas públicas
(B) exercício funcional ilegalmente prolongado
(C) concussão
(D) corrupção passiva
18. Usar de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio, contra autoridade que é chamada a intervir em processo judicial configura o crime de:
- (A) fraude processual
(B) prevaricação
(C) favorecimento pessoal
(D) coação no curso de processo
19. Celebrar contrato com empresa declarada inidônea é crime punido com a seguinte pena:
- (A) prisão administrativa
(B) detenção
(C) reclusão
(D) prisão domiciliar
20. Doar a pessoa física bens ou valores da administração indireta municipal, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie é considerado por lei ato de improbidade que:
- (A) importa enriquecimento ilícito
(B) atenta contra os princípios da administração pública
(C) causa prejuízo ao erário
(D) fere a moral e os bons costumes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dor torácica que ocorre de forma repentina e contínua, acompanhada de dispneia, náuseas, vômitos, sudorese e palidez, são manifestações clínicas da seguinte doença:
- (A) estenose mitral
(B) infarto agudo do miocárdio
(C) estenose aórtica
(D) endocardite infecciosa

22. Paciente procurou atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), relatando, ao enfermeiro do Acolhimento, presença de dor epigástrica que progride para dor no quadrante inferior direito, acompanhada de febre baixa, náuseas e anorexia. Diante da queixa, o profissional identificou um possível quadro de:
- (A) diverticulite
(B) doença de Crohn
(C) apendicite
(D) colite ulcerativa
23. Ascite, icterícia, fraqueza, perda de peso e febre baixa contínua caracterizam a patologia denominada:
- (A) colelitíase
(B) hepatite viral
(C) colecistite
(D) cirrose hepática
24. A doença de Graves é o tipo mais comum do seguinte distúrbio endócrino:
- (A) hipotireoidismo
(B) diabetes *mellitus*
(C) hipertireoidismo
(D) pancreatite
25. Os distúrbios dos tratos urinários inferior e superior variam desde as infecções facilmente tratadas, até distúrbios com risco de vida que exigem a substituição de órgão ou tratamento a longo prazo com diálise. Dentre as infecções que acometem o trato urinário superior, pode-se citar a:
- (A) pielonefrite
(B) cistite
(C) uretrite
(D) prostatite
26. O acidente vascular cerebral é uma lesão dos neurônios motores superiores e resulta em perda do controle voluntário sobre os movimentos motores. A disfunção motora mais comum, caracterizada pela paralisia de um lado do corpo, é denominada:
- (A) hemiparesia
(B) hemiplegia
(C) epilepsia
(D) ataxia
27. Manchas avermelhadas puntiformes, que surgem na pele em consequência do extravasamento de sangue para dentro da pele, evidenciam a seguinte lesão cutânea:
- (A) equimose
(B) petéquias
(C) eritema
(D) exantema

28. Paciente que apresenta fraqueza muscular e reflexos diminuídos dos membros inferiores, não afetando a função cognitiva e o nível de consciência e com história de doença viral, nas poucas semanas anteriores, sugere quadro do distúrbio neurológico conhecido como:
- (A) miastenia grave
 - (B) neuralgia do trigêmeo
 - (C) paralisia de Bell
 - (D) síndrome de Guillain-Barré
29. Uma condição grave, com risco de vida iminente, caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido no tecido pulmonar e/ou espaço alveolar, evidencia o seguinte distúrbio pulmonar:
- (A) edema pulmonar
 - (B) empiema
 - (C) atelectasia
 - (D) derrame pleural
30. O choque é uma condição em que a pressão arterial sistêmica é inadequada para fornecer oxigênio e nutrientes para sustentar os órgãos vitais e a função celular. O estado de choque que resulta do volume intravascular diminuído, decorrente da perda de líquidos, é denominado:
- (A) circulatório
 - (B) cardiogênico
 - (C) séptico
 - (D) hipovolêmico
31. A alternância de episódios de apneia e períodos de respiração profunda, geralmente, associada à insuficiência cardíaca e ao comprometimento do centro respiratório, caracteriza o seguinte tipo de respiração:
- (A) de Biot
 - (B) Cheyne-Stokes
 - (C) hipoventilação
 - (D) hiperventilação
32. Dentre os distúrbios do fígado, a trombose da veia hepática, que resulta em hipertensão porta não-cirrótica, é conhecida como:
- (A) síndrome de Gilbert
 - (B) doença de Wilson
 - (C) síndrome de Budd-Chiari
 - (D) colangite esclerosante primária
33. A micção excessiva à noite caracteriza um problema associado a alterações da micção denominado:
- (A) nictúria
 - (B) anúria
 - (C) poliúria
 - (D) oligúria

34. Dentre as medidas de prevenção e controle da doença meningocócica, visando prevenir a ocorrência de casos secundários entre os contatos próximos de um caso suspeito, bem como prevenir casos desta doença em crianças menores de 1 ano, a quimioprofilaxia tem sido considerada uma medida eficaz. Nesta importante ação, o antibiótico de escolha preconizado é a:
- (A) doxiciclina
 - (B) rifampicina
 - (C) azitromicina
 - (D) ampicilina
35. De acordo com a Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014, constitui doença de notificação compulsória imediata:
- (A) febre tifoide
 - (B) leishmaniose visceral
 - (C) intoxicação exógena
 - (D) febre maculosa
36. Indivíduo de 25 anos de idade procurou atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), relatando ao enfermeiro do Acolhimento, um quadro de febre, tosse, coriza e exantema maculopapular. Relatou, ainda, viagem recente ao exterior e que não costuma vacinar-se. Diante destas informações, o enfermeiro identificou este indivíduo como um caso suspeito da seguinte doença:
- (A) sarampo
 - (B) rubéola
 - (C) citomegalovírus
 - (D) dengue
37. No diagnóstico laboratorial da hepatite viral do tipo B, o marcador que, quando reagente, indica maior risco de transmissão da doença, é o:
- (A) HBsAg
 - (B) Anti-HBs
 - (C) HBeAg
 - (D) Anti-HBe
38. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, caracterizada por alta infectividade e baixa patogenicidade. A forma desta doença, cujo indivíduo apresenta lesões papulosas ou nodulares, únicas ou em pequeno número, principalmente, na face, é denominada:
- (A) indeterminada
 - (B) dimorfa
 - (C) virchowiana
 - (D) tuberculoide

39. O Ministério da Saúde preconiza a realização de teste para diagnóstico do HIV a todo indivíduo com diagnóstico estabelecido, independentemente, da confirmação bacteriológica, da seguinte doença:
- (A) meningite
(B) sífilis adquirida
(C) tuberculose
(D) condiloma acuminado
40. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano. No **ciclo urbano**, a transmissão ocorre a partir de mosquitos infectados, conhecidos como:
- (A) *Haemagogus janthinomys*
(B) *Anopheles darlingi*
(C) *Aedes aegypti*
(D) *Culex quinquefasciatus*
41. O exame extremamente importante no diagnóstico laboratorial de casos suspeitos de dengue, bem como no desencadeamento das ações de vigilância epidemiológica, preconizadas em relação a esta doença e realizado com a coleta de amostra de soro do paciente, a partir do sexto dia de início dos sintomas, é o(a):
- (A) isolamento viral
(B) imunohistoquímica
(C) sorologia
(D) NS1
42. Paciente procurou atendimento em Policlínica, relatando ao enfermeiro do Acolhimento estar com febre alta de início súbito, cefaleia, mialgia e dor articular intensa. Diante do relato, o enfermeiro concluiu tratar-se de caso suspeito, da seguinte doença:
- (A) zikavírus
(B) febre de Chikungunya
(C) malária
(D) filaríose
43. O diagnóstico laboratorial básico da esquistossomose consiste na realização de exames coprocópicos, utilizando-se, preferencialmente, técnicas quantitativas de sedimentação. Dentre estas técnicas, a mais utilizada na investigação epidemiológica dos casos suspeitos e que possibilita a visualização e contagem dos ovos por grama de fezes, é conhecida como:
- (A) PCR
(B) CIE
(C) Kato-Katz
(D) cultura
44. A síndrome de Weil, caracterizada por icterícia, insuficiência renal e hemorragia (mais comumente pulmonar) é a manifestação clássica dos casos graves relacionados à seguinte doença:
- (A) meningite
(B) hepatite viral C
(C) difteria
(D) leptospirose

45. De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança, a idade máxima, para administração do 2º reforço da vacina DTP, é até:
- (A) 7 meses e 29 dias
(B) 11 meses e 29 dias
(C) 4 anos, 11 meses e 29 dias
(D) 6 anos, 11 meses e 29 dias
46. O local de aplicação do reforço da vacina pneumocócica 10 valente é o:
- (A) vasto lateral direito
(B) vasto lateral esquerdo
(C) deltoide direito
(D) deltoide esquerdo
47. No Calendário de Vacinação da Gestante, o Ministério da Saúde preconiza a seguinte vacina:
- (A) tríplice viral
(B) dTpa tipo adulto
(C) tetraviral
(D) pneumocócica 23 valente
48. Na gestação de alto risco, o quadro clínico caracterizado por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, sendo considerado como agravamento do quadro de pré-eclâmpsia, é conhecido como:
- (A) síndrome de HELLP
(B) síndrome antifosfolípide
(C) doença tromboembólica na gestação
(D) hemoglobinopatia
49. Restrição de crescimento intrauterino, microcefalia e retardo mental estão entre os agravos resultantes do acometimento da gestante, pela seguinte doença:
- (A) sífilis
(B) hepatite viral B
(C) HIV
(D) toxoplasmose
50. Durante a consulta do pré-natal com enfermeira da Clínica da Família, gestante informou que a data de sua última menstruação foi 10/02/2016. De acordo com a Regra de Nägele, a profissional calculou a data provável do parto em:
- (A) 10/11/2016
(B) 17/11/2016
(C) 17/10/2016
(D) 10/10/2016
51. A ausculta dos batimentos cardíofetais deve ser realizada a cada consulta do pré-natal, com o objetivo de constatar a presença, o ritmo, a frequência e a sua normalidade. É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre:
- (A) 60 a 90 batimentos por minuto
(B) 60 a 120 batimentos por minuto
(C) 90 a 160 batimentos por minuto
(D) 120 a 160 batimentos por minuto

52. Na atenção ao pré-natal de baixo risco, o registro dos movimentos fetais, com o objetivo de promover uma avaliação clínica do bem-estar fetal na gravidez, deve ser realizado a partir da seguinte semana gestacional:
- (A) 20^a
 - (B) 24^a
 - (C) 30^a
 - (D) 34^a
53. No tratamento da gestante com sífilis primária, recomenda-se administrar o seguinte medicamento:
- (A) cefalexina
 - (B) penicilina benzatina
 - (C) estreptomicina
 - (D) ciprofloxacina
54. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, não há evidências de que, em gestantes, a administração de vacinas de vírus inativados acarrete qualquer risco para o feto. Assim, em situações de pós-exposição, a gestante pode ser vacinada contra:
- (A) sarampo
 - (B) rubéola
 - (C) raiva humana
 - (D) caxumba
55. As indicações obstétricas de parto cesáreo são classificadas em absolutas e relativas. Constitui indicação absoluta, na seguinte situação:
- (A) prolapso de cordão
 - (B) psicopatia
 - (C) macrossomia fetal
 - (D) feto não reativo em trabalho de parto
56. Dentre as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes identificadas no pré-natal, constitui uma das mais importantes situações hemorrágicas, na segunda metade da gestação:
- (A) abortamento
 - (B) gravidez ectópica
 - (C) descolamento prematuro de placenta
 - (D) mola hidatiforme
57. A presença de sangramento genital de pequena intensidade em gestante, diagnosticado por exame ultrassonográfico, que não representa quadro de risco materno e/ou ovular, cuja evolução em geral é boa, indica uma complicação obstétrica denominada:
- (A) placenta prévia
 - (B) descolamento cório-amniótico
 - (C) oligodrâmnio
 - (D) polidrâmnio

58. Trabalho de parto prematuro constitui situação de risco gestacional, sendo indicado o encaminhamento para centro de referência. Está frequentemente relacionado a infecções urinárias e vaginais, principalmente, a:
- (A) cistite
 - (B) vaginose bacteriana
 - (C) candidíase
 - (D) tricomoníase
59. A gravidez pode induzir hipertensão arterial em mulher, previamente, normotensa ou ainda agravar uma hipertensão preexistente. De acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, o aparecimento de hipertensão e proteinúria (300 mg ou mais de proteína em urina de 24 horas), após 20 semanas de gestação, em gestante previamente normotensa, é classificado como:
- (A) pré-eclâmpsia
 - (B) eclâmpsia
 - (C) hipertensão gestacional
 - (D) hipertensão crônica
60. Os recém-nascidos prematuros, entre 34 e 36 semanas, costumam estar cobertos por material gorduroso e esbranquiçado, cujas funções primordiais são a proteção da pele e o isolamento térmico. Este material, que pode ser retirado após o estabelecimento do controle térmico, é conhecido como:
- (A) lanugo
 - (B) *milium* sebáceo
 - (C) equimose
 - (D) vérnix caseoso