

MÉDICO(A) / CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Conhecimentos Básicos						Conhecimentos Específicos	
Língua Portuguesa II		Informática Básica II		Legislação II		Questões	Pontuação
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação		
1 a 20	1,0 cada	21 a 25	1,0 cada	26 a 30	1,0 cada	31 a 70	1,0 cada
Total: 20,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 40,0 pontos	
Total: 70,0 pontos							

- b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras; portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este **CADERNO DE QUESTÕES** está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

09 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:

- for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **2 (duas) horas** contadas a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

12 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA II

O suor e a lágrima

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o vôo estava

5 atrasado, decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos.

Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, que também pode parecer

10 o trono de um rei desolado de um reino desolante.

O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando

15 posso estou sempre de tênis.

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor,

20 que era abundante.

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.

25 E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados.

30 Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias.

35 Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima.

CONY, C. H. In: NESTROVSKI, A. (Org.). *Figuras do Brasil* – 80 autores em 80 anos de Folha. São Paulo: Publifolha. 2001. p. 319.

1 Com base na leitura integral do texto, constata-se que as palavras “suor” e “lágrima”, presentes no título, estabelecem entre si uma relação de

- (A) contrariedade
- (B) concessão
- (C) alternância
- (D) tempo e condição
- (E) causa e efeito

2 O sentimento de vergonha relatado pelo autor é reforçado pela seguinte passagem:

- (A) “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos.” (l. 5-7)
- (B) “Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre” (l. 8-9)
- (C) “Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis.” (l. 13-15)
- (D) “E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio.” (l. 25-27)
- (E) “Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso.” (l. 30-31)

3 A predominância de orações e períodos coordenados no primeiro parágrafo do texto

- (A) torna a contextualização da narrativa mais dinâmica.
- (B) contribui para a dispersão das imagens apresentadas.
- (C) insere um tom de mistério aos acontecimentos relatados.
- (D) foca a atenção do leitor apenas ao calor que fazia no Rio.
- (E) gera um encadeamento entre cenas que se excluem.

4 O uso dos adjetivos destacados em “rei **desolado** de um reino **desolante**” (l. 10) justifica-se pelo fato de o autor

- (A) demonstrar-se triste pela condição do engraxate.
- (B) sentir-se incomodado pelo forte calor no Rio.
- (C) encontrar-se solitário numa cidade nova.
- (D) entender-se tão oprimido quanto o engraxate.
- (E) revelar-se como alguém sem compaixão.

5 O travessão em “O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio.” (l. 11-12) enfatiza um trecho de caráter

- (A) reflexivo
- (B) irônico
- (C) dúbio
- (D) piedoso
- (E) imparcial

6 Em “fizera um filho do povo suar para ganhar seu **pão**” (l. 36-37), o termo em destaque assume o sentido de

- (A) rumo
- (B) trabalho
- (C) desconto
- (D) imposto
- (E) retribuição

7

Em geral, assinala-se com vírgula o deslocamento de orações de sua ordem padrão, conforme poderia ter sido feito com a oração destacada em “Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque **quando posso** estou sempre de tênis.” (ℓ. 13-15).

No trecho mencionado, a falta das vírgulas busca conferir ao período um tom de

- (A) formalidade
- (B) intransigência
- (C) restrição
- (D) coloquialidade
- (E) artificialidade

8

No trecho “Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, **que** era abundante” (ℓ. 18-20), o pronome destacado faz referência ao termo

- (A) paninho
- (B) brilho
- (C) sapatos
- (D) ele
- (E) suor

9

Ao utilizar, como elemento coesivo, a expressão **valente filho do povo** (ℓ. 25-26), para se referir ao engraxate, o autor assume no texto uma postura

- (A) incoerente
- (B) dispensável
- (C) parcial
- (D) objetiva
- (E) inconsequente

10

O sinal indicativo de crase está empregado conforme a norma-padrão em:

- (A) O engraxate ficou frente à frente com o homem desconhecido.
- (B) O escritor começou à conversar com o engraxate no aeroporto.
- (C) Não se sabe à que proporções chegou a vergonha do escritor.
- (D) À medida que o rapaz engraxava, o escritor sentia mais vergonha.
- (E) O escritor foi exposto à emoções até então desconhecidas para ele.

11

No trecho “Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, **salgado** como lágrima.” (ℓ. 37-39), a palavra destacada

- (A) torna o pensamento do escritor contraditório.
- (B) enfatiza a culpa sentida pelo escritor.
- (C) provoca um efeito de humor ao que é dito.
- (D) desconstrói o sentido do termo “brilho”.
- (E) impessoaliza o enunciado.

12

Uma reescritura possível para o trecho “Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.” (ℓ. 21-24), respeitando-se a norma-padrão e mantendo-se o sentido original, está assinalada em

- (A) Com o mesmo pano executou com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.
- (B) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se (caso contrário, o suor, inundaria o meu cromo italiano).
- (C) Com o mesmo pano, executou, com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas, a todo instante, o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.
- (D) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria, o meu cromo italiano.
- (E) Com o mesmo pano executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se; caso contrário, o suor inundaria o meu cromo, italiano.

13

Em “No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente **deste** verão que inaugura o século e o milênio.” (ℓ. 2-4), o pronome destacado

- (A) torna ambíguo o termo referido.
- (B) marca a temporalidade do enunciado.
- (C) afasta o leitor da narração.
- (D) descentraliza o foco narrativo.
- (E) introduz um caráter irônico ao texto.

14

O pronome em destaque está adequadamente colocado, quanto à norma-padrão, em:

- (A) O rapaz **se** mostrou feliz com o troco generoso.
- (B) Sentirá-**se** feliz aquele que tiver um trabalho digno.
- (C) O engraxate não queixou-**se** do calor.
- (D) Nunca observou-**se** tanta compaixão naquele homem.
- (E) **Se** sentiu envergonhado com a cena o escritor.

15

A palavra em negrito em “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares **avulsos**.” (ℓ. 5-7) pode ser substituída, no texto, sem alteração de sentido por

- (A) distantes
- (B) escondidos
- (C) destacados
- (D) desagradáveis
- (E) exóticos

16

A concordância verbal está plenamente adequada à norma-padrão no seguinte período:

- (A) Fazem 15 anos que o escritor encontrou o engraxate.
- (B) Deve haver muitos engraxates pelos aeroportos do Rio.
- (C) Deseja melhores oportunidades de trabalho os brasileiros.
- (D) Muitos de nós quer viver sob condições melhores.
- (E) Cada um de nós devem ter consciência do seu valor.

17

O período em que se observa concordância nominal adequada à norma-padrão é:

- (A) O sapato e a meia do homem ficaram molhadas de suor.
- (B) É necessário muita concentração no ato de engraxar.
- (C) O engraxate estava com os braços e a cabeça suadas.
- (D) Bastantes são os engraxates que trabalham no aeroporto.
- (E) As emoções do escritor ficaram meias estremecidas.

18

Em “Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, **os Rosseti**.” (l. 12-13), o trecho em destaque cumpre a função de

- (A) especificar o fabricante dos sapatos.
- (B) destacar o nome do dono dos sapatos.
- (C) convocar o produtor de seus calçados.
- (D) assinalar o tipo de solado.
- (E) menosprezar o tipo de calçado.

19

Em “Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41.” (l. 1-2), o uso do pretérito imperfeito do indicativo busca

- (A) estabelecer uma relação de causa e efeito.
- (B) contextualizar o tempo da narrativa.
- (C) introduzir uma ambiência de suspense.
- (D) banalizar o calor que fazia no Rio.
- (E) projetar uma possibilidade.

20

No trecho “No dia seguinte, **os** jornais diriam que fora o mais quente deste verão” (l. 2-3), a palavra destacada contribui para

- (A) especificar o tipo de jornal referido.
- (B) marcar o momento da publicação dos jornais.
- (C) relativizar a função dos jornais.
- (D) impessoalizar os jornais, pois qualquer um daria a notícia.
- (E) tornar ambíguo o sentido do vocábulo “jornais”.

INFORMÁTICA BÁSICA II

Considere uma instalação padrão do sistema Windows 8.1 Single Language (64 bits) em Português para responder às questões de nºs 21 e 22.

21

Após abrir o Painel de Controle, qual item deve ser executado para que se possa, sem ter de navegar por itens ou diálogos intermediários, acionar o diálogo que contém informações sobre o processador em uso, a quantidade de memória principal instalada e sobre a edição do Windows em uso?

- (A) Ferramentas Administrativas
- (B) Gerenciador de Dispositivos
- (C) Personalização
- (D) Programas e Recursos
- (E) Sistema

22

Uma pessoa abriu a pasta c:\usr1\p1 utilizando o Windows Explorer (Explorador de Arquivos), selecionou o arquivo texto.txt, executou o comando Copiar (<Ctrl> + <c>) e, em seguida, executou o comando Colar (<Ctrl> + <v>).

Supondo que não haja nenhuma restrição de acesso ao arquivo texto.txt, o Windows irá

- (A) comparar informações sobre ambos os arquivos.
- (B) exibir uma mensagem de erro, informando que a cópia não pode ser feita por já existir um arquivo com o mesmo nome.
- (C) manter o arquivo original e criar uma cópia com o nome texto (2).txt.
- (D) abrir o diálogo Substituir ou Ignorar Arquivos.
- (E) manter o arquivo original e criar uma cópia com o nome texto - Cópia.txt.

23

Utilizando um computador da universidade, certo usuário deseja realizar uma transação bancária pela internet.

Um procedimento para que esse usuário identifique, apenas visualmente, se o site acessado é um site seguro para este tipo de transação é verificar se

- (A) a URL começa com FTP.
- (B) a URL começa com HTTP.
- (C) a URL começa com HTTPS.
- (D) a URL está com o nome correto da instituição.
- (E) os campos digitáveis de agência e conta possuem o tamanho correto.

24

Um usuário deseja acessar seus e-mails de vários dispositivos diferentes, sem baixar as mensagens para um dispositivo específico.

Qual é o protocolo que permite que isso aconteça?

- (A) HTTP
- (B) SMTP
- (C) POP
- (D) IMAP
- (E) FTP

25

O responsável pela segurança da informação de uma empresa ministrou uma série de palestras sobre as diversas ameaças ao ambiente computacional da empresa, ressaltando pontos importantes a serem observados pelos usuários. Um desses usuários, revendo suas anotações, percebeu que se havia enganado no registro de um procedimento ou o instrutor tinha-se equivocado ao enunciá-lo.

Qual é a suposta recomendação que está equivocada?

- (A) Conexões para pagamento de contas via Internet Banking devem ser finalizadas antes do fechamento do browser utilizado.
- (B) Documentos com informações muito sensíveis sobre os negócios da empresa, criados e editados no Microsoft Word 2010, devem, preferencialmente, ser criptografados antes de arquivados.
- (C) A infecção de um computador por vírus através de abertura de arquivos suspeitos anexados a e-mails é evitada com a instalação prévia de versões atualizadas de antivírus.
- (D) A autoexecução de mídias removíveis deve ser desabilitada.
- (E) O uso da navegação anônima é uma forma de proteção da privacidade quando a internet é acessada em computadores de terceiros.

LEGISLAÇÃO II

26

Um servidor apresentou requerimento com pedido de licença para acompanhar tratamento de seu padrasto, que é portador de doença grave e incapacitante, atestada por laudo médico.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, verifica-se que, nesse caso, a(o)

- (A) remuneração no período da licença será, no máximo, por trinta dias.
- (B) licença poderá ser concedida a cada período de doze meses.
- (C) licença concedida a cada período será remunerada por seis meses.
- (D) licença será deferida apenas se existirem servidores em número suficiente na repartição para o atendimento.
- (E) padrasto não se inclui no conceito de pessoa da família.

27

Um servidor recebe ordens de seu superior hierárquico, de quem discorda frequentemente, por diferença de visão quanto ao planejamento organizacional.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, o descumprimento de ordem superior só **NÃO** acarreta quebra de dever funcional quando a ordem

- (A) se revela manifestamente ilegal.
- (B) confronta ideologia pessoal.
- (C) é relacionada a serviço militar.
- (D) provoca animosidade pessoal.
- (E) for justificada por condições excepcionais.

28

Durante longo período, o servidor público teve direito ao gozo de licença-prêmio após um período de efetivo serviço.

Alguém que tenha ingressado no serviço público após a extinção desse direito, poderá requerer o substitutivo da licença-prêmio, que é o(a)

- (A) salário adicional
- (B) prêmio por assiduidade
- (C) afastamento para missão
- (D) gratificação de ausência
- (E) licença-capacitação

29

Um servidor obteve licença para cursar doutorado na Universidade, pelo período de quatro anos. Após ter concluído o curso com êxito e defendido tese, voltou ao órgão originário.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, após seu retorno, o servidor deverá permanecer no exercício de suas funções por

- (A) seis meses
- (B) um ano
- (C) dois anos
- (D) três anos
- (E) quatro anos

30

Um servidor público, que deseja dedicar-se ao estudo aprofundado do jogo de xadrez, pleiteou horário especial para exercer essa atividade.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, o horário especial poderá ser concedido para o exercício de

- (A) trabalhos extras
- (B) funções especiais
- (C) atividade escolar ao servidor estudante
- (D) qualquer atividade lúdica
- (E) qualquer atividade desportiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Mulher de 30 anos, apresentando nódulos tireoidianos sólidos menores que 0,8 cm, com TSH 1,81 mU/L, sem sintomas compressivos, com punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia, mostrando à citologia células foliculares sem atipias, Bethesda II.

Nesse caso, a conduta recomendada é

- (A) iniciar propiltiouracil.
- (B) realizar tireoidectomia.
- (C) indicar radioiodoterapia.
- (D) repetir ultrassonografia em 6 meses.
- (E) iniciar reposição com levotiroxina 25 mcg/d.

32

A exposição à radiação em altas doses, como aconteceu aos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki em 1945, tem frequente relação com o carcinoma de tireoide do tipo

- (A) medular
- (B) indiferenciado
- (C) papilífero
- (D) insular
- (E) folicular

33

A hipercalcemia é um problema clínico relativamente comum, de causas variadas.

NÃO pode ser considerada causa de hipercalcemia a(o)

- (A) neoplasia endócrina múltipla tipo 2B.
- (B) ingestão excessiva de vitamina D.
- (C) Doença de Paget.
- (D) uso de diuréticos tiazídicos.
- (E) uso de lítio.

34

No tratamento dos tumores de boca, a(o)

- (A) margem cirúrgica mínima nesses tumores é de 0,5 cm.
- (B) quimiorradioterapia é o tratamento de escolha na maioria desses carcinomas.
- (C) a radioterapia adjuvante deve ser iniciada em até 6 semanas, após o tratamento cirúrgico dos carcinomas epidermoides de boca.
- (D) líquen plano oral tem um risco de transformação maligna próximo de 30%.
- (E) T2 de borda de língua não tem indicação de esvaziamento cervical profilático.

35

A laringectomia parcial supracróideia com crico-hióideo-epiglóttopexia está contraindicada quando há

- (A) invasão do espaço pré-epiglótico
- (B) extensão subglótica anterior de 2 mm
- (C) linfonodomegalia no nível IIa de 3 cm
- (D) diminuição de mobilidade das cordas vocais
- (E) extensão mucosa posterior em uma corda vocal

Considere o caso clínico descrito a seguir para responder às questões de nºs 36 e 37.

Paciente do sexo masculino, tabagista e etilista, edêntulo há 10 anos, apresentando um carcinoma epidermoide, moderadamente diferenciado de rebordo gengival inferior à direita de 2,2 cm no maior diâmetro, e tomografia computadorizada evidenciando dois linfonodos aumentados no nível II ipsilateral de 1,5 cm e 2 cm suspeitos, e ausência de erosão óssea mandibular.

36

De acordo com a classificação TNM da UICC, 7ª Edição de 2009, o estadiamento é

- (A) T2N2bM0 – E IVA
- (B) T1N2aM0 – E III
- (C) T2N2aM0 – E IVA
- (D) T3N2bM0 – E IVB
- (E) T2N2bM0 – EIII

37

Nesse caso descrito, a conduta recomendada como um tratamento com maior chance de cura é a

- (A) quimioterapia, apenas
- (B) quimioterapia e radioterapia externa
- (C) radioterapia externa exclusiva
- (D) pelvemandibulectomia com esvaziamento cervical
- (E) pelvemandibulectomia com esvaziamento cervical e radioterapia adjuvante

38

Na determinação de uma conduta terapêutica, é importante reconhecer o potencial agressivo de cada lesão.

Qual lesão oral é a de maior potencial de transformação maligna?

- (A) Granuloma
- (B) Leucoplasia
- (C) Papiloma
- (D) Adenoma
- (E) Líquen plano

39

O principal fator de risco para metástases cervicais nos carcinomas epidermoides de língua, encontrado no exame histopatológico, é a(o)

- (A) espessura tumoral
- (B) mutação do p53
- (C) invasão vascular
- (D) invasão perineural
- (E) grau de diferenciação tumoral

40

O tratamento mais indicado para a fístula quilosa com débito de 300 mL em 24 horas, decorrente de um esvaziamento cervical radical, é

- (A) dieta parenteral total
- (B) abordagem cirúrgica com retalho muscular
- (C) repouso e dieta rica em triglicerídeos de cadeia média
- (D) repouso e dieta pobre em triglicerídeos de cadeia média
- (E) repouso e dieta pobre em triglicerídeos de cadeia longa

41

O lentigo maligno é lesão precursora de

- (A) *nevus* melanocítico
- (B) carcinoma basocelular
- (C) melanoma maligno
- (D) doença de Bowen
- (E) sarcoma de pele

42

A técnica cirúrgica de Sistrunk consiste em

- (A) laringectomia frontolateral com laringofissura
- (B) ressecção do higroma cístico, com ligadura dos ductos linfáticos
- (C) ressecção do cisto tireoglossal junto ao terço médio do osso hioide e do trajeto fistuloso até o forame cego na base da língua
- (D) ressecção do cisto branquial e do trajeto fistuloso até a loja amigdalina
- (E) ressecção de cisto dermoide

43

Qual é o acesso cirúrgico menos indicado para um naso-angiofibroma juvenil Chandler II?

- (A) Acesso de Wilson
- (B) Acesso de Denker
- (C) Acesso endoscópico transnasal
- (D) Acesso transmaxilar osteoplástico
- (E) Translocação facial

44

No acesso cirúrgico às vias aéreas superiores, verifica-se que a

- (A) cricotireoidostomia não deve ser realizada na emergência pré-hospitalar para acesso traqueal no trauma de face.
- (B) cricotireoidostomia em crianças tem baixo risco de estenose subglótica.
- (C) cânula de traqueostomia com balão deve ser evitada em pacientes com risco de aspiração ou hemorragia.
- (D) cânula de traqueostomia metálica não deve ser colocada logo após a realização de uma traqueostomia por obstrução tumoral laríngea.
- (E) cânula de traqueostomia de silicone deve ser colocada em pacientes em tratamento radioterápico cervical.

45

Os acessos cirúrgicos de Lynch e de Caldwell-Luc são usados, respectivamente, para abordar o(a)

- (A) seio etmoidal e o seio maxilar
- (B) seio esfenoidal e o seio etmoidal
- (C) seio esfenoidal e o seio maxilar
- (D) seio maxilar e a fossa pterigopalatina
- (E) fossa pterigopalatina e o seio esfenoidal

46

Neonato com 10 dias de vida apresenta massa cervical de 2 cm, palpável no músculo esternocleidomastóideo esquerdo, e a cabeça com inclinação ipsilateral e rotação contralateral, sem outras alterações.

Nesse caso, o diagnóstico clínico mais provável e a conduta recomendada são, respectivamente,

- (A) trauma do parto e observação
- (B) torcicolo congênito e fisioterapia motora cervical
- (C) doença linfoproliferativa e biópsia incisiva
- (D) rabdmiossarcoma e exérese da massa
- (E) teratoma maligno e traqueostomia

47

O retalho deltopeitoral, utilizado para reconstrução após cirurgia oncológica de cabeça e pescoço, é reconhecido por retalho de

- (A) McGregor
- (B) Demergasso
- (C) Limberg
- (D) Bakamjian
- (E) Ariyam

48

A intensa captação pelo tecnécio à cintigrafia de um nódulo parotídeo sugere o diagnóstico de

- (A) adenoma pleomórfico
- (B) carcinoma adenoide cístico
- (C) carcinoma mucoepidermoide
- (D) carcinoma de células acinares
- (E) cistoadenoma papilífero linfomatoso

49

Dentre os tumores malignos de glândulas salivares, verifica-se que o

- (A) sítio mais comum de neoplasia maligna de glândulas salivares menores é o seio maxilar.
- (B) adenocarcinoma polimorfo de baixo grau é o tipo histológico de pior prognóstico.
- (C) carcinoma mucoepidermoide apresenta neurotropismo com alta incidência de disseminação por via perineural.
- (D) carcinoma adenoide cístico é o tipo mais frequente nas glândulas salivares menores, apresentando alta taxa de recidiva local.
- (E) carcinoma de células claras de parótida geralmente tem prognóstico ruim.

50

Na angina de Ludwig, a conduta inicial recomendada é

- (A) antibioticoterapia venosa de amplo espectro
- (B) observação por ser de etiologia viral
- (C) traqueostomia imediatamente ao início do quadro clínico
- (D) somente analgesia, de preferência com opioides
- (E) aciclovir por 10 dias

51

A síndrome de Ramsay-Hunt caracteriza-se por

- (A) ceratite intersticial e alterações vestibulococleares
- (B) sinusite, bronquiectasias e *situs inversus*
- (C) paralisia facial recorrente, edema facial e labial, e pregas na língua
- (D) paralisia facial, otalgia e lesões vesiculares cutâneas em pavilhão auricular ipsilaterais
- (E) paralisia do véu palatino e da corda vocal associada à síndrome de Horner ipsilaterais

52

Paciente de 38 anos, renal crônica, há 2 anos em hemodiálise, apresentando dosagens de cálcio sérico de 14 md/dL e PTH de 1830 pg/mL, com doença óssea. A cintilografia com sestamibi mostra intensa captação projetada em topografia de polo superior do lobo direito tireoidiano, e a ultrassonografia sugere um nódulo tireoidiano de 2,0 cm em lobo direito, sem linfonodomegalias. A tomografia computadorizada relata uma massa de 2,3 cm no maior diâmetro, sem plano de clivagem com o lobo tireoidiano.

Nesse caso, a conduta recomendada é

- (A) manter bifosfonatos e repetir a cintilografia com sestamibi.
- (B) radioterapia externa exclusiva.
- (C) paratireoidectomia total com reimplante de fragmentos de uma paratireoide.
- (D) ressecção do tumor, incluindo o lobo direito tireoidiano, e inspeção das outras paratireoides.
- (E) tireoidectomia total, com laringectomia total e esvaziamento cervical.

53

Paciente de 48 anos, submetida à tireoidectomia total por carcinoma papilífero de 2,5 cm com extensão extratireoidiana, e tratamento com 100 mCi de dose de iodo radioativo 131, apresentando pesquisa de corpo inteiro pós-dose com captação cervical de 2% em leito de tireoidectomia. Dosagens séricas, duas semanas após a PCI, mostram TSH de 34 mUI/L e tireoglobulina < 0,2 ng/mL (anticorpo anti-tireoglobulina < 10 UI/mL).

Nesse caso, a conduta indicada, nesse momento, é

- (A) exploração cirúrgica de possível remanescente tireoidiano.
- (B) reoperação para esvaziamento cervical central.
- (C) controle periódico, com dosagem de tireoglobulina e TSH, e ultrassonografia de pescoço.
- (D) repetir dose terapêutica com 100 mCi de iodo 131.
- (E) punção aspirativa guiada por ultrassonografia.

54

Tumoração de fossa nasal apresenta positividade na imunohistoquímica para citoqueratina AE1/AE3 e LMP-1.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Estesioneuroblastoma
- (B) Angiofibroma
- (C) Carcinoma sinusal indiferenciado
- (D) Sarcoma naso-sinusal
- (E) Melanoma de fossa nasal

55

Na reabilitação fonatória dos pacientes laringectomizados,

- (A) a maioria dos pacientes consegue desenvolver a voz esofageana.
- (B) a prótese traqueoesofágica de silicone dispensa cuidados e é de fácil utilização.
- (C) a laringe eletrônica é um método barato, de fácil aprendizado e com excelente padrão vocal e aceitação social.
- (D) a terapia fonatória antes da colocação secundária da prótese traqueoesofágica não altera o resultado da reabilitação.
- (E) uma das causas de insucesso da prótese traqueoesofágica é a fibrose faríngea pós-radioterapia.

56

A lesão do III par craniano leva a sinais clínicos como:

- (A) desvio contralateral da língua
- (B) paralisia facial ipsilateral
- (C) disfonia por paralisia de corda vocal ipsilateral
- (D) miose e estrabismo convergente ipsilateral
- (E) midríase e ptose palpebral ipsilateral

57

Gestante procura o serviço médico e relata que foi submetida à tireoidectomia total há 10 anos, com o diagnóstico de carcinoma medular. Durante a investigação, foi solicitada a mutação do RET e identificou-se mutação no códon 790.

Nesse caso, a orientação apropriada é

- (A) observação clínica.
- (B) esvaziamento cervical da gestante.
- (C) submeter a criança à tireoidectomia antes de dois anos de idade.
- (D) submeter a criança à tireoidectomia em uma idade mais avançada, pois se trata de mutação de baixo risco.
- (E) interromper a gestação devido ao alto risco de carcinoma medular do feto.

58

Dentre as lesões pré-malignas abaixo, aquela que está associada a maior risco de transformação para carcinoma invasor é a

- (A) Eritroplasia
- (B) Lichen plano oral
- (C) Fibrose submucosa oral
- (D) Leucoplasia verrucosa
- (E) Leucoplasia homogênea

59

Paciente do sexo masculino, com 35 anos, apresenta queixas de pressão em hemiface à esquerda associada à parestesia há 3 meses. A rinoscopia anterior revela, apenas, cornetos congestionados e azulados, em permeio à secreção mucosa. A palpação da hemiface à esquerda, assim como das cadeias linfáticas cervicais, não revelou anormalidades. A oroscopia também não revelou alterações. Não há história de comorbidades.

Diante do caso descrito, a conduta recomendada é

- (A) prescrever a instilação de solução fisiológica nasal, seguida por *spray* nasal de esteroides e reavaliar em 30 dias.
- (B) prescrever antibiótico (Amoxicilina) por via oral por 10 dias e reavaliar.
- (C) prescrever a instilação de solução fisiológica nasal e analgésicos.
- (D) solicitar TC dos seios paranasais.
- (E) solicitar RM dos seios paranasais e da base do crânio.

60

Com relação às indicações de mandibulectomias marginais no tratamento do câncer bucal, considere as afirmativas abaixo.

- I - A mandibulectomia marginal está contraindicada em pacientes com invasão da cortical pelo tumor.
- II - A mandibulectomia marginal está contraindicada em pacientes edêntulos.
- III - No procedimento da mandibulectomia marginal, deve-se evitar a confecção de ângulos retos para diminuir o risco de fraturas espontâneas.
- IV - A mandibulectomia marginal é desaconselhável em pacientes submetidos à radioterapia prévia da cavidade bucal.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) I, III e IV

61

Com relação às cirurgias para o tratamento do câncer das fossas nasais e dos seios paranasais, considere as afirmativas abaixo.

- I - A epífora e o pseudo-telecanto são potenciais complicações associadas à maxilarectomia total.
- II - O nervo infraorbitário é preservado nas maxilectomias mediais.
- III - O acesso cirúrgico denominado Degloving mediofacial pode ser usado, com sucesso, para o tratamento de tumores de infraestrutura.
- IV - A reconstrução da cavidade orbitária, após exenteração da órbita, pode ser feita, com sucesso, usando-se o músculo temporal ipsilateral.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas
- (B) III e IV, apenas
- (C) I, II e III, apenas
- (D) II, III e IV, apenas
- (E) I, II, III e IV

62

Qual o tratamento indicado para um Carcinoma pouco diferenciado de seio piriforme estadiado T1N0M0?

- (A) Radioterapia exclusiva da Laringe e Hipofaringe.
- (B) Radioterapia exclusiva da Hipofaringe e das cadeias linfáticas cervicais.
- (C) Cirurgia para o Tu primário com radioterapia adjuvante.
- (D) Quimioradioterapia, incluindo, apenas, a Hipofaringe no campo da irradiação.
- (E) Ressecção cirúrgica do Tu primário, apenas.

63

Qual estrutura nervosa é responsável pela inervação do músculo cricoaritenóideo posterior?

- (A) Nervo laríngeo recorrente.
- (B) Nervo glossofaríngeo (IX par craniano)
- (C) Nervo cricoaritenóideo
- (D) Ramo interno do nervo laríngeo superior
- (E) Ramo externo do nervo laríngeo superior

64

A terapia com radioiodo exerce maior benefício em paciente com as seguintes características:

- (A) Homem, com 25 anos, portador de Ca Papilífero T1N1M0
- (B) Homem, com 50 anos, portador de Ca Papilífero T1N0M0
- (C) Mulher, com 30 anos, portadora de Ca Papilífero T2N0M0
- (D) Mulher, com 83 anos, portadora de Ca Papilífero T3N1M0
- (E) Menina, com 13 anos, portadora de Ca Papilífero T1N1M1

65

São consideradas características associadas a um comportamento biológico mais agressivo, entre os Carcinomas de Células Escamosas cutâneos, **EXCETO**

- (A) tamanho > 2,0 cm
- (B) espessura > 1,4 mm
- (C) invasão perineural
- (D) sítio primário na região auricular ou periauricular
- (E) histologia pouco diferenciada ou indiferenciada

66

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu Artigo 198 três diretrizes segundo as quais devem ser organizadas as ações e serviços públicos de saúde.

As diretrizes são as seguintes:

- (A) descentralização; atendimento integral; participação da comunidade
- (B) direção única; prioridade para ações preventivas; regionalização do sistema
- (C) rede regionalizada e hierarquizada; atendimento integral; participação da comunidade
- (D) direção tripartite em cada esfera de governo; descentralização e hierarquização dos serviços, participação da comunidade
- (E) descentralização; prioridade para ações preventivas; serviços organizados em redes assistenciais

67

O Ministério da Saúde tem publicado protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas primordialmente para as doenças e condições clínicas prioritárias tratadas com medicamentos do chamado "Componente Especializado da Assistência Farmacêutica".

Os critérios definidos para inclusão dos medicamentos estabelecidos nesse componente por norma ministerial (Art 4º Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013) são os seguintes:

- (A) a elevada frequência e a gravidade da doença.
- (B) a necessidade de importação do medicamento e a sua relevância.
- (C) a complexidade do tratamento, a garantia da integridade no âmbito da linha de cuidado e a manutenção do equilíbrio financeiro do SUS.
- (D) a raridade da doença e a inclusão de medicamentos no complexo produtivo da saúde.
- (E) o custo do tratamento e a existência de protocolos que discriminem seu uso.

68

As seguintes ocorrências são de notificação compulsória imediata (em menos de 24 horas) ao Ministério da Saúde:

- (A) cólera; doença de Chagas; antraz pneumônico; hantavirose; doença pelo vírus Zika
- (B) cólera; botulismo; dengue; varíola; sífilis
- (C) cólera; febre amarela; poliomielite; HIV-Aids; tétano
- (D) ebola; varíola; raiva humana; óbito por dengue
- (E) febre amarela; hanseníase; coqueluche; leptospirose; tétano

69

Os seguintes medicamentos podem ser obtidos gratuitamente nas farmácias participantes do programa "Saúde não tem Preço":

- (A) amoxicilina, captopril, dexametasona e metformina
- (B) tetraciclina, captopril, betametasona e glibenclamida
- (C) enalapril, metformina, insulina humana e montelucaste
- (D) enalapril, glibenclamida, metformina e dexametasona
- (E) captopril, metformina, insulina humana e salbutamol

70

Indicadores de saúde são utilizados para avaliar as condições de saúde de grupos populacionais e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Um dos indicadores mais largamente utilizados como "resumo" dessas condições tem sido a taxa de mortalidade infantil, que se encontra dividida em dois componentes de acordo com a idade na qual tenha ocorrido o óbito. Um componente, que é mais tardio, é mais sensível às condições socioambientais. O outro componente é mais precoce e mais dependente das condições associadas ao parto e aos cuidados prestados ao recém-nato.

Esses componentes são, respectivamente:

- (A) neonatal precoce; perinatal
- (B) posneonatal; neonatal
- (C) perinatal; posneonatal
- (D) posneonatal; perinatal
- (E) neonatal; posneonatal