

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**

- “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
- “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
- “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
- “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
- “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)

2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**

- utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
- valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
- importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
- irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
- obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos

3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**

- o do enunciador e o da mãe
- o da mãe e o do pai
- o do leitor e o da mãe
- o do enunciador e o do leitor
- o do enunciador e o do pai

4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**

- antecipa uma ideia que será apresentada
- faz referência a algo próximo ao leitor
- sinaliza uma referência temporal
- resume elementos de uma enumeração
- retoma um termo citado anteriormente

5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**

- sujeito
- objeto direto
- complemento nominal
- objeto indireto
- adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**

- juventude e velhice
- televisão e paixão
- organização e desordem
- realidade e fantasia
- rapidez e eternidade

7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**

- ironia
- metáfora
- metonímia
- antítese
- comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**

- eu
- tinha
- certeza
- aquele
- som

9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**

- pronome relativo e conjunção integrante
- conjunção consecutiva e pronome interrogativo
- pronome relativo e conjunção explicativa
- conjunção integrante e pronome relativo
- conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Considerando as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), para doença renal crônica (DRC), quanto às medidas voltadas à prevenção da progressão da DRC, assinale a alternativa **incorreta**:

- Recomenda-se o uso de um bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) ou de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) em adultos diabéticos e não diabéticos com DRC e excreção de albumina na urina > 300 mg/24 horas
- Há evidências suficientes para recomendar a combinação de um BRA com um IECA para prevenir a progressão da DRC em estados de proteinúria > 1g/24 horas
- Em pacientes diabéticos, recomenda-se, que o nível de hemoglobina A1C não seja > 7%
- Não há evidências suficientes para apoiar ou refutar o uso de agentes para diminuir a concentração sérica de ácido úrico em pessoas com DRC e hiperuricemia sintomática ou assintomática a fim de retardar a progressão da DRC
- Recomenda-se evitar a ingestão elevada de proteínas (>1,3 g/kg/dia) em adultos com DRC em risco de progressão

27) Um paciente de 56 anos, com quadro típico de nefropatia diabética, apresenta em seus exames laboratoriais periódicos albuminúria de 870 mg/g de proteína e depuração da creatinina estimada pela fórmula CKD-EPI de 27 ml/min. De acordo com o estadiamento da doença renal crônica, expresso nas diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), ela será classificada como:

- G3b A2
- G3b A3
- G4 A2
- G4 A3
- G5 A3

28) Para pacientes adultos em estágio 5 da doença renal crônica (DRC), em tratamento não dialítico, as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes) para anemia na DRC sugere que os agentes estimulantes da eritropoese sejam iniciados quando a concentração de hemoglobina for:

- < 8 g/dl apenas
- < 10,5 g/dl
- Entre 10 e 11 g/dl
- < 9 g/dl apenas
- Entre 9,0-10,0 g/dl

29) Sobre as recomendações para o manejo dos distúrbios minerais e ósseos na doença renal crônica (DRC), analise as sentenças abaixo, considerando as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes) e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- Em pacientes com DRC estádios 3 – 5 não em diálise, em quem o soro PTH está aumentando progressivamente e persistentemente e permanece acima do limite superior do normal, apesar da correção dos fatores modificáveis, sugerimos o tratamento com calcitriol ou análogos vitamina D
- Em pacientes com DRC estádios de 3 – 5, recomenda-se que os valores individuais das concentrações séricas de cálcio e fósforo não sejam usados isoladamente para guiar a prática clínica, que deve se basear prioritariamente no produto cálcio-fósforo.
- Sugerimos que pacientes com níveis de PTH intacto acima do limite superior normal sejam avaliados primeiro por deficiência de vitamina D, hipocalcemia e hiperfosfatemia. É adequado corrigir essas anormalidades com qualquer uma ou todas as seguintes características: redução da ingestão de fósforo, suplementação de cálcio, quelantes de fósforo ou vitamina D nativa.
 - Apenas I e III são corretas
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I é correta
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II é correta

30) Paciente masculino de 24 anos, politraumatizado, deu entrada na Unidade de Emergência (UE) com concentração da hemoglobina de 7,4 g/dl, ureia sérica de 48 mg/dl e creatinina sérica de 1,1 mg/dl. Seu peso corporal estimado era de 70 kg. Você é solicitado para avaliar este caso no quinto dia após a admissão na UE, momento em que o paciente apresentava creatinina sérica do mesmo dia de 4,1 mg/dl e volume urinário nas últimas 24 horas de 320 ml. De acordo com as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes) para injúria renal aguda (IRA), o estadiamento da IRA desse paciente seria:

- 2
- 1
- 3
- 4
- Indefinido, pois não é informada a última dosagem da ureia sérica.

31) Considerando as recomendações para prevenção e tratamento da injúria renal aguda (IRA), expressas nas diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), analise a alternativa que contém a recomendação correta para prevenção da IRA.

- Uso de diuréticos
- Uso de dopamina em baixa dose
- Uso de peptídeo natriurético atrial
- Uso de eritropoietina recombinante humana
- Não usar N-aceticisteína para prevenir a IRA em pacientes pós cirúrgicos

32) Considerando as recomendações para prevenção e tratamento da injúria renal aguda (IRA), expressas nas diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), analise a alternativa que contém a recomendação correta para prevenção da IRA por contraste radiográfico em pacientes de risco para esta condição.

- Uso de teofilina
- Uso de N-aceticisteína oral juntamente com solução cristalóide intravenosa
- Uso de fenoldopam
- Uso de hemodiálise intermitente profilática
- Uso de hidratação oral exclusiva

- 33) Considerando as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improvement Global Outcomes), recomendamos que, ao se usar terapia renal substitutiva intermitente ou estendida na IRA, deve fornecer dose de diálise correspondente a um clearance fracional de ureia(Kt/V) semanal de:
- 3,9
 - 3,6
 - 4,2
 - 4,9
 - 5,6
- 34) Considerando os dados epidemiológicos brasileiros sobre a hipertensão arterial, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:
- A hipertensão arterial é mais prevalente em indivíduos de etnia negra.
 - Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de hipertensão arterial.
 - Uma revisão mostrou que as taxas de controle da pressão arterial variou de 10,1% a 35,5%, dependendo da população estudada.
- Apenas I e III são corretas
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I é correta
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II é correta
- 35) Sobre as indicações clínicas de MAPA (monotorização ambulatorial da pressão arterial), expressas na Diretriz Brasileira de Hipertensão, assinale a incorreta:
- Suspeita de hipertensão mascarada
 - Suspeita do efeito do avental branco em hipertensos
 - Suspeita de hipertensão secundária
 - Confirmação de hipertensão resistente
 - Grande variação da PA no consultório na mesma consulta ou em consultas diferentes
- 36) Sobre as metas de controle pressórico a serem atingidas em conformidade com as características individuais, considerando as recomendações da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, assinale a alternativa incorreta:
- A meta de controle para hipertensos, estágios 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado, é pressão arterial (PA) < 140 x 90 mmHg
 - A meta de controle para hipertensos estágio 1, com risco cardiovascular alto é PA < 130 x 80 mmHg
 - A meta de controle para hipertensos estágio 2, com risco cardiovascular alto é PA < 130 x 80 mmHg
 - A meta de controle para hipertensos estágio 3, com risco cardiovascular alto é PA < 130 x 80 mmHg
 - Para pacientes com doenças coronarianas, a PA não deve ficar < 120/70 mmHg
- 37) Considerando as metas pressóricas e os fármacos preferenciais para pacientes em tratamento conservador, de acordo com a etiologia da doença renal crônica (DRC) e com a excreção urinária de albumina, considerando as recomendações da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, assinale a alternativa incorreta:
- A meta de controle para DRC não diabética com albuminúria < 30 mg/24 h é < 140 x 90 mmHg
 - A meta de controle para DRC não diabética com albuminúria > 30 mg/24 h é < 130 x 80 mmHg
 - A meta de controle para DRC diabética com albuminúria > 30 mg/24 h é < 130 x 80 mmHg
 - A meta de controle para DRC diabética com albuminúria < 30 mg/24 h é < 140 x 90 mmHg
 - Não há um fármaco preferencial em casos de DRC não diabética com albuminúria < 30 mg/24 h
- 38) Sobre a hipertensão causada pelo hiperaldosteronismo primário (HAP), analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:
- A prevalência do HAP em hipertensos é de 3-22%, sendo mais alta em hipertensos em estágio 3 e/ou resistentes.
 - Para dosagens laboratoriais diagnósticas é necessário suspender anti-hipertensivos, em particular a espironolactona por 4-6 semanas.
 - Atividade de renina plasmática (ARP) suprimida e Aldo > 15 ng/dl, com relação Aldo/ARP > 30 indica diagnóstico de HAP.
- Apenas I e III são corretas
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I é correta
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II é correta
- 39) Considerando-se os métodos de diálise peritoneal, ambulatorial contínua (CAPD) e automatizada (DPA), é incorreto afirmar:
- A DPA na modalidade intermitente noturna (NIPD) é indicada em pacientes com características de transporte peritoneal de alto transportadores
 - A CPAD está indicada em pacientes com características de transporte peritoneal de baixo transportadores
 - O transporte peritoneal de sódio é maior na modalidade CPAD dos que na modalidade DPA, de um modo geral
 - A incidência de peritonites é menor na modalidade DPA que na CAPD
 - Não há dados consistentes na literatura que permitam assumir que há diferenças na sobrevida dos pacientes tratados por CAPD ou por DPA
- 40) Entre as condições abaixo, assinale aquela para a qual há menos evidências de influência negativa na sobrevida do paciente em hemodiálise crônica.
- Hipoalbuminemia
 - Hiperomocisteinemia
 - Uso de quelantes de fósforo à base de cálcio
 - Não controle pressórico
 - Anemia
- 41) Em adultos com doença de lesões mínimas e recidivas frequentes, que apresentam intolerância aos corticosteroides, inibidores de calcineurina e à ciclofosfamida, a indicação mais adequada é:
- Clorambucil
 - Azatioprina
 - Levamisole
 - Micofenolato mofetil
 - Inibidor de enzima de conversão da angiotensina apenas
- 42) Sobre o tratamento da glomerulosclerose segmentar e focal (GESF), analise as afirmativas abaixo e assinale a correta
- Terapia com corticosteroides e terapia imunossupressora devem ser consideradas apenas na GESF idiopática associada com síndrome nefrótica.
 - Os corticosteroides devem ser reduzidos lentamente durante um período de dois meses depois de se atingir a remissão completa.
 - Para a GESF resistente aos corticosteroides a terapia de escolha recai sobre a ciclofosfamida.
- Apenas I e III são corretas
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I é correta
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II é correta

43) Sobre o tratamento da nefropatia idiopática membranosa, assinale a alternativa incorreta.

- a) A presença de sintomas graves ou incapacitantes relacionados com a síndrome nefrótica é uma das indicações de tratamento imunossupressivo
- b) Filtração glomerular estimada < que 25 ml/min e essa alteração não é explicada por complicações sobrepostas, é uma das indicações de tratamento imunossupressivo
- c) No tratamento inicial corticosteroide em monoterapia não é recomendado
- d) No tratamento inicial micofenolato mofetil em monoterapia não é recomendado
- e) Para o tratamento inicial uma das drogas indicadas é a ciclofosfamida

44) Sobre o tratamento da nefropatia por IgA, assinale a alternativa incorreta:

- a) Tonsilectomia não está indicada em pacientes com nefropatia por IgA
- b) Agentes antiplaquetários não são indicados em pacientes com nefropatia por IgA
- c) Tratamento com óleo de peixe não está indicado em pacientes com nefropatia por IgA
- d) Está indicado o uso a longo prazo de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina em pacientes com nefropatia por IgA e proteinúria > 1g/24 h
- e) O uso rotineiro de corticosteroide em associação com ciclofosfamida ou azatioprina não está indicado em pacientes com nefropatia por IgA

45) O tratamento da nefrite lúpica classe histológica IV deve ser iniciado:

- a) Com corticosteroide em monoterapia
- b) Somente com corticosteroide associado com micofenolato mofetil
- c) Somente com corticosteroide associado com ciclofosfamida
- d) Com corticosteroide associado com ciclofosfamida ou micofenolato mofetil
- e) Somente com corticosteroide associado com ciclosporina

46) Entre as estratégias abaixo, assinale aquela para a qual não há evidências suficientes que altera o curso da nefropatia diabética.

- a) Controle da pressão arterial
- b) Uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina
- c) Uso de estatina
- d) Uso de bloqueador do receptor da angiotensina
- e) Controle estrito da glicemia

47) Sobre a síndrome hemolítico-urêmica (SHU), analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Mesmo na ausência de diarreia deve ser afastada STEC-SHU (SHU associada à Escherichia coli produtora de Shiga-toxina), lembrando que 10% dos casos podem não apresentar diarreia.
 - II. SHUa (SHU atípica) pode vir acompanhada de queda em C3 sérico e na atividade da via alternativa medida pelo AH50; porém, mesmo que os níveis sejam normais, não afasta SHUa.
 - III. Eculizumab tem se mostrado como uma medicação que modifica o curso da SHUa. Tem resgatado a função de rins nativos e prevenido a recorrência pós-transplante.
- a) Apenas I e III são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas I é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas II é correta

48) Entre as doenças abaixo, assinale a que não se associa a risco aumentado de litíase urinária:

- a) Síndrome de Cushing
- b) Obesidade
- c) Doença de Crohn
- d) Acidose tubular renal
- e) Hipotireoidismo

49) O segundo tipo de tumor renal mais comum é o:

- a) Carcinoma papilar
- b) Carcinoma renal cromóforo
- c) Carcinoma de ductos coletores
- d) Carcinoma de células claras
- e) Tumor sarcomatoide

50) Sobre a nefrite intersticial aguda (NIA) alérgica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A eosinifilúria tem alto valor preditivo positivo para o diagnóstico.
 - II. Pode ser causada por antibióticos betalactâmicos.
 - III. A fração de excreção urinária de sódio é em geral < 20%.
- a) Apenas I e III são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas I é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas II é correta