



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO SUL

Concurso Público Federal Edital 19/2016

PROVA

Área: Enfermagem

QUESTÕES OBJETIVAS

Legislação	01 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 40

Nome do candidato: _____ Nº de Inscrição: _____

INSTRUÇÕES

- 1) Verifique se este caderno corresponde à sua opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a correta.
- 3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três horas e trinta minutos).
- 4) Não é permitida consulta a qualquer material e os candidatos não poderão conversar entre si, nem manter contato de espécie alguma.
- 5) Os telefones celulares e similares não podem ser manipulados e devem permanecer desligados durante o período em que o candidato se encontrar na sala, e devem permanecer em local designado pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova deverão estar embaixo da carteira, ficando automaticamente excluído o candidato que descumprir essas orientações.
- 6) O candidato só poderá deixar o local após 90min (noventa minutos) do início da prova, exceto os três últimos candidatos, os quais só poderão deixar o local quando todos terminarem a prova.
- 7) O candidato poderá levar consigo o caderno de provas após decorridos 120min (cento e vinte minutos) do início da prova. Não será oferecido outro momento para a retirada do mesmo.
- 8) É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos, assim como recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização.
- 9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha de Respostas, preenchendo totalmente a célula correspondente à alternativa escolhida, sendo desconsiderada a resposta se não for atendido o referido critério de preenchimento. O candidato deverá responder a todas as questões. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- 10) Não haverá substituição da Folha de Respostas em caso de erro do candidato.
- 11) É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

LEGISLAÇÃO

1. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre o Processo Administrativo Disciplinar:

- a) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 15 (quinze) dias, de demissão ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
- b) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, com prejuízo da remuneração auferida.
- c) O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se adivirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, não podendo a revisão do processo, entretanto, resultar no agravamento da penalidade.
- d) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da ocorrência do fato, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- e) Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cômjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau.

2. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as afirmativas abaixo, assinalando, a seguir, a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo:

() É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, bem como o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

() O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo.

() O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

() Dentre as atribuições do Conselho Tutelar está encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente e requisitar, quando necessário, certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente.

() Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos reconhecida idoneidade moral, idade superior a 18 (dezoito) anos e residir no Município.

a) V – V – V – F – V.

b) V – V – V – F – F.

c) F – F – F – V – V.

d) F – V – F – F – V.

e) V – F – V – V – F.

3. Considere as assertivas abaixo acerca da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012:

- I. É possível a mudança de regime de trabalho aos docentes em estágio probatório.
- II. A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico observará, cumulativamente, o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e aprovação em avaliação de desempenho individual.
- III. Conforme regulamentação interna de cada IFE, o RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) poderá ser utilizado para fins de equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a promoção na Carreira.
- IV. O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de qualquer atividade remunerada, pública ou privada.
- V. Ressalvadas as exceções previstas na lei, os professores ocupantes de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal serão submetidos ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, ou tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **INCORRETAS**:

- a) Apenas III, IV.
- b) Apenas I, IV, V.
- c) Apenas I, III, IV.
- d) Apenas III, IV, V.
- e) Apenas III, V.

4. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, analise as seguintes afirmativas sobre nomeação, posse e exercício:

- I. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
- II. Somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
- III. É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da nomeação.
- IV. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal.
- V. A nomeação em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **CORRETAS**:

- a) Apenas I, III, V.
- b) Apenas I, II, IV.
- c) Apenas III, IV.
- d) Apenas II, IV, V.
- e) I, II, III, IV, V.

5. O corpo discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS é constituído por alunos matriculados nos diversos cursos e programas oferecidos pela instituição, classificados nos seguintes regimes:

() regular – alunos matriculados nos cursos técnicos de nível médio, nos cursos de graduação e pós-graduação.

() temporário – alunos matriculados especificamente em disciplinas isoladas em cursos de graduação e pós-graduação.

() especial – alunos matriculados em cursos de extensão e educação continuada.

Analise as afirmativas, identificando com “V” as **VERDADEIRAS** e com “F” as **FALSAS**, assinalando a seguir a alternativa **CORRETA**, na sequência de cima para baixo:

- a) V – F – V.
- b) F – V – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – V.
- e) F – F – F.

6. Com base nas disposições constantes na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Conselho Superior, presidido pelo Reitor, e o Colégio de Dirigentes, presidido por um dos Diretores-Gerais dos Campi, indicado pelo Reitor.
- b) Os Institutos Federais são instituições de educação exclusivamente básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.
- c) Somente poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira docente, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica.
- d) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.
- e) O Conselho Superior, de caráter normativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos e da sociedade civil, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica.

7. Assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo, dos parênteses, segundo a Organização Didática (OD) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS:

1. Poderão ser oferecidos somente na modalidade presencial;
2. Poderão ser oferecidos somente na modalidade de educação a distância;
3. Poderão ser oferecidos na modalidade presencial ou de educação a distância.

Cursos Técnicos Integrados de nível médio;

Cursos Técnicos Integrados à Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nível médio;

Cursos Técnicos de nível médio subsequente;

Cursos Técnicos de nível médio na modalidade de concomitância externa.

- a) 1, 1, 3, 3.
- b) 1, 1, 1, 3.
- c) 1, 2, 3, 3.
- d) 3, 2, 1, 1.
- e) 3, 3, 3, 3.

8. Sobre as Regras Deontológicas contidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído por meio do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
- b) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
- c) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- d) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- e) Excepcionados os casos que envolvam a segurança nacional, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

9. Os servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, aprovados no estágio probatório do respectivo cargo, que atenderem os seguintes requisitos de titulação, farão jus a processo de aceleração da promoção:

- I. de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela apresentação de título de especialista.
- II. de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela apresentação do diploma de graduação somado ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) – I.
- III. de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação de título de mestre ou doutor.
- IV. de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação de certificado de pós-graduação lato sensu somado ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) – II.
- V. de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação de título de mestre somado ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) – III.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **INCORRETAS**:

- a) Apenas I, II, III.
- b) Apenas I, III, V.
- c) Apenas II, III, IV.
- d) Apenas II, IV, V.
- e) Apenas III, IV, V.

10. Segundo o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, são princípios da sua ação inclusiva:

- I. A igualdade de oportunidades e de condições de acesso, inclusão e permanência.
- II. O desenvolvimento de competências para a laborabilidade.
- III. A defesa da interculturalidade.
- IV. A garantia da educação pública, gratuita e de qualidade para todos.
- V. A flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **INCORRETAS**:

- a) Apenas I, IV.
- b) Apenas II, V.
- c) Apenas II, IV.
- d) Apenas II, III, V.
- e) Apenas I, III, IV, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (Brasil, 2009) tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios. Em relação a essa Política, considere as seguintes afirmativas:

- I. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, instituída por meio da Portaria GM/MS nº 1.944, de 27/08/2009, está direcionada à população masculina com idade compreendida entre 20 e 65 anos.
- II. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem deve considerar a heterogeneidade das possibilidades de ser homem. As masculinidades são construídas histórica e sócio culturalmente, como um processo em permanente transformação.
- III. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como objetivo geral promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde.
- IV. Uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está em entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção.
- V. Cabe aos municípios a responsabilidade de fomentar técnica e financeiramente a implementação e acompanhar em seu território a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem;

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) **INCORRETA(S)**:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II, III.
- c) Apenas III, IV.
- d) Apenas II, III, IV.
- e) I, II, III, IV, V.

12. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O Estatuto do Idoso, em seu Capítulo IV, do Direito à Saúde, destaca que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2003). Quanto ao abordado nesse capítulo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.
- b) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- c) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- d) Incumbe, ao profissional médico, a comunicação dos casos de confirmação de maus-tratos contra idoso a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso. Os casos suspeitos devem ser melhor investigados antes da denúncia.
- e) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.

13. O cenário nacional mostra que a população brasileira está envelhecendo de forma rápida e intensa. A pessoa idosa tem, em graus variáveis, um declínio geral das funções orgânicas, em decorrência de efeitos anatômicos e fisiológicos do envelhecimento. Além dessa condição, muitas pessoas idosas apresentam patologias crônicas, o que pode influenciar na probabilidade de complicações em procedimentos cirúrgicos. Diante da necessidade de realização de procedimento cirúrgico em pessoa idosa, analise as afirmativas abaixo, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS.

() É necessário manter áreas de pressão acolchoadas e respeitar as limitações da amplitude de movimentos, durante o posicionamento da pessoa idosa para o procedimento cirúrgico, prevenindo lesões e dor decorrentes de posicionamento.

() A remoção da máscara cirúrgica ao receber a pessoa idosa, na sala de cirurgia, para se apresentar e explicar os procedimentos antes de iniciar a cirurgia, facilita a comunicação.

() A quantidade de líquidos infundidos deve ser registrada com precisão, já que as perdas sanguíneas e de líquidos não têm como ser estimadas .

() O cuidado com a temperatura ambiente da sala de cirurgia e o uso de dispositivos como cobertores de aquecimento ou cobertores reguladores de temperatura, ajudam a estabilizar os efeitos da perda de calor.

() A implementação de técnica asséptica durante todo procedimento cirúrgico diminui a possibilidade de infecção em pessoas idosas.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- V – F – V – F – F.
- F – V – F – V – F.
- V – V – V – F – V.
- V – V – F – V – F.
- V – V – F – V – V.

14. Em 2016, diante de evidências que corroboram o reconhecimento da relação entre o aumento do número de casos de microcefalia no Brasil e a infecção pelo vírus Zika, o Ministério da Saúde lançou o Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia (BRASIL, 2016). Em relação às informações contidas nesse protocolo, analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e “F” as FALSAS.

() A infecção pelo vírus Zika afeta todos os grupos etários e ambos os sexos. É uma doença febril aguda, autolimitada na maioria dos casos, com baixa necessidade de hospitalização.

() Diante do aumento do número de casos de microcefalia, associados ou não à infecção pelo vírus Zika, as equipes de saúde devem direcionar suas ações, prioritariamente, para as gestantes.

() É de extrema importância que as mulheres ou casais que desejam ter filhos recebam, dos profissionais da saúde, as orientações sobre a prevenção da infecção pelo vírus Zika e sobre os cuidados necessários para evitar essa infecção durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre.

() Em casos de suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus Zika, a indicação da via de parto obstétrica recai sobre a operação cesariana, reduzindo o risco de complicações para o bebê.

() O Ministério da Saúde recomenda a manutenção da amamentação diante do cenário epidemiológico do vírus Zika. Estudos realizados na Polinésia Francesa, onde também houve aumento dos casos de microcefalia, não identificaram a replicação do vírus em amostras do leite.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- V – F – V – F – F.
- V – F – V – F – V.
- F – V – F – V – V.
- V – V – V – F – F.
- V – F – V – V – V.

15. A Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de risco à infecção pelo HIV (PEP) é utilizada para acidentes ocupacionais e para situações de violência sexual e de exposição sexual consentida. Quanto ao documento “Diretrizes para a organização da Rede de Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV – PEP” (BRASIL, 2016), é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A PEP é uma medida de prevenção da infecção pelo HIV que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus.
- b) A condição sorológica da pessoa exposta deve ser investigada e, sempre que possível, da pessoa-fonte da exposição.
- c) A duração da PEP é de 30 dias e a pessoa exposta deve ser acompanhada pela equipe de saúde.
- d) A profilaxia das situações de exposição ao vírus é uma urgência médica, devendo ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição e, no máximo, em até 72 horas.
- e) A adesão da pessoa exposta à profilaxia é essencial para sua efetividade, sendo necessário, para isso, que seja orientada a observar rigorosamente as doses, horários e tempo de duração da profilaxia.

16. “A hemodiálise é o método de depuração extracorpórea pelo qual o sangue obtido por um acesso vascular é colocado em contato com uma solução de diálise em um filtro que utiliza uma membrana semipermeável artificial” (CHEREGATTI; AMORIM, 2010, p. 311-312). Entre os cuidados de enfermagem diante da necessidade de realização de hemodiálise em paciente que interna na Unidade de Terapia Intensiva com insuficiência renal aguda, cita-se:

- I. Manter controle rigoroso dos sinais vitais, em especial da pressão arterial.
- II. Realizar balanço hídrico rigoroso, registrando os líquidos administrados e eliminados.
- III. Realizar preparo do cateter duplo lúmen, aspirando e desprezando o anticoagulante das vias.
- IV. Manter avaliação do turgor de pele e mucosas.
- V. Atentar para sinais e sintomas de complicações como confusão mental, agitação, câibras, náuseas, entre outros.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, III.
- b) Apenas III, IV.
- c) Apenas I, II, III.
- d) Apenas II, III, IV.
- e) I, II, III, IV, V.

17. “Há um esforço mundial, envolvendo organismos governamentais, não governamentais, profissionais de saúde e sociedade civil, para regulamentação e controle do uso do tabaco, de forma a desestimular o seu consumo prevenindo a iniciação (especialmente entre os jovens) e estimulando/apoiando a cessação para os usuários” (BRASIL, 2015, p.19). O tratamento para cessação do uso do tabaco envolve todos os profissionais da saúde, o usuário, bem como é imprescindível o apoio sociofamiliar. A efetividade do tratamento exige determinadas atitudes e posturas dos profissionais da saúde, as quais devem estar presentes desde o acolhimento. Em relação a essas atitudes e posturas, analise as afirmativas abaixo, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS.

() Estimular, no usuário, a mudança de atitude em relação ao uso do tabaco para o alcance da abstinência.

() Oferecer informações ao usuário sobre os malefícios do tabaco, os sintomas possíveis relacionados ao parar de fumar, entre outras informações relevantes.

() Destacar a importância de estabelecer uma data para parar de fumar, a qual deve ser impreterivelmente seguida, como forma de assegurar a efetividade do tratamento.

() Destacar a importância de manter o acompanhamento durante todo o tratamento, mesmo após parar de fumar.

() Oferecer informações que permitam, ao usuário, aprender a identificar as situações de risco que podem levar à recaída.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- a) V – V – F – V – V.
- b) V – F – V – F – F.
- c) F – V – F – V – V.
- d) V – V – V – F – F.
- e) V – F – V – V – V.

18. O Código de Ética da Enfermagem, em seu Capítulo V - Das Infrações e Penalidades, destaca que as infrações consideradas gravíssimas são “as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irreparável em qualquer pessoa” (Resolução COFEN 311/2007, p. 11, 12). Entre as circunstâncias consideradas agravantes de tais infrações, marque qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde às enumeradas no Código de Ética da Enfermagem:

- a) Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função.
- b) Ter maus antecedentes profissionais.
- c) Cometer infração dolosamente e/ou realizar ato sob emprego real de força física.
- d) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.
- e) Causar danos irreparáveis.

19. A troca do selo d’água do frasco de drenagem torácica é definida como “o ato de esvaziar o frasco de drenagem torácica e colocar novo selo d’água” (BORTOLOZO, et al., 2007, p. 88). Quanto à realização deste cuidado em adultos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A finalidade desse cuidado está em trocar o frasco de drenagem e avaliar o aspecto do líquido drenado.
- b) Pinçar o dreno durante o procedimento e desclampear após ter feito os registros relativos ao procedimento.
- c) Colocar máscara, óculos e luva estéril para realização do procedimento.
- d) Colocar 500 ml de soro fisiológico 0,9% ou água destilada estéril para fazer o selo d’água, marcando, com fita adesiva no frasco, a altura do nível do líquido.
- e) Desprezar o conteúdo do frasco e registrar o volume total drenado, independente do selo d’água.

20. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação ao descrito na referida Portaria, afirma-se que:

- I. O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.
- II. Um dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde é o Centro de Convivência, que é unidade pública, articulada às Redes de Atenção à Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.
- III. As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente de forma individualizada e articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes.
- IV. Dentre os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção residencial de caráter transitório estão os Serviços de Atenção em Regime Residencial, entre os quais Comunidades Terapêuticas, destinadas a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até seis meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- V. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial nas Estratégias de Desinstitucionalização os Serviços Residenciais Terapêuticos, os quais são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, IV.
- b) Apenas I, II, V.
- c) Apenas I, II, III.
- d) Apenas III, IV.
- e) Apenas II, III, IV.

21. Existe um tipo de contraceptivo que está disponível para ser utilizado como um recurso de emergência em vários países, assim como no Brasil, para prevenir a gravidez indesejada (LOUWDERMILK, 2012). Em relação à contracepção de emergência, afirma-se que:

- I. A contracepção de emergência deve ser utilizada por uma mulher assim que possível, dentro de 120 horas após ato sexual desprotegido ou acidente no controle da natalidade.
- II. Não existe nenhuma contraindicação médica para a contracepção de emergência, exceto gravidez e sangramento vaginal anormal e não diagnosticado.
- III. A contracepção de emergência irá proteger a mulher contra a gravidez, se ela tiver relações sexuais desprotegidas nos dias que seguem o tratamento.
- IV. A ingestão de pílulas de contraceptivos de emergência não retarda a ovulação.
- V. O esquecimento do uso de pílula contraceptiva oral por um dia indica a utilização da contracepção de emergência.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, II.
- b) Apenas II, III.
- c) Apenas II, III, IV.
- d) Apenas I, II, III, IV.
- e) I, II, III, IV, V.

22. O câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais comum do sistema reprodutor. A localização acessível do colo tanto para exames celulares quanto para exames histológicos e para o exame direto levou a um refinamento das técnicas diagnósticas, contribuindo para o diagnóstico e tratamento melhorados destes distúrbios (LOUWDERMILK, 2012). Em relação a essa patologia e sua forma de detecção precoce, analise as afirmativas que seguem, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS.

() Cerca de 70% a 80% dos cânceres cervicais são causados por papilomavírus humano (HPV).

() Um sangramento anormal, principalmente após coito, não é um sintoma clássico do câncer invasivo.

() A colposcopia é um procedimento invasivo, porém, bem tolerado pela mulher.

() Caso o resultado do teste de Papanicolaou seja condizente com o achado lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSILs), é recomendada a realização de colposcopia, exceto nas adolescentes.

() A idade média para a ocorrência de câncer cervical varia de 40 a 50 anos.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- F – F – V – F – F.
- F – V – F – V – F.
- V – V – V – F – F.
- V – V – V – V – F.
- V – F – F – V – V.

23. Os distúrbios hipertensivos contribuem significativamente para a morbidade materna e fetal em todo o mundo. A pré-eclâmpsia é um estado hipertensivo exclusivo da gravidez humana e que precisa de um olhar atento por parte da enfermagem (LOUWDERMILK, 2012). Em relação a essa condição, afirma-se que:

- A pré-eclâmpsia ocorre mais frequentemente em mulheres primíparas ou multíparas com um novo parceiro.
- As alterações patológicas que ocorrem na mulher com pré-eclâmpsia são provocadas por interrupções da perfusão placentária e por disfunção das células endoteliais.
- O vaso espasmo generalizado provocado pela pré-eclâmpsia resulta em perfusão tecidual deficiente em todos os sistemas orgânicos, redução da resistência periférica, aumento da PA e aumento da permeabilidade das células endoteliais.
- O exame físico da gestante é um importante instrumento para avaliação em um caso de possível pré-eclâmpsia. É essencial a aferição precisa da pressão arterial e a avaliação do edema, mesmo que sua presença não seja mais incluída na definição dessa patologia, devendo ser avaliado em relação à sua distribuição, grau e formação de cacifo.
- Mulheres com pré-eclâmpsia grave devem ser internadas imediatamente para uma avaliação completa da condição materno-fetal. Porém, para essas avaliações maternas estão incluídos apenas o monitoramento da PA, do débito urinário, do estado de consciência e sinais de trabalho de parto ou descolamento prematuro da placenta.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- Apenas I, II.
- Apenas II, III.
- Apenas II, III, IV.
- Apenas I, II, IV.
- I, II, III, IV, V.

24. “Deve-se estar atento para algumas possibilidades de causas secundárias de hipertensão arterial, para as quais um exame clínico bem conduzido pode ser decisivo” (BRASIL, 2001, p. 19-33). Com base nessa assertiva, analise as afirmativas abaixo, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS.

() Pacientes com relato de hipertensão arterial de difícil controle e apresentando picos tensionais graves e frequentes acompanhados de rubor facial, cefaleia intensa e taquicardia, devem ser encaminhados para unidade de referência secundária.

() Pacientes nos quais a hipertensão arterial surge antes dos 30 anos ou de aparecimento súbito após os 50 anos, sem história familiar para hipertensão arterial, devem ser encaminhados para unidade de referência secundária.

() A anamnese do portador de hipertensão deve ser orientada para alguns pontos como: hábito de fumar; uso exagerado de álcool; ingestão excessiva de sal; aumento de peso; sedentarismo; estresse; utilização de medicamentos como anticoncepcionais, descongestionantes nasais e anti-inflamatórios; história familiar de hipertensão arterial; entre outros.

() A probabilidade de acontecer um evento cardiovascular grave entre os indivíduos considerados do grupo de risco baixo, em homens com idade menor do que 55 anos e mulheres com idade abaixo de 65 anos é menor do que 15%.

() O tratamento da hipertensão inclui apenas duas estratégias: modificação dos hábitos de vida e, se necessário, medicamentos.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- a) V – F – F – V – V.
- b) F – F – V – F – F.
- c) F – V – F – V – V.
- d) V – V – V – F – F.
- e) V – V – V – V – F.

25. O Diabetes atinge a mulher grávida e todas as faixas etárias, sem qualquer distinção de raça, sexo ou condições socioeconômicas, apresentando prevalência, na população adulta, de 7,6% (BRASIL, 2001). Em vista disso, é importante diagnosticá-lo precocemente e investir na prevenção desta patologia. Em relação ao Diabetes mellitus, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O Diabetes mellitus tipo II apresenta forte componente hereditário.
- b) O Diabetes mellitus tipo II sempre é caracterizado pelos sintomas clássicos de hiperglicemia: poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento.
- c) O Diabetes mellitus tipo I apresenta maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens.
- d) A glicemia capilar pode ser utilizada para rastreamento de Diabetes mellitus, devendo-se confirmar o diagnóstico com glicemia plasmática.
- e) O rastreamento do Diabetes mellitus Gestacional é realizado entre a 24^a e a 28^a semanas de gravidez.

26. A doença cardiovascular é a complicação de maior morbimortalidade entre os pacientes com diabetes. Em relação à sintomatologia das três grandes manifestações das doenças cardiovasculares, que são a doença coronariana, a doença cerebrovascular e a doença vascular periférica, analise as afirmativas abaixo:

- I. Angina de peito e infarto do miocárdio podem ocorrer de forma atípica na apresentação e na caracterização da dor devido à presença de neuropatia autonômica cardíaca do diabetes.
- II. Manifestações cerebrais de hipoglicemia podem mimetizar ataques isquêmicos transitórios.
- III. A evolução pós-infarto é pior nos pacientes com diabetes.
- IV. A evolução crônica da precordialgia aos esforços está relacionada à presença de lesão significativa em uma ou mais artérias coronarianas.
- V. A hiperglicemia é um fator de risco adquirido para isquemia, além de tabagismo, colesterol elevado, pressão arterial elevada, obesidade, entre outros.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, II.
- b) Apenas II, III.
- c) Apenas I, II, IV.
- d) Apenas II, III, IV.
- e) I, II, III, IV, V.

27. “Para o atendimento de uma parada cardiorrespiratória, há necessidade da execução de uma série de procedimentos, os quais são fundamentais para a garantia de sucesso da ressuscitação” (JERÔNIMO, 2012, p. 252). Em relação a esses procedimentos, analise as afirmativas a seguir:

- I. A primeira ação do profissional ao identificar a inexistência de responsividade do paciente é chamar ajuda.
- II. Para a abertura das vias aéreas, o profissional deverá realizar hipóextensão da cabeça, colocando a palma de uma das mãos na região frontal do paciente e, com as pontas dos dedos da outra mão, segurar sobre o queixo, tracionando-o para baixo.
- III. O profissional deverá checar o pulso, preferencialmente em artéria femoral, para não impedir os demais passos da ressuscitação.
- IV. Durante a contração torácica o profissional deverá contar as massagens realizadas e proporcionar o retorno do tórax, a fim de promover uma eficaz circulação cardíaca.
- V. Para o tratamento da maioria das arritmias cardíacas, o choque por meio da utilização do desfibrilador aumenta a sobrevivência cardíaca quando associada à aplicação da ressuscitação cardiorrespiratória.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **INCORRETAS**:

- a) Apenas II, III.
- b) Apenas I, II.
- c) Apenas II, III, IV.
- d) Apenas I, II, IV.
- e) I, II, III, IV, V.

28. “O choque é definido como uma situação de hipoperfusão tecidual, secundária ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio ou na incapacidade da célula utilizar o oxigênio, resultante em metabolismo anaeróbio, cuja energia produzida é insuficiente para suprir o desempenho das células, resultando em disfunção dos órgãos vitais. Os estados de choque podem ser classificados de acordo com a etiologia e o padrão hemodinâmico” (CHEREGATTI; AMORIM, 2010, p. 397). Pensando nos diversos tipos de choque que podem acontecer, assinale a alternativa **CORRETA**:

- Dentre os sinais e sintomas apresentados por um paciente em choque cardiogênico está a pressão arterial sistólica < 100 mmHg ou 20 mmHg abaixo do nível normal do paciente em repouso.
- No choque hipovolêmico, o débito cardíaco apresenta-se parcialmente compensado por meio da diminuição da frequência cardíaca e do aumento da contratilidade miocárdica.
- No choque cardiogênico há uma incapacidade do miocárdio em realizar o débito cardíaco eficaz para proporcionar a demanda metabólica do organismo, havendo uma hipoperfusão tecidual.
- A administração de hemoderivados/hemocomponentes no choque hipovolêmico tem como única finalidade aumentar o débito cardíaco.
- Os efeitos hemodinâmicos evidenciados pelo choque séptico são: débito cardíaco elevado, resistência vascular sistêmica diminuída e a hipertensão.

29. O processo de administração de medicamentos é complexo e envolve vários cuidados (CHEREGATTI; JERÔNIMO, 2011). Em relação às diversas vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS:

- Inconsciência, dificuldade de deglutição, vômito e jejum para exames são contraindicações para administração de medicamentos por via oral.
- Na administração de medicamento por via sublingual, o profissional deve permanecer ao lado do paciente por alguns minutos, pois os efeitos colaterais ocorrem imediatamente após a administração por esta via.
- Quando o paciente está hipotenso ou tem um aporte sanguíneo deficiente para o músculo, o medicamento administrado por via intramuscular pode precipitar-se ou não ser absorvido.
- Em caso de administração de medicamento por via endovenosa pode ocorrer uma flebite, a qual é ocasionada ou por problema na técnica de inserção do cateter ou por condição da veia utilizada.
- Na utilização da via subcutânea, uma complicação bastante comum é a lipodistrofia, a qual não tem relação com o uso repetido do sítio de injeção.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

- V – F – F – V – V.
- V – F – V – F – F.
- F – F – V – F – F.
- F – V – F – V – V.
- V – V – V – V – F.

30. As feridas podem ser classificadas quanto à causa, etiologia e agente causador (SILVA, 2007). No caso das feridas cirúrgicas, as quais são intencionais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As feridas podem cicatrizar por primeira, segunda ou terceira intenção, variando somente quanto ao grau de perda tecidual.
- b) A infecção da ferida cirúrgica se desenvolve até 40 dias após a realização do procedimento.
- c) Os drenos abertos podem evitar a contaminação das feridas uma vez que evitam que fique conteúdo líquido no interior da ferida.
- d) Nas feridas limpas não há processo inflamatório e não ocorre penetração no trato respiratório, digestivo e geniturinário.
- e) Em grandes queimados, casos em que ocorre grande perda tecidual, normalmente as feridas cicatrizam por segunda intenção e, após, por terceira intenção.

31. A Lei nº 8080/90 preconiza que a política de recursos humanos na área da saúde deve ser formalizada e executada de forma articulada pelas diferentes esferas de Governo, de acordo com os seguintes objetivos:

- I. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.
- II. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- III. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento poderão ser exercidos em regime de tempo integral ou parcial.
- IV. Os servidores poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, IV.
- b) Apenas I, II, IV.
- c) Apenas II, III.
- d) Apenas I, III, IV.
- e) I, II, III, IV.

32. No que se refere ao Capítulo II dos Princípios e Diretrizes da Lei nº 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- IV. Direito à informação, às pessoas assistidas; divulgação dos diagnósticos nos serviços de saúde.

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) **INCORRETA(S)**:

- a) Apenas IV.
- b) Apenas I, II.
- c) Apenas II, III.
- d) Apenas II, III, IV.
- e) I, II, III, IV.

33. No Artigo 35 da Lei nº 8080/90, relativo ao financiamento, são estabelecidos os critérios para os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. Para a definição do montante destinado é utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

- () Perfil demográfico da região.
- () Indicadores sociológicos e morbidades específicas da área a ser coberta.
- () Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- () Desempenho técnico, político e financeiro no período anterior.
- () Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
- () Previsão do plano bienal de investimentos da rede.
- () Ressarcimento do atendimento aos serviços prestados para os serviços complementares.

Analise as afirmativas acima, identificando com “V” as **VERDADEIRAS** e com “F” as **FALSAS**, assinalando a seguir a alternativa **CORRETA**, na sequência de cima para baixo:

- a) F – F – V – F – F – V – F.
- b) F – V – F – V – F – F – V.
- c) V – F – V – F – V – F – V.
- d) V – F – V – F – V – V – V.
- e) V – V – V – F – V – V – F.

34. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Municipal de Saúde.
- IV. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas II, IV.
- b) Apenas II, III.
- c) Apenas III, IV.
- d) Apenas I, II, IV.
- e) I, II, III, IV.

35. De acordo com o Manual de Rede de Frio (BRASIL, 2013), na conservação das vacinas no refrigerador é necessário obedecer a distribuição adequada das mesmas. Para isso, na primeira prateleira devem ser armazenados os imunobiológicos que _____ ser submetidos à temperatura negativa. As vacinas contra _____ e _____ são exemplos de imunobiológicos que devem ser armazenados na primeira prateleira.

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem **CORRETAMENTE** as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) Não podem / BCG e Febre Amarela
- b) Podem / Dupla Adulto e Hepatite B
- c) Não podem / Pneumococo e Tríplice Viral
- d) Podem / Febre Amarela e Vacina Poliomielite (atenuada)
- e) Podem / Febre Amarela/ Pentavalente

36. A prevenção da Hepatite B através da vacinação está descrita no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (BRASIL, 2014). No que se refere à vacina hepatite B (recombinante), analise as afirmativas:

- I. É apresentada sob a forma líquida, em frasco unidose ou multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos.
- II. A vacina contém o antígeno recombinante de superfície (HBsAg), que é purificado por vários métodos físico-químicos e adsorvido por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante.
- III. Para recém-nascidos deve ser administrada, preferencialmente, após as primeiras semanas de vida, na primeira visita ao serviço de saúde.
- IV. O esquema de administração corresponde, de maneira geral, a duas doses com intervalo de 60 dias entre a primeira e a segunda dose.
- V. O volume da vacina hepatite B (recombinante) monovalente a ser administrado é de 0,5 ml até os 19 anos de idade e 1 ml a partir dos 20 anos.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, II, V.
- b) Apenas I, II, III.
- c) Apenas II, III, IV.
- d) Apenas I, II, III, V.
- e) I, II, III, IV, V.

37. Para a prevenção da tuberculose é utilizada a vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin), a qual está incluída no calendário básico de vacinação e disponível na rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014). Em relação à vacina BCG é possível afirmar:

- I. A vacina está contraindicada para as crianças infectadas pelo HIV que apresentem sinais clínicos da doença ou de imunossupressão ao nascimento.
- II. Podem ser vacinados com BCG recém-nascidos com peso menor do que dois quilos.
- III. É administrada uma dose ao nascimento e 2 doses de reforço, aos 12 meses e aos 10 anos.
- IV. O Ministério da Saúde (MS) orienta a vacinação de crianças que não apresentem cicatriz vacinal, mesmo que possuam história positiva de vacinação com BCG.
- V. A reatividade cutânea produzida pela BCG, quando aplicada por via intradérmica, tem evolução distinta quando se compara a primovacinação com a revacinação.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas II, III.
- b) Apenas I, IV, V.
- c) Apenas II, III, IV.
- d) Apenas I, II, III, V.
- e) I, II, III, IV, V.

38. No Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (BRASIL, 2014) está incluída a vacina Pentavalente como uma das vacinas do calendário vacinal da criança. Quanto à via de administração, dose, doenças as quais protege e idade em que o esquema é iniciado, a alternativa **CORRETA** é:

- a) A vacina é administrada pela via subcutânea; dose de 0,5ml; protege contra o tétano, difteria, coqueluche, doenças causadas pelo *Haemophilus influenzae b* e hepatite B; iniciada aos 3 meses de vida.
- b) A vacina é administrada pela via intramuscular; dose de 0,5ml; protege contra o tétano, difteria, coqueluche, doenças causadas pelo *Haemophilus influenzae b* e hepatite B; iniciada aos 2 meses de vida.
- c) A vacina é administrada pela via intramuscular; dose de 1,0ml; protege contra o tétano, meningite, doenças causadas pelo *Haemophilus influenzae b*, hepatite B e sarampo; iniciada aos 2 meses de vida.
- d) A vacina é administrada pela via oral; dose de 0,5ml; protege contra o tétano, difteria, coqueluche, doenças causadas pelo *Haemophilus influenzae b* e hepatite B; iniciada aos 2 meses de vida.
- e) A vacina é administrada pela via intramuscular; dose de 0,5ml; protege contra o sarampo, caxumba, rubéola, difteria, coqueluche; iniciada aos 2 meses de vida.

39. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), do Ministério da Saúde, foi instituída pela Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015 e tem, entre os seus eixos temáticos, o aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Identifique com “V” (VERDADEIRO) as ações estratégicas que pertencem ao eixo sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável e com “F” (FALSO) as ações estratégicas que não pertencem ao eixo sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável.

() A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

() A Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS.

() A Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA).

() A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

() A implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, para Crianças de Primeira Infância, o incentivo ao uso de Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL).

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, na sequência de cima para baixo, é:

a) V – F – V – F – V.

b) V – V – F – V – V.

c) V – V – V – V – F.

d) V – F – V – F – F.

e) F – V – V – F – V.

40. A questão da saúde de adolescentes e jovens relacionada à DST e AIDS é uma preocupação constante nos serviços de saúde, de tal forma que o Ministério da Saúde propõe as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (BRASIL, 2010), baseadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Neste sentido, analise a situação-problema a seguir apresentada, avaliando, entre as condutas descritas nos itens abaixo, as que devem ser adotadas pela enfermeira durante a consulta de enfermagem a esse adolescente. Adolescente do sexo masculino, de 16 anos de idade, chega sozinho e muito preocupado à Unidade Básica de Saúde da Família, sendo encaminhado à enfermeira. No decorrer da consulta de enfermagem foi detectado que o paciente adolescente não usa preservativo em suas relações sexuais e que tem o sexo oral como prática sexual habitual. Ao examinar a cavidade oral, a enfermeira verifica várias cáries dentárias e aftas, identificando fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS, entre os quais o desconhecimento da transmissão das DST e do sexo seguro, além de exposição a fatores de agravos para sua saúde.

I. Orientar o adolescente a evitar o consumo de alimentos ácidos, para não piorar as aftas; reforçar a necessidade de higienização oral, visando à prevenção de cárie e encaminhá-lo para tratamento odontológico.

II. Entregar materiais educativos sobre DST/AIDS; prescrever medicamentos sintomáticos para dor e para as aftas; acompanhar a evolução dos problemas detectados, e solicitar comparecimento do responsável para conclusão do atendimento.

III. Convidar o adolescente a participar de atividades educativas desenvolvidas na comunidade e na Unidade Básica de Saúde.

IV. Orientar sobre as DST/HIV/AIDS e hepatites virais, com enfoque nas formas de transmissão, sinais e sintomas, comportamentos e atitudes de risco e formas de prevenção, com ênfase no sexo seguro.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

a) Apenas I, II, III.

b) Apenas I, II, IV.

c) Apenas II, III, IV.

d) Apenas I, III, IV.

e) I, II, III, IV.