

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A organização didático-pedagógica pode ser entendida como o conjunto de decisões coletivas que orientam a realização das atividades escolares, visando garantir o processo pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 61** Os seguintes componentes fazem parte da organização didático-pedagógica de uma escola: modalidades de ensino da Educação Básica; fins e objetivos da Educação Básica; e organização curricular, estrutura e funcionamento da escola.
- 62** O processo de matrícula e transferência dos registros e arquivos escolares não é componente pertencente à organização didático-pedagógica de uma escola.
- 63** A organização didático-pedagógica da escola é o único instrumento orientador da construção do conhecimento em sala de aula que deve contemplar ações que permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual.
- 64** A organização didático-pedagógica deve orientar a realização das atividades escolares, considerando a questão metodológica apenas como uma ferramenta, e não como a essência da educação.

O mundo contemporâneo, em constante processo de transformação e inovação tecnológica e com suas consequentes alterações no âmbito do mundo do trabalho, demanda a construção de um projeto de Educação Profissional que supere a dualidade entre o ensino geral, propedêutico, e o ensino técnico, de forma a deslocar o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho para o desenvolvimento humano, tendo como dimensões indissociáveis a aprendizagem, a cidadania, o trabalho, as comunicações, a ciência e a tecnologia, entre outras.

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Profissional e a Distância. Secretaria de Educação do Distrito Federal (com adaptações).

Em relação ao Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue os itens a seguir.

- 65** O Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Profissional e a Distância é um documento que possui por objetivo delimitar um currículo único para a Educação Profissional no DF, estabelecendo, assim, as linhas gerais e as diretrizes curriculares para o desenvolvimento da Educação Profissional da rede pública de ensino.
- 66** As matrizes curriculares dos cursos de Educação Profissional, independentemente do seu eixo tecnológico, devem pautar-se pela formação integral dos estudantes, de forma a promover-lhes condições de apropriação dos fundamentos sociais, científicos e tecnológicos necessários ao exercício profissional.

Julgue os próximos itens com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

- 67** A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-graduação.
- 68** A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes modalidades, excluindo a EJA, e com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura.

A odontologia preventiva e a saúde pública têm como meta alcançar de fato o conjunto da população, deixando claro que a comunidade, e não apenas o indivíduo, é o alvo das transformações mais recentes ocorridas na odontologia. A respeito desse tema, julgue os itens subsequentes.

- 69** A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária constituem-se tradicionalmente como os três níveis de atenção odontológica.
- 70** O índice CPO-D expressa a média de dentes cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos, mantendo-se como o ponto básico de referência para o diagnóstico das condições dentais e para a formulação e avaliação de programas de saúde bucal. Recentemente, esse índice passou a ser denominado de índice CPR-D, uma vez que a denominação correta é “restaurados” e não “obturados”.
- 71** O Sistema Único de Saúde (SUS) destina-se a oferecer serviços de atenção à saúde, inclusive odontológicos, de acesso universal e igualitário, dentro de um modelo público com atenção voltada especialmente para os mais pobres.

Acerca das normas de biossegurança, julgue os itens seguintes.

- 72** Quanto à imunização de profissionais da odontologia, as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde são contra HIV (vírus da imunodeficiência humana), hepatite B, *influenza*, tríplice viral e dupla tipo adulto.
- 73** Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização em autoclave variam de acordo com o equipamento e encontram-se dentro de: 121° C a 127° C, por quinze a trinta minutos, e 132° C a 134° C, por quatro a sete minutos de esterilização.

O exame minucioso da cavidade bucal consiste em uma das etapas fundamentais do exame clínico de um paciente. Para que o cirurgião-dentista possa formular corretamente as hipóteses de diagnóstico e, conseqüentemente, chegar a um diagnóstico final, é necessário o conhecimento detalhado da cavidade bucal e sua anatomia e das possíveis variações que possa encontrar. Acerca desse assunto, julgue os próximos itens.

- 74** Clinicamente, os grânulos de Fordyce apresentam-se como múltiplas pápulas de coloração branco-amarelada, com mucosa íntegra, podendo estar localizadas nas mucosas labiais. Essas glândulas sebáceas ectópicas também podem estar localizadas nas mucosas jugal e retrocomissural.
- 75** Um sulco central no dorso da língua, de onde saem fissuras secundárias em direção à sua borda lateral, resultando em um aspecto clínico semelhante ao de uma trama de pelos ou cabelos, caracteriza a alteração na língua denominada de língua pilosa.

O termo cárie dentária é usado para descrever os resultados – sinais e sintomas – de uma dissolução química do substrato dentário causada pelos eventos metabólicos ocorridos no biofilme dentário que cobre a área afetada. Essa destruição pode afetar o esmalte, o cemento e envolver todo o complexo dentinopulpar. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 76** A cavidade bucal de um recém-nascido geralmente não possui microbiota. Estudos têm demonstrado que a aquisição da microbiota bucal residente de estreptococos e espécies gram-negativas em crianças ocorre predominantemente de mãe para filho, tendo a saliva como via principal de transmissão.
- 77** No processo de cárie dentária, a perda mineral dos tecidos dentários é causada por ácidos, especialmente o ácido láctico, produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose.
- 78** A queda do pH resultante da ação dos ácidos ocasiona a dissolução do tecido dentário por meio do transporte de íons cálcio e potássio para o meio ambiente bucal.
- 79** Por serem as células de localização mais periférica na polpa dentária, os odontoblastos representam as primeiras células a entrar em contato com os produtos bacterianos e com os componentes bioativos da matriz dentinária liberados durante a desmineralização.

A respeito da etiopatogenia e da prevenção da doença periodontal, julgue os itens subsecutivos.

- 80** Estudos epidemiológicos e clínicos estabeleceram a compreensão atual de que a gengivite se constitui como o estágio inicial da doença periodontal, que, se não tratada, evolui para uma periodontite, o estágio mais avançado da gengivite.
- 81** O controle do biofilme dentário por meios químicos, como colutórios contendo digluconato de clorexidina, óleos essenciais ou cloreto de cetilpiridínio, representa uma medida coadjuvante de prevenção da doença periodontal.

No que diz respeito aos princípios gerais de radiologia e interpretação radiográfica, julgue os itens subsequentes.

- 82** Na técnica radiográfica da bisettriz, o feixe de raios-X deve ser orientado perpendicularmente à linha imaginária que divide o ângulo formado pelo plano do dente e da película radiográfica para que a imagem resultante apresente proporções similares às do objeto examinado.
- 83** Para um exame radiográfico preciso das faces interproximais das porções coronárias de dentes posteriores, além de estruturas periodontais, como a crista óssea alveolar, a técnica *bite-Wing* deve ser a técnica de escolha.

Julgue os itens seguintes com relação ao preparo cavitário e à utilização de materiais odontológicos: forradores e restauradores.

- 84** Para restaurações temporárias em dentes com preparos cavitários Classe III e V, tanto os cimentos de óxido de zinco e eugenol (OZE) quanto os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são indicados, por possuírem adesividade. Porém, em áreas estéticas, o CIV é o material de escolha.
- 85** As resinas compostas *bulk fill* possuem, como principal vantagem, a possibilidade de serem inseridas em um único incremento. Isso se deve ao fato de esses novos compósitos odontológicos não sofrerem contração de polimerização.

Uma paciente de trinta anos de idade, na vigésima oitava semana de gravidez, foi atendida em consultório odontológico apresentando gengivite, lesões de cárie extensas nas faces proximais dos quatro incisivos superiores, com imagens radiolúcidas próximas às respectivas câmaras pulpares, porém assintomáticos, ausência dos primeiros molares superiores, segundos molares superiores restaurados em resina composta na face oclusal, raízes residuais nas regiões dos dentes 34, 35, 36, 37, 44, 45 e 46, e dente 47 com remanescente coronário méso-vestibular, porém extensa destruição coronária distolingual, com invasão de espaço biológico.

Considerando esse caso clínico hipotético, julgue os itens seguintes.

- 86** A bupvacaina deve ser o anestésico de escolha nesse caso, por atravessar a placenta mais rapidamente que os demais agentes anestésicos locais existentes, o que diminui o tempo de contato com o feto, reduzindo o risco de cianose fetal.
- 87** Caso seja necessária a prescrição de analgésico, pode-se prescrever tanto o paracetamol (500 a 750 mg) quanto a dipirona (500 mg), respeitando-se o limite máximo de três doses diárias, com intervalos de quatro horas, por tempo restrito.
- 88** No planejamento cirúrgico, definiu-se realizar a exodontia de todas as raízes residuais por meio de técnica primeira, com uso dos fórceps 18R e 18L. Esses dois fórceps são indicados para exodontia de raízes de dentes posteriores e inferiores direito e esquerdo, respectivamente.
- 89** A exodontia do dente 47 está contraindicada, uma vez que a manutenção desse dente é fundamental para a reabilitação do arco inferior. Para tanto, a realização da gengivectomia na região distolingual do dente será necessária para permitir a adequada reabilitação.
- 90** O quadro de gengivite pode estar relacionado ao aumento da atuação de hormônios ovarianos na microcirculação gengival, bem como a uma maior produção de prostaglandinas na mulher grávida, que acarretariam a exacerbação da resposta inflamatória.
- 91** Uma vez assintomáticos, o diagnóstico provável para os quadros clínicos dos quatro incisivos superiores é o de necrose pulpar.
- 92** A realização de *mock-up* é indicada para a restauração em resina composta dos incisivos centrais e laterais superiores da paciente, por apresentarem lesões de cárie extensas localizadas nas faces proximais.
- 93** A arcada inferior da paciente, após as extrações das raízes residuais e mantido o dente 47, será classificada como arcada parcialmente desdentada Classe I de Kennedy modificação 2.
- 94** Caso a paciente opte por reabilitar a região edêntula da mandíbula por meio de implantes dentários, a redução do trabeculado ósseo que ocorrerá após a exodontia será revertida. Um implante dentário pode manter tanto a largura quanto a altura óssea.

Com relação à odontopediatria, ao diagnóstico e plano de tratamento e aos procedimentos em clínica odontológica infantil, julgue os itens a seguir.

- 95** Quanto ao processo de erupção dos dentes permanentes para ambos os gêneros, os primeiros molares erupcionam por volta dos seis, sete anos de idade. Na sequência, os próximos dentes a erupcionar são os incisivos centrais.
- 96** Para a realização de anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior em crianças com dentição decídua, a técnica é semelhante à indicada para adultos, entretanto a inclinação da seringa deve se dar de modo que a ponta da agulha fique ligeiramente abaixo do plano oclusal.

Julgue os itens que se seguem em relação aos princípios gerais de ortodontia e suas indicações.

- 97** Para a ortodontia preventiva, as maloclusões estão mais relacionadas com as alterações e a ordem de erupção que com as variações na cronologia eruptiva.
- 98** Quando hábitos de sucção prolongados persistem durante o período da dentadura mista, podem provocar espaçamento dos incisivos superiores, inclinação lingual dos incisivos inferiores, mordida aberta anterior e arco superior estreito.

Embora os traumatismos dentoalveolares possam ocorrer em qualquer idade, a faixa etária mais comum em que elas afetam os dentes permanentes varia de oito a doze anos de idade, principalmente como resultado de acidentes em áreas de recreação ou durante atividades esportivas. No que se refere a essa abordagem, julgue os itens subsequentes.

- 99** Quando não é possível, no local do acidente, o replante imediato de um dente que sofreu avulsão, deve-se armazená-lo em um meio apropriado até a chegada do paciente ao consultório odontológico. São meios adequados: leite; saliva; e solução isotônica de cloreto de sódio.
- 100** As chances de reparação tecidual em casos de fraturas coronoradiculares em que a fratura dentária ocorrer ao nível da crista óssea alveolar são superiores se comparadas às chances de reparação tecidual em casos de fraturas radiculares ocorridas nos terços médio ou apical.