

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – OS COITADINHOS

Clóvis Rossi – *Folha de São Paulo*, 25/02/01

SÃO PAULO – Anestesiada e derrotada, a sociedade nem está percebendo a enorme inversão de valores em curso. Parece aceitar como normal que um grupo de criminosos estenda faixas pela cidade e nelas fale de paz.

Que paz? Não foram esses mesmos adoráveis senhores que decapitaram ou mandaram decapitar seus próprios companheiros de comunidade durante as recentes rebeliões?

A sociedade ouve em silêncio o juiz titular da Vara de Execuções Penais, Otávio Augusto Barros Filho, dizer que não vai resolver nada a transferência e isolamento dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital ou Partido do Crime).

Digamos que não resolve. Qual é a alternativa oferecida pelo juiz? Libertá-los todos? Devolvê-los aos presídios dos quais gerenciam livremente seus negócios e determinam quem deve viver e quem deve morrer?

Vamos, por um momento que seja, cair na real: os presos, por mais hediondos que tenham sido seus crimes, merecem, sim, tratamento digno e humano. Mas não merecem um micrograma que seja de privilégios, entre eles o de determinar onde cada um deles fica preso.

Há um coro, embora surdo, que tenta retratar criminosos como coitadinhos, vítimas do sistema. Calma lá. Coitadinhos e vítimas do sistema, aqui, são os milhões de brasileiros que sobrevivem com salários obscenamente baixos (ou sem salário algum) e, não obstante, mantêm-se teimosamente honestos.

Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente, aqui, são os parentes dos abatidos pela violência, condenados à prisão perpétua que é a dor pela perda de alguém querido, ao passo que o criminoso não fica mais que 30 anos na cadeia.

Parafrazeando Millôr Fernandes: ou restaure-se a dignidade para todos, principalmente para os coitadinhos de verdade, ou nos rendamos de uma vez à Crime Incorporation.

1 - O texto foi elaborado a propósito das rebeliões de presos nas prisões paulistas no mês de fevereiro de 2001; a melhor explicação para a escolha do título *os coitadinhos* é:

- a) a referência ambígua aos presos e às pessoas que sofrem pela ineficiência do sistema;
- b) a alusão às pessoas vítimas de salários baixos e teimosamente honestas;
- c) a existência de presos que, por orquestração surda, são tidos como vítimas do sistema;
- d) o fato de algumas pessoas padecerem eternamente pela perda de entes queridos;
- e) a referência aos presos que sofrem maus-tratos nas prisões brasileiras.

2 - No início do texto, o jornalista fala de uma sociedade “anestesiada e derrotada”; o segmento do texto que melhor demonstra a derrota de nossa sociedade é:

- a) “Há um coro, embora surdo, que tenta retratar criminosos como coitadinhos, vítimas do sistema”;
- b) “A sociedade ouve em silêncio o juiz titular da Vara de Execuções Penais, Otávio Augusto Barros Filho, dizer que não vai resolver nada a transferência e isolamento dos líderes...”;
- c) “...os presos, por mais hediondos que tenham sido seus crimes, merecem, sim, tratamento digno e humano.”;
- d) “Mas não merecem um micrograma que seja de privilégios, entre eles o de determinar onde cada um deles fica preso.”;
- e) “Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente, aqui, são os parentes dos abatidos pela violência...”.

3 - “Parafrazeando Millôr Fernandes: ou restaure-se a dignidade para todos, principalmente para os coitadinhos de verdade, ou nos rendamos de uma vez à Crime Incorporation”; o comentário correto a respeito deste último parágrafo do texto é:

- a) uma paráfrase corresponde ao desenvolvimento das idéias de alguém, modificando-se levemente as idéias originais;
- b) com o pronome *todos* o texto quer referir-se àqueles que, de fato, sofrem de verdade: os de baixos salários, os desempregados e os que perderam entes queridos;
- c) a segunda ocorrência da conjunção *ou*, neste segmento, tem valor de adição;
- d) o fato de a organização criminosa receber nome inglês é de cunho irônico;
- e) para Millôr Fernandes, segundo o que foi parafrazeado no texto, a dignidade deve ser restaurada somente para os coitadinhos de verdade.

4 - Como se pode ver no texto, *obscenamente* é um vocábulo grafado com SC; o item abaixo em que um dos vocábulos está *erroneamente* grafado é:

- a) ressuscitar / ascensão / piscina;
- b) adolescente / discente / indescente;
- c) convalescer / crescer / rescindir;
- d) abscesso / florescente / transcender;
- e) renascença / piscicultura / miscelânea.

5 - "...merecem, sim, tratamento digno e humano."; o uso do vocábulo *sim* significa que:

- a) se trata de uma verdade universalmente aceita;
- b) o jornalista quer confirmar o que dizem os presos;
- c) o artigo escrito apresenta certo tom irônico;
- d) o jornalista afirma algo que pode receber opiniões opostas;
- e) nem todos os presos são bem tratados nas prisões brasileiras.

6 - "Digamos que não resolva."; em termos argumentativos, o segmento anterior indica:

- a) uma hipótese sobre fato futuro sobre a qual o texto contra-argumenta;
- b) uma inferência segura sobre fatos previsíveis que o jornalista condena;
- c) um argumento do juiz, condenado provisoriamente pelo jornalista;
- d) um argumento com o qual o jornalista pretende dar razão ao juiz;
- e) um pensamento negativista e comum entre os membros de uma sociedade derrotada.

7 - "Não foram esses mesmos adoráveis senhores..."; neste segmento ocorre um exemplo de uma figura denominada:

- a) metáfora;
- b) metonímia;
- c) ironia;
- d) eufemismo;
- e) hipérbole.

8 - O segmento do texto que apresenta um sujeito posposto ao verbo é:

- a) "Anestesiada e derrotada, a sociedade nem está percebendo a enorme inversão de valores em curso.";
- b) "Parece aceitar como normal que um grupo de criminosos estenda faixas pela cidade e nelas fale de paz.";
- c) "Há um coro, embora surdo, que tenta retratar criminosos como coitadinhos,...";
- d) "Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente, aqui, são os parentes dos abatidos pela violência...";
- e) "Mas não merecem um micrograma que seja de privilégios...".

9 - "... os presos, por mais hediondos que tenham sido seus crimes, merecem, sim, tratamento digno e humano. Mas não merecem um micrograma que seja de privilégios, entre eles o de determinar onde cada um deles fica preso."; nesse segmento do texto há uma série de vocábulos que se referem a elementos anteriores. O item em que a correspondência entre os dois NÃO está perfeita é:

- a) "...por mais hediondos QUE tenham sido..." - seus crimes;
- b) "...entre ELES..." - privilégios;
- c) "...O de determinar..." - privilégio;
- d) "...um micrograma QUE seja..." - micrograma;
- e) "...o de determinar onde cada um DELES..." - presos.

10 - "Vamos, por um momento que seja, cair na real..."; a regra abaixo que justifica o emprego das vírgulas nesse segmento do texto é:

- a) separar elementos que exercem a mesma função sintática;
- b) isolar ou aposto;
- c) isolar o adjunto adnominal antecipado;
- d) indicar a supressão de uma palavra;
- e) marcar a intercalação de elementos.

CLÍNICA MÉDICA

11 - Homem, 22 anos com asma brônquica persistente e sintomas noturnos; deverá usar como droga de primeira linha, de forma inalatória:

- a) fenoterol;
- b) terbutalina;
- c) triamcinolona;
- d) brometo de ipatrópio;
- e) salbutamol.

12 - Mulher, 67 anos com poliartrite aditiva em ombros, tornozelos e punhos de caráter cíclico, tem como hipótese diagnóstica principal:

- a) osteoartrose;
- b) fibromialgia;
- c) osteoporose;
- d) lupus eritematoso;
- e) artrite reumatóide.

13 - Homem, 85 anos, hipertenso em uso prolongado de hidroclorotiazida 50 mg/dia, com fratura de colo de fêmur à direita, é operado. Utilizando cetoprofeno 100mg/dia, apresenta, no sexto dia de pós-operatório, hiponatremia, diurese preservada, isostenúria e elevação da creatinina sérica. O diagnóstico clínico é:

- a) pielonefrite aguda;
- b) nefrite túbulo intersticial;
- c) síndrome nefrítica;
- d) glomerulonefrite aguda;
- e) síndrome nefrótica.

14 - Homem, 55 anos com história familiar de diabetes mellitus (DM), realizou, de rotina, os seguintes exames: glicemia de jejum = 120 mg/dl e teste oral de tolerância à glicose = 180 mg/dl. Pode-se afirmar que há:

- a) intolerância à glicose;
- b) diabetes mellitus tipo 2;
- c) normalidade;
- d) diabetes insípido;
- e) erro laboratorial.

15 - Mulher de 73 anos com sinais clínicos de demência; para exclusão de causa secundária, deve-se solicitar o seguinte exame laboratorial:

- a) ácido fólico;
- b) frutossamina;
- c) hormônio tireoestimulante (TSH);
- d) creatinina;
- e) ferritina.

16 - Mulher, 42 anos com hipertensão arterial estágio 2; índice de massa corporal (IMC) de 32 Kg/m²; ácido úrico sérico = 12,0 mg/dl; glicemia de jejum = 132 mg/dl e colesterolemia = 260 mg/dl. A melhor droga, com sua dose diária, para iniciar seu tratamento anti-hipertensivo, é:

- a) hidroclorotiazida 25 mg;
- b) amlodipina 15 mg;
- c) captopril 12,5 mg;
- d) losartan 50 mg;
- e) alfa metil dopa 250 mg.

17 - Homem de 18 anos, com parasitose intestinal, apresenta quadro clínico de má absorção; o diagnóstico mais provável é:

- a) amebíase;
- b) giardíase;
- c) ascariíase;
- d) teníase;
- e) oxiuríase.

18 - Mulher, 28 anos, apresenta quadro clínico de pneumoperitônio por provável perfuração de úlcera péptica. O sinal semiológico que auxilia no diagnóstico de pneumoperitônio:

- a) Giordano;
- b) Murphy;
- c) Jobert;
- d) Blumberg;
- e) Romberg.

19 - Homem, 25 anos, com pneumonia adquirida na comunidade, relata que cinco dias antes apresentou diarreia, rash cutâneo, cefaléia e tonteados. O agente causal mais provável é do grupo:

- a) legionela;
- b) estafilococos;
- c) estreptococos;
- d) hemófilos;
- e) micobactéria.

20 - Mulher, 31 anos, usa fórmula para emagrecimento e apresenta hipocalcemia. O distúrbio ácido-base que pode estar associado é:

- a) acidose metabólica;
- b) alcalose respiratória;
- c) acidose mista;
- d) alcalose metabólica;
- e) acidose respiratória.

PSIQUIATRIA

21 - A psicose de Korsakoff caracteriza-se por:

- a) liberação fácil de impulsos agressivos e eróticos;
- b) delírio de ciúme e comportamento agressivo;
- c) disforia com turvação de consciência;
- d) amnesia retro-anterógrada e fabulações;
- e) hipertímia e para-respostas.

22 - Em relação à demência e ao delirium pode-se dizer que:

- a) ambos apresentam flutuação do nível de consciência;
- b) promovem perturbação aguda do ciclo de sono-vigília;
- c) na demência há um comprometimento cognitivo global ao contrário do delirium;
- d) ambos apresentam alterações psicomotoras e alucinações;
- e) o delirium pode apresentar-se sobreposto à demência.

23 - O uso de cocaína por mulheres grávidas envolve o risco de:

- a) alcalose na mãe e bebê anorético;
- b) descolamento prematuro da placenta;
- c) persistência de vômitos durante toda a gestação;
- d) gestação prolongada por mais de 15 dias;
- e) feto com elevada massa corporal.

24 - No transtorno factício, o paciente apresenta uma:

- a) invenção de sintomas motivada por incentivos externos;
- b) despersonalização pré-psicótica;
- c) histeria de conversão;
- d) sintomas fictícios agravando um quadro físico já existente;
- e) produção intencional de sintomas sem objetivo identificável.

25 - Entre as doenças neurológicas seguintes, a que está mais freqüentemente associada com depressão é:

- a) epilepsia;
- b) doença de Alzheimer;
- c) doença de Huntington;
- d) doença de Parkinson;
- e) tumor cerebral.

26 - A porcentagem de pacientes com AIDS que desenvolvem síndrome neuropsiquiátrica é em torno de:

- a) menos de 10%;
- b) 30%;
- c) 60%;
- d) 80%;
- e) acima de 90%.

27 - Encefalopatia etílica ou de Wernicke caracteriza-se por:

- a) nistagmo, oftalmoplegia, ataxia e confusão global;
- b) demência, polineurite, amnesia global, confabulação;
- c) déficit cognitivo global, alucinações auditivo-verbais, confusão mental, amnésia retrógrada;
- d) delirium, alucinações tácteis, sugestibilidade, perda do controle esfinteriano;
- e) abasia, diminuição da sensibilidade profunda, polineurite, incoordenação motora.

28 - Um *sintoma de segunda ordem*, segundo os critérios de Kurt Schneider para esquizofrenia, é:

- a) percepção delirante;
- b) perplexidade;
- c) pensamentos audíveis;
- d) roubo do pensamento;
- e) difusão do pensamento.

29 - Os sintomas predominantes nas psicoses delirantes agudas ou *bouffées* delirantes são os seguintes:

- a) delírios, alucinações visuais e tácteis, desorientação, alteração da psicomotricidade;
- b) vivências delirantes, alucinoses, desorientação, alteração da vontade;
- c) alucinações, transtorno da memória, delírios, afetividade preservada;
- d) delírios, alucinações, transtorno da consciência, alteração da afetividade;
- e) cognições delirantes, alucinações, orientação e afetividade preservadas.

30 - A apresentação clínica do quadro de transtorno do pânico pode ser semelhante a:

- a) carcinoma de pâncreas;
- b) epilepsia (pequeno mal);
- c) feocromocitoma;
- d) infarto de mesentério;
- e) hipertiroidismo.

31 - O transtorno abaixo que está mais associado à ansiedade é:

- a) depressão;
- b) esquizofrenia;
- c) mania;
- d) psicoses atípicas;
- e) distúrbio de ajustamento.

32 - O tratamento do obeso não pode ficar comumente confinado ao psiquiatra; a presença do internista se impõe em virtude de:

- a) íleo paralítico;
- b) esofagite de refluxo;
- c) hipoventilação pulmonar;
- d) tenosinovite do membro inferior;
- e) pancreatite.

33 - Na avaliação de um paciente admitido após ingestão deliberada de doses excessivas de medicamento(s), é indicador de alto nível de intenção suicida:

- a) ter diagnóstico de depressão melancólica;
- b) ter planejado o ato de forma a não ser descoberto por outra pessoa;
- c) se o paciente demonstra ambivalência se ainda deseja ou não morrer;
- d) história de tentativas anteriores;
- e) ter feito uso de álcool concomitantemente.

34 - Um paciente com um quadro de depressão unipolar não vem respondendo a medicação antidepressiva. O fármaco abaixo que pode ser usado como potencializador da ação antidepressiva é:

- a) T S H;
- b) carbonato de lítio;
- c) reserpina;
- d) propranolol;
- e) clonidina.

35 - O fator de risco mais reconhecido da discinesia tardia refere-se a:

- a) mulheres jovens;
- b) longos períodos sem medicação ou medicação intermitente;
- c) idade avançada e história de transtorno afetivo;
- d) exposição prolongada a neurolépticos fenotiazínicos;
- e) uso de antiparkinsonianos por pouco tempo.

36 - Um paciente que apresenta inicialmente um episódio de mania é diagnosticado como sofrendo de:

- a) ciclotimia;
- b) hipomania;
- c) transtorno esquizoafetivo;
- d) transtorno bipolar;
- e) transtorno unipolar.

37 - O transtorno delirante:

- a) é menos comum do que a esquizofrenia;
- b) é causada por lesões de lobo frontal;
- c) usualmente inicia-se na idade de 20 anos;
- d) é mais comum em homens;
- e) é um estágio inicial da esquizofrenia.

38 - O tratamento farmacológico mais efetivo para o transtorno obsessivo-compulsivo é:

- a) imipramina;
- b) clomipramina;
- c) amitriptilina;
- d) fenelzina;
- e) tranilcipromina.

39 - O uso da carbamazepina exige controle permanente dada a possibilidade de:

- a) elevar a tensão arterial;
- b) provocar hemólise e colestase;
- c) dificultar o metabolismo de aminoácidos;
- d) inibir a medula óssea;
- e) facilitar o acúmulo de ácido úrico nas articulações.

40 - Entre as drogas abaixo, é reconhecidamente teratogênica:

- a) diazepam;
- b) haloperidol;
- c) lítio;
- d) clorpromazina;
- e) imipramina.

41 - Na administração de amitriptilina, entre os efeitos adversos que o paciente provavelmente experimentará inclui-se:

- a) constipação;
- b) diarreia;
- c) letargia;
- d) amenorréia;
- e) cefaléia.

42 - Entre os novos antidepressivos, está mais ligado à indução de crises convulsivas:

- a) nefadozona;
- b) sertralina;
- c) fluoxetina;
- d) moclobemida;
- e) bupropiona.

43 - O melhor tratamento farmacológico para o tremor induzido pelo lítio é:

- a) diazepam;
- b) clorpromazina;
- c) propranolol;
- d) imipramina;
- e) clonidina.

44 - O antipsicótico abaixo que tem maior efeito anticolinérgico e deve ser evitado em associação com a amitriptilina é:

- a) haloperidol;
- b) levomepromazina;
- c) trifluorperazina;
- d) tioridazina;
- e) tiotixeno.

45 - O principal neurotransmissor associado com a ansiedade que medeia a inibição presináptica no sistema nervoso central é:

- a) noradrenalina;
- b) ácido g-aminobutírico;
- c) opiáceos endógenos;
- d) histamina;
- e) adenosina.

46 - A síndrome de apnéia do sono:

- a) pode ser tratada eficazmente com barbitúricos;
- b) pode ser diagnosticada apenas com registro polissonográfico;
- c) é conhecida como síndrome de Pickwick em crianças e adolescentes;
- d) ocorre mais comumente em velhos e pessoas obesas;
- e) é geralmente decorrente de uma lesão no sistema nervoso central.

47 - O Sr. Fernando apresenta um padrão de comportamento profundamente arraigado e de longa duração, caracterizado por uma crença de ser socialmente inapto, pessoalmente desinteressante, inferior aos outros; uma preocupação excessiva em ser criticado ou rejeitado em situações sociais, uma relutância em envolver-se com pessoas, a não ser com a certeza de ser apreciado, restrições no estilo de vida devido à necessidade de segurança física e recusa de atividades sociais que envolvam contato interpessoal significativo, devido a medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Seu diagnóstico provável é:

- a) distímia;
- b) transtorno de ansiedade generalizada;
- c) transtorno de personalidade ansiosa (de evitação);
- d) transtorno de personalidade anancástica;
- e) transtorno esquizotípico.

48 - Em todas as seguintes circunstâncias o paciente pode receber alta à revelia de um hospital psiquiátrico, **exceto** se ele ou ela:

- a) tiver roubado medicamentos dentro do hospital;
- b) tiver agredido outro paciente;
- c) estiver em boas condições de saúde mas desejando continuar internado/a;
- d) estiver em um estado de emergência;
- e) estiver recusando tratamento.

49 - A eletroconvulsoterapia (ECT) é ainda considerada um tratamento de primeira escolha em:

- a) pacientes esquizofrênicos graves;
- b) pacientes com transtorno delirante agudo;
- c) jovens deprimidos melancólicos graves;
- d) idosos com delirium;
- e) mulheres grávidas com depressão melancólica grave.

50 - O artigo 6 do Código Civil brasileiro aponta como relativamente incapazes:

- a) os menores de 16 anos de idade;
- b) loucos de todos os gêneros;
- c) os surdos-mudos;
- d) os indivíduos com idade entre 16 e 18 anos;
- e) os pródigos.