

CADERNO DE PROVA

Secretaria de Estado da Saúde
Edital 038/SES/2017

<http://ses.fepese.org.br>

Enfermeiro



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



20 de agosto



40 questões



12h30 às 16h30



4h de duração*



**GOVERNO
DE SANTA
CATARINA**

Secretaria de Estado da Saúde

Língua Portuguesa

5 questões

Fundamental é chegar ao essencial

“Por que eu preciso morar em grandes cidades, viver desesperado dentro de um carro para lá e para cá, restringir imensamente meu tempo de convivência com as pessoas de que eu gosto, reduzir o meu ócio criativo para ficar num lugar onde vão me oferecer apenas e tão somente dinheiro?” Essa é uma dúvida que provavelmente atravessou muitas pessoas no trajeto de ida ou de volta do trabalho.

Para alguns, a resposta a esse questionamento poderia vir de pronto: “Porque sem dinheiro não se vive”. Sim, sem dinheiro não se vive, mas só com dinheiro não se vive. Há uma mudança em curso no mundo do trabalho. As pessoas estão começando a fazer uma distinção necessária entre o que é essencial e o que é fundamental.

Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. Fundamental é tudo aquilo que o ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é o que lhe permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho não é essencial, é fundamental. Você não trabalha para trabalhar, você trabalha porque o trabalho lhe permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade. Dinheiro não é essencial, é fundamental. Sem ele, você passa dificuldade, mas ele, em si, não é essencial. O que eu quero no meu trabalho é ter a minha obra reconhecida, me sentir importante no conjunto daquela obra. Essa visão do conjunto da obra vem levando muitas pessoas a questionar o que, de fato, estão fazendo ali.

Isso não é exclusivo do mundo do trabalho, mas vale para a vida em geral. Nós estamos substituindo paulatinamente a preocupação com os “comos” por uma grande demanda em relação aos “porquês”. O nosso modo de vida no Ocidente está em crise e algumas questões relevantes vêm à tona: a compreensão sobre a nossa importância, o nosso lugar na vida, o que vale e o que não vale, qual é o próprio sentido da existência. Afinal de contas, a ciência nos promete há cem anos que, quanto mais tecnologia, mais tempo livre haveria para a família, para o lazer, para a amorosidade.

Ora, durante os últimos cinquenta anos se trabalhou em busca de um lugar no mundo do fundamental: a propriedade, o consumo. Isso não satisfaz a nossa necessidade de reconhecimento, de valorização. Hoje temos um fosso entre o essencial e o fundamental, que leva as pessoas a ficarem absolutamente incomodadas: “Por que eu estou fazendo isso?” E a nossa lista dos “porquês” foi sendo substituída pela lista dos “apesar de”: “Apesar do salário...”, “Apesar das pessoas...”, “Apesar desse ambiente, eu faço”. É muito diferente de se ter razões para fazer. Quando há a razão de um lado, o senão de outro, e a balança começa a pesar para a senão, indagamos: “Qual a qualidade da minha vida?”

CORTELLA, M. S. *Qual é a tua obra?* Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010, p. 63-65. [Adaptado]

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no texto.

- () Trata-se de um texto narrativo, que aborda uma sequência de fatos localizados temporal e espacialmente.
- () O autor inicia seu texto com uma questão que norteará, no decorrer do texto, sua reflexão sobre o que é fundamental e o que é essencial na vida.
- () No terceiro parágrafo, o autor fundamenta seu argumento através do uso de definições e de exemplos.
- () O texto apresenta um estilo com traços de informalidade, o que se observa, por exemplo, no uso da segunda pessoa do singular e da primeira do plural como recurso para ganhar a adesão do leitor.
- () Trata-se de um texto de autoajuda que orienta o leitor no campo profissional para ser bem sucedido financeiramente no trabalho, como forma de preencher o vazio de sua existência.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • F • F
- b. () V • V • F • V • V
- c. (X) F • V • V • V • F
- d. () F • V • F • V • V
- e. () F • F • V • F • F

2. Considere os trechos abaixo retirados do texto:

1. “Por que eu preciso morar em grandes cidades, viver desesperado dentro de um carro para lá e para cá, restringir imensamente meu tempo de convivência com as pessoas de que eu gosto, reduzir o meu ócio criativo para ficar num lugar onde vão me oferecer apenas e tão somente dinheiro?” (primeiro parágrafo)
2. “Porque sem dinheiro não se vive”. (segundo parágrafo)
3. Nós estamos substituindo paulatinamente a preocupação com os “comos” por uma grande demanda em relação aos “porquês”. (quarto parágrafo)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos trechos.

- () As palavras “Por que” (em 1), “Porque” (em 2) e “porquês” (em 3) apresentam grafias distintas por estarem funcionando, respectivamente, como pronome relativo, conjunção subordinativa e pronome interrogativo.
- () Em 1, “de que” poderia ser substituído por “de quem” ou “das quais”, sem prejuízo de significado e sem ferir a norma culta da língua escrita.
- () Em 1, o pronome relativo “onde” poderia ser substituído por “aonde” sem ferir a norma culta da língua escrita, pois faz referência a uma localização sem envolver movimento.
- () Em 2, se o pronome átono “se” fosse posposto ao verbo, estaria ferindo a norma culta da língua escrita no que se refere à colocação pronominal.
- () Em 3, a palavra “paulatinamente” poderia ser substituída por “rapidamente”, sem prejuízo de significado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F • F • V • V • F
- b. (X) F • V • F • V • F
- c. () F • V • F • V • V
- d. () V • F • V • F • V
- e. () V • V • F • F • F

3. Leia as afirmativas abaixo, considerando-as em relação ao texto.

1. A palavra sublinhada em “Essa é uma dúvida que provavelmente atravessou...” (primeiro parágrafo) e “Hoje temos um fosso entre o essencial e o fundamental, que leva as pessoas...” (5º parágrafo) está funcionando como pronome relativo nos dois casos.
2. Em “Sem ele, você passa dificuldade, mas ele, em si, não é essencial.” (3º parágrafo) e “Isso não é exclusivo do mundo do trabalho, mas vale para a vida em geral.” (4º parágrafo), a conjunção “mas” é usada, em ambos os casos, para invalidar o conteúdo exposto na oração que precede o referido conector e introduzir um argumento contrário.
3. A locução verbal sublinhada em “Essa visão do conjunto da obra vem levando muitas pessoas...” (terceiro parágrafo) poderia ser substituída por tem levado, sem prejuízo no significado e sem ferir a norma culta da língua escrita.
4. Em “a ciência nos prometera” (4º parágrafo), a forma verbal sublinhada poderia ser substituída por “tinha prometido” sem prejuízo no significado temporal e sem ferir a norma culta da língua escrita.
5. Em “Há uma mudança em curso” (2º parágrafo) e “há cem anos” (4º parágrafo), o verbo haver é impessoal e tem significado existencial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

4. Considere os trechos abaixo retiradas do texto:

1. “Quando há a razão de um lado, o senão de outro, e a balança começa a pesar para a senão, indagamos: ‘Qual a qualidade da minha vida?’” (quinto parágrafo)
2. “Para alguns, a resposta a esse questionamento poderia vir de pronto: ‘Porque sem dinheiro não se vive.’” (segundo parágrafo)
3. “Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade.” (terceiro parágrafo)
4. “O nosso modo de vida no Ocidente está em crise e algumas questões relevantes vêm à tona: a compreensão sobre a nossa importância, o nosso lugar na vida, o que vale e o que não vale, qual é o próprio sentido da existência.” (quarto parágrafo)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos trechos.

- () Em 1, a pergunta funciona como complemento verbal de “indagamos”.
- () Em 2, a oração introduzida por “Porque” funciona como explicitação do conteúdo expresso pelo substantivo “resposta”.
- () Em 1 e 2, o sinal de dois-pontos é usado para introduzir um discurso direto, reproduzindo a fala de alguém.
- () Em 3, as palavras introduzidas por dois-pontos são adjetivos que qualificam “Essencial”.
- () Em 4, o sinal de dois-pontos é usado para introduzir um discurso indireto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•V•F•F
- b. () V•F•V•F•V
- c. () V•F•V•V•F
- d. () F•V•F•V•F
- e. () F•V•F•F•V

5. Assinale a alternativa **correta**, com base no texto.

- a. () O autor assume uma visão neutra e objetiva em relação ao tema que aborda, o que se evidencia pelo uso de argumentos de autoridade expressos em uma linguagem culta.
- b. () A crise do modo de vida ocidental deve-se ao uso abusivo da tecnologia e ao avanço da ciência nos últimos cem anos.
- c. () O autor demonstra uma atitude pessimista em relação ao futuro da humanidade, pois acredita que as pessoas não são capazes de se libertarem do consumismo.
- d. () No último parágrafo, o autor aborda o equilíbrio existente atualmente entre razão versus senão na tomada de decisões pelos sujeitos sobre suas vidas afetivas e sociais.
- e. (X) A preocupação com os “porquês” seria correlata a uma busca pelo essencial da vida; enquanto a preocupação com os “comos” estaria vinculada a uma busca pelo fundamental da vida.

Conhecimentos Específicos

35 questões

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao Acidente Vascular Isquêmico (AVI).

- () É responsável por cerca de 80% dos casos de Acidente Vascular Cerebral.
- () Pode ocorrer devido à formação de um ateroma nos vasos do cérebro.
- () Entre os sintomas podemos encontrar dores de cabeça muito fortes e perda de força em um dos lados do corpo.
- () Caracteriza-se por um rompimento dos vasos sanguíneos dentro ou ao redor do cérebro.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•V•F
- b. () V•V•F•V
- c. () V•F•V•V
- d. () F•V•V•F
- e. () F•F•F•V

Enfermeiro

7. De acordo com o Ministério da Saúde, na classificação de risco em obstetrícia, o atendimento à mulher deve ser realizado segundo a cor atribuída:

Na classificação vermelha, o atendimento deve ser; na laranja, em min; na amarela, em min; na verde, até min e na azul, o atendimento não é prioritário, podendo ser realizado encaminhamento, de acordo com a pactuação.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () urgente • 15 • 30 • 90
- b. () imediato • 10 • 30 • 120
- c. (X) imediato • 15 • 30 • 120
- d. () em 5 min • 10 • 20 • 120
- e. () em 5 min • 15 • 45 • 120

8. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à assistência à mulher em processo de abortamento.

- () Na ameaça de abortamento, o orifício interno do colo uterino encontra-se fechado; o volume do útero é compatível com a idade gestacional.
- () No abortamento cirúrgico, a aspiração a vácuo intrauterina é a técnica de escolha para a interrupção da gravidez de 12 a 14 semanas de gestação.
- () No abortamento retido, ocorre regressão dos sinais e sintomas da gestação; o colo uterino encontra-se dilatado e há perda sanguínea.
- () O abortamento é considerado habitual quando ocorre perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes da 22ª semana.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • V
- b. () F • V • V • F
- c. () V • V • V • F
- d. () F • V • F • V
- e. (X) V • V • F • V

9. Na crise asmática o paciente pode apresentar alguns sinais e sintomas. Dentre eles, podemos citar:

1. A respiração se torna rude e bem audível, com presença de sibilos, principalmente à expiração.
2. Os pulmões se tornam hiperinsuflados e ocorre aumento no diâmetro anteroposterior do tórax.
3. Os pacientes geralmente apresentam taquipneia, taquicardia e hipertensão sistólica leve.
4. Nos casos moderados, os pacientes apresentam retrações subcostais acentuadas, cianose e pulso > 120 batimentos/minuto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

10. Em pacientes internados com ventilação mecânica, em Unidades de Terapia Intensiva, algumas medidas de prevenção das pneumonias são:

1. Manter o paciente em posição de semirrecumbente, ou seja, com elevação da cabeceira em 30 a 45°, se não houver contraindicação.
2. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente, de acordo com a necessidade de cada paciente, com técnica estéril.
3. Trocar o circuito do ventilador, a cada dois dias, para reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica.
4. Fazer higiene oral com antissépticos, utilizando uma pequena esponja, evitando lesões da cavidade, três a quatro vezes ao dia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

11. A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é uma das principais causas de morte materna.

No que se refere à prevenção da HPP:

1. Todas as parturientes devem receber uterotônicos durante a 3ª fase do parto, sendo a ocitocina recomendada como o fármaco preferencial.
2. A massagem uterina contínua é recomendada para prevenir a HPP em mulheres que receberam ocitocina profilática, pois reduz a perda de sangue.
3. O clampeamento precoce do cordão umbilical (< 1 minuto após o nascimento) não é recomendado, a menos que o neonato esteja asfixiando e precise ser reanimado.
4. A avaliação do tônus uterino abdominal pós-parto para a identificação precoce da atonia uterina é recomendada somente para as múltiparas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

12. Infecção hospitalar é definida como:

- a. () patologia adquirida no hospital após 12 horas da admissão na unidade hospitalar.
- b. () patologia adquirida no hospital após 24 horas da admissão na unidade hospitalar.
- c. () patologia adquirida no hospital após 36 horas da admissão na unidade hospitalar.
- d. (X) patologia adquirida no hospital após 48 horas da admissão na unidade hospitalar.
- e. () patologia adquirida no hospital após 72 horas da admissão na unidade hospitalar.

13. As queimaduras são causadas por diferentes agentes etiológicos: térmicos, elétricos, radioativos, químicos e biológicos.

Identifique as afirmativas **corretas** sobre o assunto.

1. Quando as lesões estão acima de 20% da superfície corporal, o paciente é classificado como grave ou grande queimado.
2. Na queimadura elétrica, a destruição maciça de tecido muscular libera potássio, que em níveis elevados predispõe a arritmias.
3. Escarotomia é indicada nas queimaduras circunferenciais de membros ou do tronco para possibilitar a expansão e perfusão dos tecidos comprometidos.
4. Na queimadura de segundo grau, as lesões atingem a epiderme, a derme e a hipoderme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. A Política de Humanização da Assistência Hospitalar aponta diferentes parâmetros distribuídos em três grandes áreas:

- a. () grupo de voluntariado; acolhimento e atendimento dos usuários; e interação com os gestores.
- b. () trabalho dos profissionais; interação com os gestores; e acolhimento e atendimento dos usuários.
- c. (X) acolhimento e atendimento dos usuários; trabalho dos profissionais; e lógicas de gestão e gerência.
- d. () lógicas de gestão e gerência; acolhimento e atendimento dos usuários; e grupos de voluntariado.
- e. () estratégias de comunicação entre os setores; trabalho dos profissionais; e padrões de atendimento ao usuário.

15. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao atendimento à vítima de intoxicação ou envenenamento:

1. O socorrista deve oferecer carvão ativado, para neutralizar o veneno.
2. O vômito não deve ser induzido, nos casos de ingestão de derivados de petróleo (como querosene ou gasolina) ou substâncias ácidas ou básicas.
3. As embalagens dos produtos, restos de substâncias ou conteúdos vomitados, encontrados no local, devem ser guardados para facilitar a identificação do veneno e tratamento adequado.
4. As intoxicações podem ser classificadas em três categorias: acidentais, ocupacionais e intencionais.
5. Em caso de contato com a pele, não lave a região atingida, pois essa atitude, pode facilitar a identificação do veneno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

16. A hipotermia é um fator de risco para recém-nascidos, podendo se caracterizar como uma emergência, principalmente em prematuros. Assim sendo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os recém-nascidos devem ser mantidos em temperatura ambiental de no mínimo:

- a. () 24°C.
- b. (X) 25°C.
- c. () 26°C.
- d. () 27°C.
- e. () 28°C.

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às urgências e emergências psiquiátricas.

- () Emergência em psiquiatria é conceituada como um transtorno no pensamento, nos sentimentos ou nas ações, envolvendo risco de morte ou risco social grave e necessitando de intervenções imediatas.
- () Os quadros agudos de ansiedade podem ser classificados como emergências psiquiátricas.
- () Ansiedade leve, distúrbios de relacionamento pessoal podem ser classificados como urgência psiquiátrica.
- () As urgências psiquiátricas geralmente são quadros de evolução mais lenta e compreendem situações nas quais os riscos são menores e necessitam de intervenções a curto prazo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•F
- b. () F•V•V•F
- c. (X) V•F•F•V
- d. () F•F•V•V
- e. () V•F•F•F

18. Para a antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços, recomenda-se o uso de um antisséptico degermante. O procedimento, no caso da primeira cirurgia, deve durar:

- a. (X) de 3 a 5 minutos.
- b. () de 3 a 7 minutos.
- c. () de 4 a 10 minutos.
- d. () de 5 a 7 minutos.
- e. () de 5 a 10 minutos.

19. Analise as afirmativas abaixo em relação à Insuficiência Renal Aguda em crianças.

1. É um quadro de diminuição abrupta da filtração glomerular, com acúmulo dos produtos de degradação metabólica e desenvolvimento de azotemia.
2. A anúria pode estar presente e raramente observa-se oligúria.
3. O volume urinário mantém-se dentro dos limites normais em cerca de 30 a 80% dos casos.
4. Considera-se oligúria quando o volume urinário estiver inferior a 150 ml/m²/dia (aproximadamente 0,5 ml/kg/h em recém-nascidos e 1,0 ml/kg/h em crianças maiores).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

20. Em caso de Parada Cardiorrespiratória em adultos, o correto é que o socorrista aplique compressões torácicas na frequência de:

- a. () 60 a 80/minuto, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão.
- b. () 80 a 100/minuto, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão.
- c. (X) 100 a 120/minuto, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão.
- d. () 120 a 140/minuto, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão.
- e. () 120 a 160/minuto, permitindo o retorno total do tórax após cada compressão.

21. Na reanimação cardiorrespiratória em pediatria (bebês com menos de 1 ano e crianças até o início da puberdade), é aconselhável que o socorrista forneça compressões torácicas que comprimam, pelo menos, um terço do diâmetro anteroposterior do tórax do paciente. Isso equivale a cerca de:

- a. () 1 polegada (3 cm) em bebês, e até 3 polegadas (6 cm) em crianças.
- b. (X) 1,5 polegadas (4 cm) em bebês, e até 2 polegadas (5 cm) em crianças.
- c. () 2 polegadas (5 cm) em bebês, e até 3 polegadas (6 cm) em crianças.
- d. () 2,5 polegadas (5,5 cm) em bebês, e até 4 polegadas (7 cm) em crianças.
- e. () 3 polegadas (6 cm) em bebês e até 4 polegadas (7 cm) em crianças.

22. No atendimento de um acidentado, a avaliação da temperatura permite identificar o estado da pessoa, pois em algumas emergências, a temperatura muda muito.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Não se verifica a temperatura nos casos de vítimas inconscientes, crianças depois de ingerirem líquidos (frios ou quentes), após extração dentária ou inflamação na cavidade oral.
- () O corpo humano perde calor através de eliminação, evaporação e condução.
- () Na verificação da temperatura axilar, utilizando termômetro de mercúrio, o mesmo deve ser mantido sob a axila seca, por cerca de 5 a 7 minutos, com o acidentado sentado.
- () Acidentados com temperatura muito alta, por um longo período, podem ter lesão cerebral irreversível.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•F•V
- b. () V•V•F•F
- c. () V•F•F•V
- d. () F•V•V•V
- e. () F•V•V•F

23. Analise as afirmativas abaixo em relação aos animais peçonhentos:

1. Animal peçonhento é aquele que possui glândula produtora de veneno, mas não possui aparelho inoculador para injetá-lo.
2. Os sinais e sintomas do envenenamento variam de acordo com a espécie que causou o acidente, a quantidade de veneno inoculado, peso e idade da vítima, as condições de nutrição e o atendimento recebido.
3. Mordidas de cobras não peçonhentas não são consideradas sérias e geralmente são tratadas como ferimentos leves.
4. As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos registrados no país (cerca de 90%), pois são espécies agressivas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. A luxação caracteriza-se por:

- a. () Torsão de uma articulação, em geral com lesão de ligamento.
- b. () Quebra de um osso, com deslocamento da articulação.
- c. () Lesão de ligamento com presença de hematoma e edema.
- d. () Lesão óssea, com exposição dos ossos e ligamentos.
- e. (X) Deslocamento repentino e duradouro, parcial ou completo de um ou mais ossos de uma articulação.

25. A “Regra dos Nove”, proposta por Wallace, é uma das formas utilizadas para classificar queimaduras em relação à superfície corporal queimada.

A “Regra dos Nove”, utilizada para crianças, compreende:

- a. () Cabeça – 4,5%; Rosto – 4,5%; Torax – 16%; Costas – 16%; Membro Superior (frente) – 5%, Membro Superior (costas) – 5%; Membro Inferior (frente) – 9% e Membro Inferior (costas) – 9%
- b. () Cabeça – 4,5%; Rosto – 4,5%; Tórax – 18%; Costas – 18%; Membro Superior (frente) – 4,5%; Membro Superior (costas) – 4,5%; Membro Inferior (frente) – 9% e Membro Inferior (costas) – 9%
- c. () Cabeça – 7%; Rosto – 7%; Torax – 16%; Costas – 16%; Membro Superior (frente) – 5%, Membro Superior (costas) – 5%; Membro Inferior (frente) – 9% e Membro Inferior (costas) – 9%
- d. (X) Cabeça – 7%; Rosto – 7%; Tórax – 18%; Costas – 18%; Membro Superior (frente) – 4,5%, Membro Superior (costas) – 4,5%; Membro Inferior (frente) – 8% e Membro Inferior (costas) – 8%
- e. () Cabeça – 9%; Rosto – 9%; Torax – 16%; Costas – 16%; Membro Superior (frente) – 4,5%, Membro Superior (costas) – 4,5%; Membro Inferior (frente) – 6% e Membro Inferior (costas) – 6%

26. Considera-se crise hipertensiva em adultos jovens, o aumento da pressão arterial com risco de morte ou de lesão de órgãos-alvo. Divide-se em urgência e emergência hipertensiva. Considera-se urgência hipertensiva:

- a. () quando existe evidente dano agudo e progressivo vascular e de órgãos-alvo, com rápida descompensação da função de órgãos vitais e com risco iminente de morte ou de lesão orgânica irreversível, demandando início imediato da redução dos níveis pressóricos.
- b. () importante elevação da pressão arterial (em geral PA diastólica ≥ 150 mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de dano agudo a órgãos-alvo (cérebro, coração, pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para complicações graves.
- c. () quando existe evidente dano agudo e progressivo vascular e de órgãos-alvo, sem descompensação da função de órgãos vitais e com risco iminente de lesão orgânica irreversível, demandando início imediato da redução dos níveis pressóricos.
- d. () importante elevação da pressão arterial (em geral PA diastólica ≥ 140 mmHg), com sintomas graves, mas sem risco imediato à vida ou de dano agudo a órgãos-alvo (cérebro, coração, pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para complicações graves.
- e. (X) importante elevação da pressão arterial (em geral PA diastólica ≥ 120 mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de dano agudo a órgãos-alvo (cérebro, coração, pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para complicações graves.

27. Analise as afirmativas abaixo em relação à crise convulsiva ou epilética no adulto.

1. Crise convulsiva ou epilética pode ser uma manifestação de um processo patológico sistêmico reversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central.
2. O estado de mal epilético é a ocorrência de crises epiléticas prolongadas (acima de 5 minutos) ou repetitivas, persistindo por 30 minutos ou mais, que permitem a recuperação da consciência entre os eventos.
3. A “Crise generalizada tônico-clônica” raramente ultrapassa 5 minutos de duração e é a mais comum das manifestações quando de uma crise convulsiva.
4. Os sinais ou sintomas de uma crise convulsiva se caracterizam por súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, salivação intensa, lábios e dentes cerrados e eventual liberação esfíncteriana fecal e/ou urinária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

28. O transporte inter-hospitalar do recém-nascido com instabilidade clínica deve ser feito com presteza e segurança.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A equipe, pelo menos um médico e uma enfermeira, ou técnico de enfermagem e um motorista, deverão estar presentes no transporte.
- () Ao entrar na ambulância com o recém-nascido, mudar a fonte de O2 da incubadora de transporte para a ambulância, porque a bala de O2 da incubadora é muito pequena; mudar também a fonte de energia.
- () Se tiver algum familiar acompanhando o transporte, o mesmo deve ir junto ao recém-nascido, usando cinto de segurança.
- () Se for necessário algum procedimento com o recém-nascido durante o transporte, deve-se solicitar que o motorista da ambulância ande mais devagar.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F • F • V • V
- b. () F • V • F • F
- c. () F • V • V • V
- d. () V • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) e à Placenta Prévia (PP).

- () Na PP marginal ocorre a implantação total ou parcial da placenta no segmento inferior do útero, que recobre o colo uterino.
- () Um dos principais fatores de risco para PP é a cicatriz uterina por cesariana anterior.
- () Na PP o sangramento é indolor e pode ocorrer no segundo ou terceiro trimestre.
- () A sobredistensão uterina (polihidrânio ou gestação gemelar) e a hipertensão são fatores de risco para o DPP.
- () O DPP com sangramento vaginal é responsável pela apoplexia útero-placentária ou “útero de Couvelaire”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • F • F
- b. () V • F • V • F • F
- c. () F • V • V • V • V
- d. (X) F • V • V • V • F
- e. () F • V • F • V • F

30. Analise as afirmativas relacionadas com as síndromes hipertensivas da gravidez:

1. A síndrome HELLP é o quadro clínico caracterizado por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, que decorre do agravamento do quadro de pré-eclâmpsia.
2. Nas gestantes que fazem uso do Sulfato de Magnésio, é indispensável manter sempre à mão o gluconato de cálcio que atua como antídoto no caso de eventual parada cardíaca.
3. Na pré-eclâmpsia para a avaliação das condições fetais, são preconizadas a contagem de movimentos fetais, a avaliação do crescimento fetal e do líquido amniótico e a cardiocografia basal.
4. Os níveis séricos diminuídos de ácido úrico correlacionam-se com restrição de crescimento fetal intrauterino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

31. A hipoglicemia e a hiperglicemia no adulto são alterações metabólicas que possuem características distintas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos para valores abaixo de 70 mg/dL, mas os sintomas clínicos usualmente ocorrem quando a glicose plasmática é menor que 60 mg/dl a 50 mg/dl.
- () Fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma e convulsão são sintomas neuroglicopênicos da hiperglicemia.
- () A queda da glicemia leva a manifestações de liberação do sistema simpático como sudorese, taquicardia, apreensão e tremor.
- () A hiperglicemia pode ser causada pelo excesso de alimentação, carência de exercícios físicos ou stress motivado por uma doença.
- () A hipoglicemia matinal pode ser decorrente do chamado 'fenômeno do alvorecer', em que hormônios contrarreguladores da madrugada reduzem a liberação de glicose.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • F • V • V • V
- b. () F • V • F • V • F
- c. (X) V • F • V • V • F
- d. () F • F • V • V • F
- e. () V • F • V • F • V

32. A Infecção do Trato Urinário (ITU) na maioria das vezes está relacionada à cateterização vesical.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Os agentes etiológicos responsáveis pela ITU costumam, inicialmente, pertencer à microbiota do paciente.
- () Em pacientes com disfunção de esvaziamento vesical, o cateterismo intermitente é preferível a cateteres uretrais de demora ou suprapúblicos.
- () O sistema de drenagem deve ser mantido fechado e estéril, apenas desconectar o cateter ou tubo de drenagem quando a irrigação for necessária.
- () Utilizar instilação rotineira de soluções antisépticas ou antimicrobiana em sacos de drenagem urinária para a prevenção de ITU.
- () Realizar a troca do cateter de demora rotineiramente em pacientes com risco de ITU.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•V•F•F
- b. () V•F•V•V•V
- c. () V•F•V•F•V
- d. () F•V•V•V•F
- e. () F•V•V•F•F

33. O desfibrilador externo automático (DEA) é utilizado para aplicar uma corrente elétrica sobre o músculo cardíaco, por um curto período de tempo, para cessar o ritmo anormal.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao seu uso em adulto.

- () A corrente elétrica causa uma assistolia momentânea, fazendo com que o marca-passo natural do coração reassuma as atividades, quando houver a repolarização das células.
- () O desfibrilador é indicado para a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
- () Ao usar o DEA é necessário realizar tricotomia no tórax, retirar os pelos e secar o tórax, caso esteja molhado.
- () Em paciente portador de marca-passo ou cardioversor-desfibrilador, as pás autoadesivas devem ser colocadas em cima do dispositivo implantado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•F•V•F
- b. () F•V•V•F
- c. () V•V•V•V
- d. () F•V•V•V
- e. (X) V•V•V•F

34. As manifestações clínicas da Insuficiência Respiratória (IR) dependem dos efeitos da hipoxemia, da hipercapnia e da ação sinérgica sobre os tecidos nobres do organismo.

Identifique as afirmativas corretas sobre o assunto.

1. A hipoxemia é decorrente da diminuição da ventilação alveolar. Com o agravamento do quadro, o pulmão pode entrar em colapso, originando um *shunt* pulmonar e a retenção de CO₂, caracterizando a hipercapnia.
2. A hipoxemia tem ação indireta no sistema nervoso vegetativo, por meio da produção de catecolaminas, originando alteração do padrão respiratório (taquipneia e polipneia).
3. Com o aumento da hipoxemia e a hipercapnia, os sintomas que exprimem os efeitos diretos da falta de oxigênio e da sobrecarga de anidrido carbônico são obnubilação, depressão e sonolência.
4. A hipoxemia tem ação direta, depressora nos tecidos e órgãos, causando cianose devido ao aumento da carboxihemoglobina no sangue.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

35. No Edema Agudo de Pulmão (EAP), a instabilidade hemodinâmica pode levar o paciente ao óbito. Assim, requer ação imediata da equipe multiprofissional.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O ecocardiograma auxilia na diferenciação das possíveis causas de EAP cardiogênico e não cardiogênico.
- () O paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal e com as pernas pendentes, para diminuir o trabalho respiratório e o retorno venoso.
- () O paciente apresenta manifestações clínicas como: dispneia, ortopneia, cianose de extremidades, sudorese, agitação, ansiedade e tosse com expectoração.
- () O EAP com etiologia cardiogênica ocorre pela diminuição do fluxo nos capilares, elevando a pressão venosa central e do capilar pulmonar com alteração de permeabilidade vascular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•F•V•F
- b. () F•V•F•V
- c. () V•F•F•V
- d. () F•F•V•F
- e. () V•F•V•V

36. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à convulsão e à crise convulsiva:

1. A crise convulsiva é uma desordem na transmissão dos impulsos elétricos cerebrais, que leva a espasmos musculares involuntários e perda da consciência em todos os pacientes.
2. Crianças de três meses a cinco anos com convulsões febris apresentam uma probabilidade maior de desenvolver epilepsia com o decorrer da idade.
3. A duração de uma crise convulsiva é aproximadamente de 10 a 15 minutos, sendo que a cefaleia, a confusão mental, as dores musculares e a fadiga aparecem após o episódio.
4. Durante a convulsão, a administração de droga miorrelaxante é preferencialmente por via endovenosa, mas na impossibilidade ou insucesso da venopunção, a opção é a via intraóssea.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

37. Com relação ao desequilíbrio ácido-básico, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1 Acidose

1. Acidose respiratória
2. Alcalose respiratória
3. Acidose metabólica
4. Alcalose metabólica

Coluna 2 Descrição

- () Com o aumento da eliminação de CO₂ ocorre a redução de íons hidrogênio e de ácido carbônico no sangue, aumentando o pH.
- () Ocorre devido à redução da eliminação do dióxido de carbono pelos pulmões, o que acarreta a retenção do CO₂ no sangue. Esse CO₂ aumenta a quantidade de ácido carbônico no sangue, reduzindo o pH.
- () Ocorre pelo aumento de ácidos do organismo tais como o ácido lático e os corpos cetônicos, bem como os íons de hidrogênio. Esse aumento de ácidos provoca uma diminuição do pH.
- () Caracterizada pelo aumento de bases no sangue (bicarbonato), ao contrário dos ácidos, que estão reduzidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•2•4•3
- b. (X) 2•1•3•4
- c. () 2•3•1•4
- d. () 3•2•1•4
- e. () 4•3•1•2

38. Os acidentes causados por animais peçonhentos são considerados graves.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O veneno do escorpião preto e amarelo tem ação neurotóxica. A dor no local da picada pode ser aliviada com compressas mornas e analgésicos.
- () O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. A lesão é endurecida e escura, podendo evoluir para ferida com gangrena e necrose.
- () O veneno da serpente surucucu (*Lachesis*) tem ação proteolítica, neurotóxica e interfere na coagulação, sendo frequente a infecção e a necrose na região da picada e a insuficiência renal.
- () O veneno da serpente cascavel tem ação proteolítica e neurotóxica, devendo ser tratado com soro antielapídico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•F•F
- b. () V•V•F•V
- c. () V•F•V•F
- d. () F•V•V•V
- e. () F•F•V•F

39. O choque pode ter várias classificações. Assim, segundo a etiologia, é chamado de distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico.

Relacione as colunas abaixo:

Coluna 1 Choque

1. Choque distributivo
2. Choque obstrutivo
3. Choque cardiogênico
4. Choque hipovolêmico

Coluna 2 Descrição

- () É caracterizado pela falência do coração como bomba cardíaca, pela diminuição da força de contração, diminuição do débito cardíaco e aumento da pressão venosa central, gerando a má perfusão tecidual.
- () Ocorre devido à alteração da tonicidade da parede do vaso, provocando seu relaxamento, levando à hipotensão.
- () O pneumotórax hipertensivo, o tromboembolismo pulmonar e a dissecação da aorta são fatores que predisõem e levam à queda do débito cardíaco.
- () Pode ocorrer por diarreia de difícil controle, poliúria, queimaduras extensas e desidratação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2•1•3•4
- b. () 2•4•3•1
- c. (X) 3•1•2•4
- d. () 3•2•1•4
- e. () 4•3•2•1

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>