

QUESTÃO 01

Qual das alterações radiográficas abaixo não pode ser visualizada na ortopantomografia?

- A) Síndrome de Eagle.
- B) Tórus mandibular.
- C) Hiperplasia condilar.
- D) Ameloblastoma periférico.
- E) Cisto do ducto nasopalatino.

QUESTÃO 02

Quais os exames por imagens que devem ser solicitados para ajudar no diagnóstico do Hemangioma central do osso?

- A) Angiografia, cintilografia, Tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética.
- B) Tomografia computadorizada, ressonância magnética, doppler e ultrassonografia.
- C) Cintilografia, panorâmica, tomografia computadorizada com contraste e Doppler colorido.
- D) Doppler colorido, angiografia, telerradiografia, tomografia computadorizada para tecidos moles.
- E) Ultrassonografia, ressonância magnética, radiografia da coluna cervical e panorâmica.

QUESTÃO 03

Todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto:

- A) A tomografia computadorizada é superior à ressonância magnética na detecção de calcificações, patologia óssea e fraturas.
- B) A ressonância magnética permite uma melhor diferenciação tecidual que a tomografia computadorizada.
- C) A ressonância magnética usa radiação ionizante de uma banda de radiofrequência de espectro eletrônico.
- D) Para a realização da ressonância magnética o paciente é colocado dentro de um grande magneto de campo uniforme.
- E) A tomografia pode ser direcionada para visualização de tecidos duros ou moles.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta:

- A) A sialografia está contra-indicada na sialodinite crônica
- B) A ressonância magnética é contra-indicada em pacientes que receberam previamente implantes dentários.
- C) A artrografia não serve para diagnosticar perfuração de disco da articulação têmporo-mandibular.
- D) Pacientes portadores de aneurisma cerebral e claustrofóbicos não podem realizar a ressonância magnética.
- E) A ressonância magnética da ATM permite a visualização dos componentes articulares em vários planos.

QUESTÃO 05

Baseado no texto abaixo, assinale a alternativa que se relaciona a descrição:

“aparência de comida por verme, perda do trabeculado, radiopacidades misturadas, aparência dupla de reabsorção óssea e formação osteoesclerótica, formação de sequestros e reação perióstica.”

- A) Osteomielite aguda.
- B) Osteomielite Crônica.
- C) Osteomielite esclerótica.
- D) Osteomielite por radiação.
- E) Osteomielite de Garré.

QUESTÃO 06

O efeito paradoxal de um fármaco é aquele:

- A) Esperado após sua administração.
- B) Secundário após sua administração.
- C) Contrário após sua administração.
- D) Colateral após sua administração.
- E) Primário após sua administração.

QUESTÃO 07

Em relação às vantagens do uso de benzodiazepínicos por via oral, analise os itens abaixo:

1. Redução do fluxo salivar e reflexo de vômito.
2. Manutenção da pressão arterial, Amnésia anterógrada.
3. Diminuição da ansiedade.

Está (ão) correto(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 08

Qual a alternativa em que todos os medicamentos são inibidores não seletivos (inibem COX-1 e COX-2)?

- A) Diclofenaco, Ibuprofeno, Nimesulida, Piroxicam.
- B) Celecoxib, Etoricoxib, Lumiracoxibe, Rofecoxib.
- C) Aspirina, Indometacina, Ibuprofeno, Cetorolaco.
- D) Piroxicam, Aspirina, Diclofenaco, Meloxicam.
- E) Meloxicam, Nimesulida, Etoricoxib, Ibuprofeno.

QUESTÃO 09

No atendimento de gestantes, qual a melhor época para a realização de uma exodontia simples, sendo esta necessária?

- A) 1^o Trimestre.
- B) 2^o Trimestre.
- C) 3^o Trimestre.
- D) 1^o e 3^o Trimestre.
- E) 1^o e 2^o Trimestre.

QUESTÃO 10

Qual o protocolo para a endocardite bacteriana segundo a *American Heart Association*?

1. Amoxicilina: Adultos, 2,0 g (crianças, 50 mg/kg) via oral, uma hora antes do procedimento.
2. Ampicilina: Adultos, 2,0 g (crianças, 50mg/kg) via IM ou IV 30 minutos antes do procedimento.
3. Clindamicina: Adultos, 600 mg (crianças 20 mg/kg) via oral uma hora antes do procedimento.

Está (ão) **correto(s)**:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 11

Paciente feminino de 25 anos de idade se apresenta à consulta com dor intensa e pulsátil em região do 36. A paciente relata ter feito exodontia do dente a três dias em outro centro odontológico. Não relata alergias a medicamentos. Ao exame clínico apresenta alvéolo dental vazio, com restos de coágulo necrosado, odor fétido e higiene bucal bastante deficiente. Baseado na descrição acima, o tratamento a ser estabelecido é:

- A) Anestesia local. Irrigação do alvéolo com solução fisiológica. Remoção de corpos estranhos com cureta de Lucas. Orientação pós-operatória. Prescrição de dipirona sódica de 500mg a cada 12h por 24h e Amoxicilina 500mg a cada 8 horas por 7 dias. Reavaliação em 48 horas. Acompanhamento até cura do paciente.
- B) Anestesia local. Irrigação do alvéolo com solução fisiológica. Remoção de corpos estranhos com cureta de Lucas. Irrigação com solução fisiológica e digluconato de clorexidina 0,12%. Orientação pós-operatória. Prescrição de dipirona sódica de 500mg a cada 4h por 24h. Reavaliação em 48 horas. Acompanhamento até a cura do paciente.
- C) Anestesia local. Irrigação com solução fisiológica e digluconato de clorexidina 0,12%. Orientação pós-operatória. Reavaliação em 48 horas. Acompanhamento até alta do paciente.
- D) Prescrição de dipirona sódica de 500mg a cada 4h por 24 h e Amoxicilina 500mg a cada 4 horas por 5 dias. Realização de bochechos com digluconato de clorexidina 0,12% 3 vezes por dia. Reavaliação em 48 horas. Acompanhamento até melhora do quadro.
- E) Anestesia local. Irrigação do alvéolo com solução fisiológica, ringer lactato ou soro glicosado. Remoção de corpos estranhos. Orientação pós-operatória. Prescrição de dipirona sódica de 250mg a cada 6h por 24h e Amoxicilina 500mg a cada 8 horas por 7 dias. Reavaliação em 48 horas. Acompanhamento até cura do paciente.

QUESTÃO 12

Infecção agressiva da pele e da fáscia superficial da cabeça e do pescoço, comumente vista em pacientes diabéticos e imunocomprometidos. São características clínicas de:

- A) Angina de Ludwig
- B) Fascite Necrosante cervicofacial
- C) Erisipela
- D) Celulite cervical
- E) Abscesso dérmico-facial

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa **correta** para o tratamento da Angina de Ludwig.

- A) Diagnóstico. Anestesia local, Realização de bochechos com digluconato de clorexidina 0,2%, Drenagem do espaço afetado, colocação de dreno para irrigação com solução fisiológica, Antibioticoterapia VO, acompanhamento ambulatorial.
- B) Diagnóstico, Internação do paciente para acompanhamento hospitalar, Antibioticoterapia IV, avaliação da necessidade da intervenção cirúrgica.
- C) Diagnóstico, Internação do paciente para acompanhamento hospitalar, Antibioticoterapia IV, avaliação da necessidade da intervenção cirúrgica, manutenção das vias aéreas desobstruída.
- D) Diagnóstico precoce, intervenção cirúrgica imediata, manutenção das vias aéreas desobstruídas, Antibioticoterapia IV.
- E) Diagnóstico. Anestesia local, drenagem bilateral, realização de bochechos com água oxigenada e polivinilpirrolidona, medicação analgésica e anti-inflamatória. Internação após a drenagem.

QUESTÃO 14

Quais são os estafilococcus clinicamente importantes para as infecções bucomaxilofaciais?

- 1. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus saprophyticus.
- 2. Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, Streptococos salivarius.
- 3. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus salivarius.
- 4. Staphylococcus epidermis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococos aureus.

Está (ão) **correto(s)**:

- A) 1, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 15

Quais são os fatores que influenciam na difusão da infecção odontogênica?

- 1. Virulência dos organismos e estado imune do paciente.
- 2. Espessura do osso adjacente ao dente afetado, presença de febre.
- 3. Espessura do osso adjacente ao dente afetado e posição da inserção muscular em relação à região apical do dente.

Está (ão) **correto(s)**:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 16

Dos seguintes agentes anestésicos, **não** pertence ao grupo amida

- A) Bupivacaína.
- B) Procaína.
- C) Lidocaína.
- D) Articaína.
- E) Prilocaína.

QUESTÃO 17

A utilização de um agente vasoconstrictor associado a anestésicos locais oferece vários benefícios entre os quais temos:

- 1. Prolonga a duração do efeito anestésico, melhora a hemostasia.
- 2. Evita a utilização de analgésicos no pós-operatório, diminui o edema trans-operatório.
- 3. Tem um efeito hipotensivo no paciente.
- 4. Evita parestesia pós-operatória

Está (ão) **correto(s)**:

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 18

Ao utilizar a técnica de bloqueio mandibular de Gow-Gates, é (são) anestesiado(s) o(s) nervo(s):

1. Alveolar inferior.
2. Milo-hióideo.
3. Lingual.
4. Auriculotemporal.

Está (ão) correto(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 19

Na indução anestésica são comumente utilizados barbitúricos, pois produzem inconsciência em menos de 30 segundos. É (são) barbitúrico(s).

1. Propofol
2. Tiopental Sódico
3. Midazolam

Está (ão) correto(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 20

A concentração adequada de epinefrina associada à solução anestésica local de Bupivacaína é de:

- A) 1:100000
- B) 1:150000
- C) 1:200000
- D) 1:250000
- E) 1:300000

QUESTÃO 21

No que se refere às cirurgias pré-protéticas, é correto afirmar:

- A) O tórus mandibular é uma exostose óssea que tem sempre indicação cirúrgica por provocar dificuldade de fonação e deglutição.
- B) Nas mandíbulas atroficas edêntulas, o reposicionamento do nervo mentoniano é um procedimento cirúrgico por vezes, necessário.
- C) A hidroxiapatita é um excelente material osteoindutor e osteocondutor utilizado nas cirurgias de mandíbulas atroficas.
- D) A capacidade osteogênica do paciente é diretamente proporcional a idade do mesmo.
- E) O princípio do processo de reparação e neoformação óssea esta relacionado apenas aos fatores locais do sítio cirúrgico.

QUESTÃO 22

Quando num traumatismo dento-alveolar, o dente é avulsionado do seu alvéolo e o reimplante imediato não é possível, qual o meio de conservação extra-bucal menos recomendado, segundo Peterson et al. (2005)?

- A) Saliva.
- B) Leite.
- C) Soro fisiológico.
- D) Água.
- E) Meio isotônico.

QUESTÃO 23

Quando da realização de um retalho cirúrgico, como podemos prevenir necrose?

- A) Retalhos devem ter lados convergentes da base para o ápice do retalho.
- B) O comprimento de um retalho deve ser pelo menos, duas vezes a largura da base.
- C) A base do retalho deve ser excessivamente distendida.
- D) Um suprimento sangüíneo axial, quando possível, deve ser incluído na base do retalho.
- E) Lacerações devem ser realizadas na base do retalho cirúrgico.

QUESTÃO 24

Na classificação de Pell e Gregory, A classe B se refere a:

- A) A relação do primeiro molar inferior com a coroa do 2º molar.
- B) O terceiro molar inferior apresenta suficiente espaço antero-posterior para erupção.
- C) A superfície do 3º molar inferior impactado horizontalmente é geralmente adjacente a raiz do 2º molar.
- D) O plano oclusal do dente impactado encontra-se entre o plano oclusal e o nível cervical do 2º molar inferior.
- E) O terceiro molar inferior encontra-se entre o plano oclusal e a face distal do 2º molar superior.

QUESTÃO 25

Qual técnica de rotina é indicada para determinar a posição antero-posterior de um canino superior impactado?

1. Ortopantomografia de boca aberta.
2. Radiografia Periapical pela técnica de Clark.
3. Tomografia computadorizada.
4. Oclusal da mandíbula.

Está (ão) correto(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 26

A primeira causa de morte e invalidez na população entre a 2º e 3º década de vida é:

- A) Câncer.
- B) Acidentes Automobilísticos.
- C) Agressão.
- D) Armas de fogo.
- E) Uso de Drogas.

QUESTÃO 27

De acordo com Peterson et al. (2005), as fraturas bucomaxilofaciais mais comuns em pacientes em pediátricos são:

- A) Complezo Zigomático.
- B) Osso Frontal.
- C) Dentoalveolar.
- D) Côndilo.
- E) Maxila do tipo Le Fort I.

QUESTÃO 28

Marque a alternativa correta:

- A) O sinal de Battle é indicativo de fraturas baixas de côndilo mandibular, sendo este sinal representada por uma equimose na área posterior da orelha.
- B) Na técnica de Champy, utilizada no tratamento de fraturas de corpo mandibular, se utiliza uma placa reta do sistema 2.3 para estabilizar os segmentos ósseos.
- C) No tratamento de fraturas de sínfise mandibular, usualmente são utilizadas duas placas sendo que, a placa mais superior é fixada com parafusos monocorticais e a inferior com parafusos bicorticais.
- D) No tratamento de rotina de fraturas de sínfise mandibular é importante utilizar 2 placas do sistema 2.3 para uma adequada estabilização da fratura.
- E) O fio de Kirschener é rotineiramente utilizado na fixação de dentes avulsionados.

QUESTÃO 29

Hifema se refere a:

- A) Acúmulo de lágrima no conduto lacrimal associado a uma fratura Le Fort II.
- B) Ruptura de um enfisema subcutâneo devido à pressão excessiva em pacientes portadores de uma fratura do complexo zigomático-orbitário.
- C) Alteração dos movimentos oculares devido a uma trava mecânica associada a uma fratura do complexo zigomático-orbitário.
- D) Camada de sangue na câmara anterior do globo ocular, por rompimento de vasos sanguíneos na raiz da íris, a consequência de um trauma que envolva o globo ocular.
- E) Visão dupla.

QUESTÃO 30

O teste de ducção forçada positiva sugere:

- A) Fratura de côndilo mandibular unilateral.
- B) Aprisionamento do músculo reto inferior da órbita.
- C) Presença de cálculo salivar na glândula submandibular.
- D) Obstrução nasal devido a hipertrofia do corneto inferior.
- E) Comunicação bucossinusal ou buconasal.

QUESTÃO 31

Na técnica de Lag Screw é utilizado:

- A) Parafuso.
- B) Placas do sistema 2.0.
- C) Fio de aço associado a parafusos IMF.
- D) Placas e Parafusos.
- E) Fio de Kirschener.

QUESTÃO 32

Paciente masculino de 40 anos apresenta lesão tumoral odontogênica benigna, mesenquimal e agressiva na mandíbula, em região correspondente ao 3º molar, ângulo e ramo. Ao exame radiográfico apresenta imagem radiolúcida e multilocular. Assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico e tratamento:

- A) Tumor Odontogênico Adenomatóide / Ressecção composta.
- B) Granuloma Central de Células Gigantes / Curetagem agressiva.
- C) Ameloblastoma / Ressecção parcial.
- D) Fibroma ossificante / Ressecção marginal.
- E) Mixoma/Descompressão.

QUESTÃO 33

Qual dos seguintes cistos NÃO apresenta imagem radiográfica:

- A) Cisto naso-palatino.
- B) Cisto naso-labial.
- C) Cisto palatino mediano.
- D) Cisto de Stafne.
- E) Cisto paradentário.

QUESTÃO 34

Paciente feminino de 25 anos de idade, portadora da Síndrome dos Carcinomas Basocelulares Nevóides, apresenta as lesões císticas pertinentes a esta síndrome. Indique, dentre as alternativas, qual o cisto que é presente nesta síndrome:

- A) Cisto odontogênico glandular.
- B) Cisto dermóide.
- C) Cisto odontogênico calcificante.
- D) Ceratocisto.
- E) Cisto ósseo solitário.

QUESTÃO 35

Paciente masculino de 65 anos apresentando lesão ulcerativa de 4 meses de evolução, localizada em lábio inferior, endurecida com bordos poucos definidos, indolor, com alterações actínicas.

- A) Úlcera traumática.
- B) Carcinoma espinocelular.
- C) Sialometaplasia necrotizante.
- D) Herpes Zóster.
- E) Ameloblastoma periférico.

QUESTÃO 36

Qual das seguintes alternativas não se constitui como objetivo da cirurgia ortognática?

- A) Harmonia e equilíbrio facial.
- B) Saúde do sistema estomatognático.
- C) Oclusão funcional.
- D) Estética facial.
- E) Estabilidade ortodôntica e cirúrgica.

QUESTÃO 37

No preparo ortodôntico para cirurgia ortognática, Qual das alternativas não deve ser realizada?

- A) Alinhamento e nivelamento.
- B) Coordenação dos arcos.
- C) Fechamento de espaços e tratamento das atresias.
- D) Estabelecer as inclinações axiais mesio-distais e vestibulo-linguais.
- E) Elasticoterapia.

QUESTÃO 38

De acordo com Proffit et al. (1996), qual dos procedimentos cirúrgicos é menos estável?

- A) Avanço mandibular.
- B) Reposicionamento inferior da maxila.
- C) Expansão maxilar.
- D) Avanço maxilar.
- E) Recuo mandibular.

QUESTÃO 39

Em cirurgia ortognática, a plataforma de Erickson e o paquímetro digital são utilizados, respectivamente, em:

- A) Cirurgia de modelos e análise facial.
- B) Análise facial e trans-cirúrgico.
- C) Trans-cirúrgico e cirurgia de modelos.
- D) Pré-cirúrgico e pós-cirúrgico.
- E) Análise cefalométrica e pós-cirúrgico.

QUESTÃO 40

Qual dos seguintes tratamentos não pode tratar as discrepâncias transversas da maxila:

- A) Expansão rápida.
- B) Cirurgia segmentar.
- C) Compensação Ortodôntica.
- D) Expansão cirurgicamente assistida.
- E) Descompensação Ortodôntica.

QUESTÃO 41

Com relação às lesões da articulação têmporo-mandibular, pode-se afirmar que as alternativas abaixo são artropatias, exceto:

- A) Doença inflamatória da articulação.
- B) Osteoartrite.
- C) Osteocondrite.
- D) Hemartrose.
- E) Artrite reumatoide.

QUESTÃO 42

Quando um paciente apresenta o deslocamento e travamento repetitivo do côndilo mandibular na vertente anterior da eminência articular, qual o tratamento cirúrgico apropriado?

- A) Plicatura meniscal.
- B) Eminectomia.
- C) Discopexia.
- D) Artrocentese.
- E) Condilectomia alta.

QUESTÃO 43

Qual das alternativas abaixo pode ser classificada como indicação relativa de cirurgia da articulação têmporo-mandibular?

- A) Anquilose.
- B) Tumores.
- C) Anomalias de crescimento.
- D) Deslocamento do disco sem redução.
- E) Hiperplasia condilar.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta.

- A) Pacientes portadores de artrite reumatóide juvenil poliarticular não tendem a não apresentar alteração de crescimento.
- B) A artroscopia pode ser indicada para diagnóstico e tratamento.
- C) A artrocentese também pode ser indicada para plicatura meniscal.
- D) A rotação de retalho temporal é uma das opções para a discopexia.
- E) Hiperplasia condilar é uma indicação de cirurgia articular em todas as fases de evolução.

QUESTÃO 45

O exame por imagens indicado para avaliação do disco articular é:

- A) Cintilografia.
- B) Tomografia com contraste.
- C) Arteriografia.
- D) Doppler colorido.
- E) Ressonância magnética.

QUESTÃO 46

Ocorrendo um óbito durante uma cirurgia buco-maxilo-facial, realizada exclusivamente por cirurgiões dentistas, o atestado de óbito deve ser assinado e fornecido por:

- A) Chefe do Centro Cirúrgico.
- B) Chefe do plantão.
- C) Serviço de Patologia ou Instituto Médico Legal.
- D) Serviço Funerário.
- E) Cirurgião Bucomaxilofacial.

QUESTÃO 47

A resolução que cria a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, com a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos é conhecida como:

- A) Resolução 169/94.
- B) Resolução 192/96.
- C) Resolução 196/96.
- D) Resolução 169/96.
- E) Resolução 194/69.

QUESTÃO 48

Para a realização de pesquisas clínicas no ambiente hospitalar o cirurgião bucomaxilofacial deve ter a autorização do (a):

- A) Chefe do Plantão.
- B) Presidente do Conselho Regional de Odontologia.
- C) Chefe da Comissão de Infecção Hospitalar.
- D) Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia.
- E) Comissão de Ética em Pesquisa.

QUESTÃO 49

Pode um cirurgião dentista especialista em cirurgia buco-maxilo-facial realizar aplicação de toxina botulínica “Botox” na região bucomaxilofacial?

- A) Não pode, já que é um procedimento médico.
- B) Pode, já que é um procedimento envolvendo a região buco-maxilo-facial.
- C) Pode, porém, só como parte de um tratamento para a correção de problemas estético-funcionais do sistema estomatognático.
- D) Não pode, por ser um procedimento estético, limitado a médicos.
- E) Pode ser utilizado sem limitações legais por médicos e cirurgiões buco-maxilo-faciais.

QUESTÃO 50

“Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente; exceto, talvez, quando o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento”.

O texto acima é encontrado em qual das declarações abaixo?

- A) Declaração de Helsinki (1964).
- B) Declaração dos Direitos do Homem (1948).
- C) Código de Nuremberg (1947).
- D) Declaração de Helsinki III (1983).
- E) Resolução CNS 251/97.