

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado)

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
 - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
 - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.

- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:

- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
- 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:

- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
- B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
- C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
 - B) PCCU e glicemia.
 - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
 - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
 - B) Sonda vesical.
 - C) Máscara de nebulização.
 - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
 - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
 - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
 - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
 - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
 - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
 - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
 - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
 - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
 - B) I e II, somente.
 - C) I e III, somente.
 - D) II e III, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. De acordo com as necessidades de recursos humanos para UTI neonatal intensiva, a equipe de enfermagem deve ser composta por:

- A) 01 enfermeiro coordenador responsável pela área de enfermagem pediátrica e neonatal; 01 enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 técnico de enfermagem para 3 leitos.
- B) 01 enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem; 01 enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 técnico de enfermagem para 1 ou 2 leitos.
- C) 01 enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem; 02 enfermeiros, exclusivos da unidade, para cada quinze leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 técnico de enfermagem para 1 ou 2 leitos.
- D) 01 enfermeiro coordenador, da área de enfermagem pediátrica e neonatal; 01 enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada quinze leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 técnico de enfermagem para 5 leitos.

17. Nas recomendações quanto à disposição de leitos na UTI neonatal, a distância sugerida entre os leitos, no intensivo, é de:

- A) 2,0 m e, no semi-intensivo, é de 1,5 m.
- B) 2,5 m e, no semi-intensivo, é de 2,0 m.
- C) 1,5 m e, no semi-intensivo, é de 1,0 m.
- D) 2,15 m e, no semi-intensivo, é de 1,15 m.

18. Sobre a limpeza de equipamentos e materiais usados no berçário, identifique as assertivas com V (verdadeiras) ou F (falsas) e marque a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- () A limpeza concorrente e a terminal, do aparelho de fototerapia, deve ser feita com água e sabão líquido.
- () Durante a limpeza terminal de incubadoras e berços, quando houver presença de matéria orgânica, o desinfetante aplicado deve ser o quaternário de amônia.
- () A periodicidade para substituição de extensão para drenagem torácica, pronga, traquéia do CPAP e máscara de fototerapia é de 12 horas.
- () Deve ser feita desinfecção imediata com álcool etílico a 70% nos seguintes materiais/equipamentos: termômetro, estetoscópio, lanterna, colchão da balança, bandeja e telefone.
- () Todos os dias deve ser feita a limpeza concorrente em toda a área e em todos os equipamentos em uso, e de 15 em 15 dias, fazer a limpeza terminal em todas as áreas e todos os equipamentos.

A seqüência correta é:

- A) F, V, V, F, F
- B) V, V, F, F, V
- C) V, V, F, V, F
- D) V, F, V, F, V

19. Nos casos de epidemia por *S. Aureus*, *E. Coli* ou *Pseudomonas*, a conduta para prevenção e controle de infecções em berçários é:
- A) em qualquer um destes casos, faz-se o tratamento sistêmico com antibióticos em todos os RNs.
 - B) em caso de epidemia por *S. Aureus*, fazer o tratamento do cordão com corante triplo nos RNs.
 - C) fazer o controle do berçário, por 3 a 6 meses, após cessada a epidemia.
 - D) nos casos de qualquer destas epidemias, fechar o berçário a novas admissões e reduzir o senso tão rapidamente quanto possível.
20. Para prevenir e aliviar a dor no RN é correto intervir:
- A) contendo e posicionando o bebê em posição extensiva.
 - B) fazendo contenção através do “ninho”, que é improvisado com cobertor.
 - C) acelerando o procedimento que está sendo executado se, durante os cuidados, o bebê apresentar sinais de desconforto.
 - D) manipulando bastante o neonato e procurando desagrupar cuidados.
21. Quando o RN for submetido a procedimento doloroso e invasivo, a intervenção farmacológica de ação analgésica indicada é:
- A) Hidrato de cloral.
 - B) Barbitúrico.
 - C) Sucrose.
 - D) Morfina.
22. No desenvolvimento da assistência de enfermagem aos RNs moderadamente prematuros, quais problemas devem ser investigados?
- A) Infecção neonatal, Anoxia perinatal grave, Resfriamento e Desconforto respiratório.
 - B) Anoxia perinatal grave, Persistência do canal arterial e Azotemia.
 - C) Azotemia, Acidose metabólica tardia e Resfriamento.
 - D) Hipocalcemia, Hiperbilirubinemia e Proteinemia.
23. Na Doença Pulmonar de Membranas Hialinas (DPMH) é complicação da própria doença:
- A) Desidratação ou Hiper-hidratação.
 - B) Fibroplastia retrolental.
 - C) Displasia broncopulmonar.
 - D) Distúrbios metabólicos.
24. É procedimento correto na Síndrome da Aspiração do Mecônio:
- A) executar a aspiração das secreções, logo que o RN esteja estabilizado.
 - B) fazer reanimação com pressão positiva.
 - C) utilizar a Penicilina aquosa associada à Kanamicina ou à Gentamicina.
 - D) manter o RN em Trendelenburg 20° entre os períodos de aspiração.

25. Na administração de surfactante exógeno, devemos ter o cuidado de:

- A) agitar o frasco do surfactante.
- B) instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso.
- C) aspirar o tubo endotraqueal logo após a administração do surfactante.
- D) utilizar sonda nº 10, cortá-la no tamanho exato da cânula do RN, conectá-la à seringa com o surfactante.

26. Dentre as intervenções corretas, durante a intervenção endotraqueal, identifique as assertivas com V (verdadeiras) ou F (falsas) e marque a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- () Selecionar a cânula endotraqueal de acordo com a IG do RN.
- () Preparar o laringoscópio e lâmina apropriada.
- () Testar a aspiração e a fonte de O₂.
- () Testar o reanimador, selecionar a máscara de acordo com a IG do RN.
- () Posicionar o RN em prona com hiperextensão da cabeça.
- () Manter fonte de O₂ durante a intubação e confirmar a posição do tubo.
- () Fixar a cânula e fazer a aspiração (sn).

A seqüência correta é:

- A) F, F, V, F, F, V, V.
- B) F, V, V, V, F, V, F.
- C) V, V, V, F, F, V, V.
- D) F, V, V, F, F, V, V.

27. Identifique ações corretas sobre a intervenção de enfermagem ao RN em oxigêniooterapia:

1. Manter o RN em leve hiperextensão da cabeça, ou em posição ventral, e manter as vias aéreas desobstruídas.
2. Evitar manuseio excessivo do RN e agrupar cuidados.
3. Monitorar a oximetria do pulso arterial.
4. Corrigir a acidose administrando lentamente, bicarbonato de potássio.
5. Controlar a diurese e a densidade urinária.

O correto está somente em:

- A) 2, 3, 4, 5.
- B) 1, 3, 4, 5.
- C) 1, 2, 4, 5.
- D) 1, 2, 3, 5.

28. Durante um parto vaginal cefálico, a assistência de enfermagem à reanimação tem como primeira atividade:

- A) desobstrução das vias aéreas superiores.
- B) pinçamento e secção do cordão.
- C) recolher o RN em campo esterilizado e aquecido.
- D) remoção das mucosidades e do sangue do nariz e dos olhos, com gase esterilizada.

- 29.** É correto na intervenção de enfermagem durante a Ressuscitação do RN em presença de mecônio:
- 1- Aspirar a naso e orofaringe antes do desprendimento das espátulas.
 - 2- Colocar em berço aquecido, em presença de mecônio, efetuar intubação endotraqueal para aspirar o mecônio.
 - 3- Avaliar respiração (respirando), frequência cardíaca ($\uparrow 100$) e cor (rosado).
 - 4- Após a aspiração o RN não poderá ser estimulado.
 - 5- Seguir os passos da ressuscitação neonatal sem risco.
- Estão corretos somente os itens:
- A) 1, 2, 3, 4.
 - B) 1, 2, 3, 5.
 - C) 2, 3, 4, 5.
 - D) 1, 3, 4, 5.
- 30.** São medicamentos usados na reanimação no Sistema Respiratório do RN:
- A) Dexametazona e dobutinamida.
 - B) Dopamina e Furosemine.
 - C) Dexametazona e Teofilina.
 - D) Digoxina e fenobarbital.
- 31.** Considerando que a icterícia do recém-nato pode apresentar vários fatores predisponentes, estando entre eles a taxa de conjugação diminuída, identifique a alternativa que provoca o aparecimento desta taxa:
- A) Incompatibilidade de ABO, incompatibilidade de Rh, hemácias com formas anormais, hemácias com enzimas anormais.
 - B) Erros inatos do metabolismo, imaturidade de conjugação da bilirrubina, icterícia do leite materno.
 - C) Hepatites, anormalidades metabólicas, atresia biliar, cisto do colédoco, sepse, obstrução estrutural ou funcional do aparelho gastro-intestinal.
 - D) infusões de soluções hipertônicas, acidose prolongada, hipoxemia e hipotermia.
- 32.** Em relação à fototerapia, é correto afirmar:
- A) Algumas das indicações da fototerapia são: acidose metabólica, hipoglicemia, anóxia neonatal e insuficiência respiratória com hipoxemia.
 - B) A fototerapia aumenta, na pele, a degradação da bilirrubina conjugada em produtos incolores que, aparentemente, não são tóxicos, por fotoxidação e hidrossolubilização, promovendo sua excreção por via renal.
 - C) Durante o tratamento em fototerapia, pode-se utilizar a luz solar natural do início da manhã e da tarde.
 - D) A complicação denominada Síndrome de bebê-bronze ocorre por icterícia de causa obstrutiva e a fototerapia reverte o quadro.

33. Sobre os cuidados com RN em fototerapia é correto:

- A) manter a criança à distância de, aproximadamente, 80cm, para garantir fluxo radiante ótimo.
- B) desligar a fototerapia, mantendo a proteção ocular durante os cuidados de higiene, alimentação e o horário de visitas.
- C) observar o turgor da pele, umidade de mucosas, densidade urinária e volume urinário para avaliar o estado de hidratação da criança.
- D) controlar a temperatura, a frequência cardíaca e respiratória de 8/8hs.

34. O objetivo da ventilação mecânica é manter uma pressão inspiratória, uma pressão expiratória final positiva e fornecer oxigênio. Para alcançar este objetivo devemos:

- A) manter oxigenação adequada, oferecer O₂ seco e aquecido.
- B) manter circuito do ventilador livre de condensação de H₂O₂.
- C) checar os parâmetros do aparelho a cada 6 horas.
- D) aspirar assepticamente a secreção, com tubo oro-traqueal, conforme avaliação.

35. A atresia do esôfago é um mal congênito que consiste no estreitamento do esôfago, criando falhas de comunicação com o estômago. A maioria dos recém-nascidos com atresia do esôfago também apresenta uma fístula traqueoesofágica, uma conexão anormal entre o esôfago e a traquéia. Isso significa que a criança, ao mamar, pode morrer sufocada porque o leite vai para os pulmões e não para o estômago. Com base em seu conhecimento sobre assistência ao RN em situações cirúrgicas, é correto afirmar:

- A) O RN com atresia do esôfago apresenta sialorréia, tosse quando tenta deglutir e apresenta cianose. Para evitar pneumonia por aspiração, recomenda-se que seja suspensa a alimentação oral e colocação de uma sonda de aspiração contínua na parte superior do esôfago, para que a saliva seja aspirada antes de atingir os pulmões.
- B) A alimentação do RN, no período pré-operatório, é administrada pela via intravenosa, liberando-se a amamentação no período pós-operatório imediato.
- C) A gastrostomia deve sempre preceder a intervenção cirúrgica curativa, através de uma toracotomia retropelural direita, com fechamento de fístula e anastomose dos segmentos do esôfago.
- D) A atresia do esôfago surge entre a sexta e décima semana de vida fetal, sendo reconhecida rapidamente nas primeiras horas de vida do RN e, com menos de 24 horas de nascimento, tem o tórax aberto para que o cirurgião possa remover os tecidos que impedem a comunicação normal do organismo.

36. Na assistência de enfermagem ao RN grave, com distúrbios metabólicos (do tipo hipo/hiperglicemia, hipocalcemia), a intervenção correta é:

- A) suspensão do aleitamento materno.
- B) infundir, simultaneamente, o glucanato de cálcio com bicarbonato de sódio ou o fosfato.
- C) administrar, lentamente, o glucanato de cálcio prescrito e observar, se a frequência cardíaca \downarrow 100bpm, interromper a infusão.
- D) administrar cálcio por via intramuscular.

37. Sobre o quadro clínico da Meningite Neonatal, é correto dizer que:

- A) o quadro inicial confunde-se com a septicemia: febre, letargia, irritabilidade, orexia, insuficiência respiratória, vômitos, diarréia e desidratação.
- B) na doença precoce, que surge nas primeiras 48 horas, os sinais mais comuns são: alterações de temperatura, dispnéia, icterícia e distúrbios gastro-intestinais.
- C) na doença tardia, que aparece nas primeiras 72 horas de vida, os sinais neurológicos são mais evidentes quando existe o comprometimento do SNC, onde o coma aparece em 100% das crianças.
- D) os sinais de Kerning e de Brudzinski são excepcionais no recém-nato.

38. Correlacione as doenças infecto-contagiosas com o tipo de cuidado que deve ser tomado, e marque a alternativa que contém a seqüência correta de cima para baixo:

- | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. Pneumonia pneumocócica | () | Isolamento respiratório |
| 2. Salmonelose | () | Isolamento entérico |
| 3. Toxoplasmose | () | Isolamento total |
| 4. Meningite bacteriana | () | Cuidados entéricos |
| 5. Hepatite pelo vírus A | () | Não é necessário isolamento |

A seqüência correta é:

- A) 1, 5, 4, 2, 3.
- B) 4, 5, 1, 3, 2.
- C) 1, 2, 4, 3, 5.
- D) 4, 2, 3, 1, 5.

39. Toda UTI deve desenvolver seu esquema de tratamento de infecções, assim como a seleção dos agentes microbianos que serão utilizados. Então, é correto afirmar que:

- A) na presença de quadro clínico e de fatores de risco, mesmo antes dos resultados bacteriológicos, deve-se iniciar um antibiótico de largo espectro que cubra as bactérias Gram positivas.
- B) na sepse de início precoce ou tardio, o antibiótico de escolha seria a rifampicina de terceira geração.
- C) na presença do resultado bacteriológico e de sensibilidade do microorganismo, ajusta-se a terapia, escolhendo um antibiótico mais específico, se necessário.
- D) nos casos de septicemia por meningite recomenda-se o tratamento com anfotericina B.

40. O derrame pleural, uma coleção de líquido no espaço pleural, pode ser composto de um líquido relativamente claro ou sanguinolento, ou purulento. A toracocentese é o tratamento de escolha para obter amostra diagnóstica e aliviar a dispnéia. Sobre o cuidado do RN com drenagem torácica fechada, é correto afirmar:

- A) Um dreno de tórax é removido quando não há flutuação de líquido no frasco e nem drenagem de exsudatos por um período de seis horas.
- B) O sistema de drenagem deve ser mantido em um nível mais baixo do que o tórax do paciente, com exceção dos casos em que se necessite transportar o RN sobre uma maca.
- C) A tosse, a respiração profunda e a mudança de posição do RN promovem a drenagem do líquido acumulado no espaço pleural.
- D) A água potável usada no frasco de drenagem atua como um selo e evita que o ar que está sendo drenado retorne para dentro do espaço pleural.