

LEGISLAÇÃO DO SUS

- 01.** O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:
- A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
 - B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
 - C) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
 - D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil
- 02.** O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:
- A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
 - B) ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
 - C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
 - D) assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização
- 03.** A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:
- A) ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
 - B) desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
 - C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
 - D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda às questões de números 4 a 7

- 04.** É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do SUS, respectivamente:
- A) expressar os compromissos entre gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar
 - B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
 - C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
 - D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de acolhimento nas unidades de saúde
- 05.** “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:
- A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
 - B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
 - C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
 - D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis
- 06.** É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:
- A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades
 - B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado
 - C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de trabalhadores para o setor
 - D) centrar o planejamento e o acompanhamento das atividades educativas em saúde com vistas à aquisição de conhecimentos e mudança de hábitos

- 07.** Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde oferecidos para um determinado território, é objetivo da:
- descentralização
 - universalização
 - regionalização
 - hierarquização
- 08.** De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- profissionais de saúde
 - usuários
 - representantes do governo
 - prestadores de serviço
- 09.** O significado da expressão “concepção ampliada de saúde”, que marca conceitualmente a Política Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
- a saúde e o adoecimento refletem as escolhas individuais, mais que o acesso aos cuidados e as tecnologias médicas
 - a saúde e a doença são um binômio inseparável, determinando necessidades curativas
 - a saúde envolve tanto aspectos físicos como os processos mentais, singulares em cada sujeito
 - o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida
- 10.** De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que é competência da direção nacional do SUS:
- executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária
 - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
 - participar na formulação e na implementação de políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
 - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada

ESPECÍFICO DO CARGO

- 11.** O protocolo para prevenção da endocardite bacteriana preconiza a seguinte utilização de antibiótico por via oral:
- clindamicina 2,0 gr, meia hora antes do procedimento
 - amoxicilina 1,0 gr, 1 hora antes do procedimento
 - amoxicilina 1,0 gr, meia hora antes do procedimento
 - amoxicilina 2,0 gr, 1 hora antes do procedimento
- 12.** Na doença de Christmas ou hemofilia B, o fator de coagulação alterado é o:
- VII
 - VIII
 - IX
 - XI
- 13.** Um paciente com neoplasia maligna na região de cabeça e pescoço necessita de tratamento radioterápico. A realização de exodontia, em relação ao início da radioterapia, deve ser feita com antecedência mínima de:
- 1 semana
 - 2 semanas
 - 1 mês
 - 6 meses
- 14.** Na classificação da mucosite oral, o grau II corresponde a:
- presença de lesão esbranquiçada
 - presença de ulcerações
 - alterações clínicas visíveis
 - área eritematosa
- 15.** O sinal de Burton corresponde a:
- manchas azuladas nas gengivas, decorrentes de intoxicação pela prata
 - manchas enegrecidas na mucosa oral, decorrentes do acúmulo de melanina na doença de Addison
 - manifestação oral da intoxicação pelo chumbo
 - impregnação de pigmentos endógenos no dorso da língua
- 16.** O acúmulo de gordura na região da coluna cervicodorsal, conhecido como corcova de búfalo, é um achado comumente encontrado na seguinte patologia:
- doença de Crohn
 - tiroidite de Hashimoto
 - síndrome de Cushing
 - síndrome de Gardner

17. O aumento sérico de Ca^{++} , fosfatase alcalina e paratormônio são dados laboratoriais encontrados na seguinte patologia:
- hipervitaminose D
 - doença de Paget
 - displasia fibrosa polioestótica
 - hiperparatireoidismo primário
18. A osteíte deformante caracteriza-se por densificações e deformações em todo o esqueleto. A manifestação em cabeça e pescoço pode levar aos seguintes achados radiográficos:
- hipercementose e aumento da maxila
 - micrognatia mandibular e maxilar, além de radiolucências maldefinidas
 - presença de áreas osteolíticas com aspecto de favo de mel
 - presença de lesão radiolúcida com halo radiopaco, que envolve as raízes dos dentes posteriores da mandíbula
19. A síndrome de Sjögren é caracterizada como uma doença auto-imune que afeta principalmente as glândulas salivares e lacrimais. Além disso, está comumente associada à seguinte patologia:
- Diabetes mellitus*
 - diabetes bronzeado
 - artrite reumatóide
 - esclerodermia
20. Manchas cor café com leite, displasia óssea polioestótica e endocrinopatias estão presentes na seguinte patologia:
- doença de Addison
 - síndrome de Albright
 - síndrome de Peutz-Jeghers
 - síndrome de Jaffe-Lichtenstein
21. Em paciente que sofreu transplante renal e faz uso de ciclosporina, deve-se evitar a utilização dos seguintes antibióticos:
- amoxicilina e cefalexina
 - clindamicina e eritromicina
 - metronidazol e eritromicina
 - metronidazol e tetraciclina
22. O cisto linfoepitelial oral é uma alteração de desenvolvimento que tem como localização preferencial:
- o assoalho da boca
 - a fossa amigdalina
 - a borda lateral da língua
 - o dorso da língua
23. A hemi-hipertrofia pode estar associada, entre outras manifestações sindrômicas, à:
- esclerodermia
 - síndrome de Proteus
 - síndrome de Parry-Romberg
 - síndrome de Crouzon
24. O eritema multiforme é uma patologia que pode ser desencadeada por uma infecção. Em tal situação, os microorganismos envolvidos no desenvolvimento da doença são:
- varicela zoster e herpes simples
 - herpes simples e *Borrelia vincentii*
 - Fusobacterium nucleatum* e herpes simples
 - Mycoplasma pneumoniae* e herpes simples
25. Dermatite, demência e diarreia são sinais e sintomas característicos da pelagra decorrente de deficiência da seguinte vitamina:
- niacina
 - riboflavina
 - tiamina
 - piridoxina
26. Entre as neoplasias malignas abaixo, a que tem melhor prognóstico, por apresentar um curso invasivo relativamente **NÃO** agressivo, é o:
- carcinoma de ducto salivar
 - carcinoma adenóide cístico
 - carcinoma mucoepidermóide
 - melanoma
27. As vesículas são lesões elementares que apresentam conteúdo líquido. Entre as patologias abaixo, a que **NÃO** apresenta vesícula como lesão elementar inicial é:
- herpes zoster
 - impetigo
 - herpangina
 - psoríase
28. São estruturas orais que fazem parte, respectivamente, das mucosas mastigatória, especializada e de revestimento:
- o palato duro, a língua e a gengiva
 - a língua, a gengiva e a bochecha
 - a gengiva, a língua e os lábios
 - a gengiva, as tonsilas e o palato

- 29.** De acordo com o estadiamento TNM um paciente que apresenta um tumor em língua com 2 cm ou menos em sua maior dimensão, metástase em único linfonodo homolateral com mais de 3 cm até 6 cm em sua maior dimensão e ausência de metástases à distância, encontra-se na seguinte classificação:
- A) $T_0N_2M_0$
 B) $T_1N_2M_0$
 C) $T_2N_1M_0$
 D) $T_2N_2M_0$
- 30.** O lábio duplo é uma condição congênita ou adquirida que pode ser um componente da seguinte síndrome:
- A) de Ascher
 B) de Melkersson Rosenthal
 C) de Beckwith-Wiedemann
 D) de Down
- 31.** A citopatologia originalmente lançada por Papanicolaou para estudo dos esfregaços das células obtidas da mucosa uterina foi posteriormente adaptada para o diagnóstico do carcinoma epidermóide da mucosa bucal. A classificação do exame citopatológico em classe II, obtida após a leitura de um esfregaço de tecido bucal, corresponde a células:
- A) sugestivas de malignidade
 B) displásicas
 C) normais
 D) inflamatórias
- 32.** Com respeito às alterações que se observam na resposta imune do paciente infectado pelo HIV, verifica-se que:
- A) a contagem de linfócitos T CD4, quando superior a 500 células / mm^3 , caracteriza uma imunossupressão severa
 B) a linfocitopenia e a linfocitose são alterações imunológicas que normalmente ocorrem durante o curso da infecção
 C) o linfócito T CD8 é a principal célula de defesa infectada
 D) a síndrome da linfocitose infiltrativa difusa se dá quando os indivíduos afetados apresentam linfocitopenia de células T CD8 + e linfocitose de células TCD4+
- 33.** Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna que tem sido associada, mais recentemente, à infecção pelo seguinte vírus:
- A) herpesvírus humano (HHV-8)
 B) citomegalovírus (HHV-5)
 C) Epstein Barr (HHV-4)
 D) papilomavírus (HPV-6)
- 34.** Na sialometaplasia necrosante podem ser encontradas, as seguintes alterações histopatológicas:
- A) necrose gangrenosa acinar, seguida por displasia escamosa dos ductos glandulares
 B) necrose isquêmica acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares
 C) necrose liquefativa acinar, seguida por displasia escamosa dos ductos glandulares
 D) necrose caseosa acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares
- 35.** O aumento dos níveis de excreção urinária da hidroxiprolina é identificado no exame complementar do seguinte processo patológico:
- A) displasia fibrosa poliostótica
 B) hipervitaminose D
 C) miastenia grave
 D) hiperparatireoidismo primário
- 36.** A anemia macrocítica é uma alteração hematológica encontrada no seguinte processo patológico:
- A) síndrome de Paterson-Kelly
 B) perda excessiva de sangue
 C) anemia perniciosa
 D) anemia ferropriva
- 37.** Disostose mandibulofacial, face estreita e coloboma são características da síndrome de:
- A) Apert
 B) Romberg
 C) Crouzon
 D) Treacher-Collins
- 38.** O tumor de célula granular localiza-se mais comumente:
- A) na língua
 B) na mucosa jugal
 C) no assoalho bucal
 D) no palato mole
- 39.** A concrecência é uma alteração do desenvolvimento dentário que se caracteriza por:
- A) aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de um canal radicular
 B) aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de dois canais radiculares
 C) união de dois dentes adjacentes ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cimento e pela dentina subjacente
 D) união de dois dentes adjacentes, ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cimento e sem confluência da dentina subjacente

40. Constitui processo patológico cuja ocorrência se restringe ao tecido gengival:
- A) histiocitoma fibroso
 - B) granuloma piogênico
 - C) fibroma ossificante periférico
 - D) fibroma de células gigantes
41. Os testes sorológicos não-específicos utilizados para o diagnóstico da sífilis, nos dois primeiros estágios da doença, tornam-se fortemente positivos após:
- A) o quinto dia de infecção
 - B) o segundo dia de infecção
 - C) a primeira semana de infecção
 - D) as primeiras três semanas de infecção
42. O tempo de tromboplastina parcial ativada encontra-se prolongado na seguinte alteração da coagulação:
- A) defeitos relacionados com o fator VII
 - B) defeitos relacionados com o fator VIII
 - C) doença decorrente de disfunções plaquetárias
 - D) doença de von Willebrand
43. Durante o exame físico, o estomatologista identificou uma mancha vermelha na mucosa jugal do paciente. A mancha desapareceu quando o profissional realizou a vitropressão. Esse quadro evidencia a presença da seguinte alteração:
- A) enantema
 - B) equimose
 - C) petéquias
 - D) víbices
44. Constitui manifestação clínica encontrada na doença de Darier:
- A) incontinência pigmentar
 - B) disceratose congênita
 - C) ceratose folicular
 - D) displasia ectodérmica
45. Na síndrome de Rendu-Osler-Weber, são encontrados os seguintes processos patológicos:
- A) icterícia e fragilidade das células endoteliais
 - B) telangiectasias e fístulas arteriovenosas
 - C) aneurismas, varicosidades e hemangiomas
 - D) anemia hemolítica e trombose
46. Entre as lesões que envolvem os ossos da face, aquela que ocorre exclusivamente na mandíbula é o:
- A) granuloma central de células gigantes
 - B) granuloma periférico de células gigantes
 - C) cisto ósseo Aneurismático
 - D) cisto ósseo de Stafne
47. A displasia cemento-óssea periapical é uma lesão óssea que apresenta a seguinte característica:
- A) os dentes envolvidos com a doença, geralmente desenvolvem pulpíte irreversível
 - B) o ligamento periodontal dos dentes envolvidos é atingido desde a fase inicial da doença
 - C) ocorre preferencialmente em mulheres
 - D) na fase inicial da doença, os dentes envolvidos possuem calcificações periapicais envolvidas por áreas radiotransparentes
48. O ducto de Wharton é uma estrutura anatômica da seguinte glândula salivar:
- A) parótida
 - B) submandibular
 - C) sublingual
 - D) acessória da língua
49. Medicamentos que modulam a condução dos íons pela membrana do nervo, reduzindo a excitabilidade, são utilizados no tratamento da nevralgia do trigêmeo. Para o controle dessa doença, o medicamento mais indicado é:
- A) ácido valpróico
 - B) claritromicina
 - C) talidomida
 - D) aztreonam
50. A doença bolhosa que se caracteriza por ser mucocutânea hereditária e apresentar defeitos nos mecanismos de adesão entre as células epiteliais é:
- A) pênfigo paraneoplásico
 - B) pênfigo vulgar
 - C) epidermólise bolhosa simples
 - D) penfigóide benigno das membranas mucosas