

CONCURSO PÚBLICO

Cargo 12

Médico

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **cinquenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **50**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA

| ETAPA | DATA |
|---|----------------|
| Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas | 11/3/2008 |
| Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas | 12 e 13/3/2008 |
| Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos | 9/4/2008 |
| Período provável de entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos | 10 e 11/4/2008 |



Utilize este espaço para rascunho.



CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

1 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado de informações que recolhe na internet, principalmente, ele faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em
5 dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, quando aceitava resignado as decisões do seu médico, e começado a atuar como um adolescente questionador, cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para
10 o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e incancelável, visto que a internet se tornou um enorme consultório informal.

15 As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de marcar consulta com um especialista, e também depois de ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a
20 respeito de sua doença e suas possíveis terapias.

Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a
25 tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um sem-número de dados errados sobre doenças circulando pela internet. A demanda por informações médicas levou a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.

30 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos,
35 nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para digeri-los.

A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede
40 uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos que se comportam dessa forma podem ser acusados de má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece
45 forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis
50 desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.

Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há informação colhida na rede que substitua a palavra final de um bom especialista. Palavra final que não significa,
55 necessariamente, veredito sem apelação. A boa relação médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a
60 seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso a um volume maior de informações sobre seu quadro clínico, o que o tem tornado mais questionador.
- (B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, após pesquisar sobre sua doença na internet, os pacientes aceitam sem questionar as argumentações e as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca vai mudar.
- (C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no quarto parágrafo.
- (D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto os médicos que não conversam com seus pacientes como os pacientes que falam demasiadamente nos consultórios devem procurar a justiça para resolverem esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

- (A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas” significa dizer que *sites* sobre dieta e nutrição não são acessados por internautas.
- (B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de informações sobre doenças em geral, nem tudo o que se encontra pode ser devidamente aproveitado, pois existem muitos dados imprecisos e informações equivocadas circulando na rede.
- (C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), está implícito que agora os médicos passarão a cobrar um valor mais alto por suas consultas em virtude dos esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
- (D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, mais as pessoas deixam de procurar médicos e especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está relacionada à pequena quantidade de informações sobre doenças circulando na internet.
- II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao paciente, segundo os médicos.
- III – Infiere-se do trecho “Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação” (linhas 54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do médico ser questionada.
- IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre médico e paciente reside no fato de que o paciente, por um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente para que tomem juntos a decisão mais acertada para cada tipo de tratamento.
- V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” (linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, sem acarretar prejuízo ao texto: **Os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pacientes adolescentes e jovens.**

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” (linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) estão empregadas em sentido conotativo.
- II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o mesmo significado de **facilidade excepcional**.
- III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem à mesma norma de acentuação gráfica, assim como ocorre com “páginas” e “propósitos”.
- IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o segundo” (linha 56), o vocábulo **segundo**, nas duas ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 5


Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: <http://www.scielo.br>. (com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
- II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as pessoas com pouca instrução não são capazes de compreender o que os médicos dizem.
- III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente revela que não mantém refeições regulares.
- IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

1 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado

5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar

10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

15 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

Medicina que tem seus postulados como a das faculdades.

20 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que arde cura, o que aperta segura”.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a

25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados (ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor

30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e,

35 depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é

40 descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso

45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as histórias populares.

O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e

50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos que as papilas da língua vão identificando com o uso.

QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder curativo.
- II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” (linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas que receitava.
- III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a medicação só fará efeito se for usada juntamente com a medicina popular proposta.
- IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” (linha 17) está relacionada à medicina popular.
- (B) A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) refere-se à **medicina das faculdades**.
- (C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como uma figura que gosta de sofrer.
- (D) Na frase “Avisar o ajudante com uma piscada a discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque pode ser substituída por **piscadinha discreta**, sem acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da Constituição Federal.

- (A) Descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (B) Regionalização, equidade e referência.
- (C) Contra-referência, referência e equidade.
- (D) Descentralização, equidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – São usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
- II – São produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
- III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
- IV – Não servem para descrever a freqüência de uma doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

- (A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
- (B) formular políticas de saúde para a população de adolescentes do país.
- (C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população local.
- (D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos planos e programas de saúde.
- II – Transformam as informações coletadas em dados, subsidiando o processo de tomada de decisões.
- III – Podem ser informatizados ou manuais.
- IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente no setor saúde.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção correta acerca da vigilância epidemiológica.

- (A) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e degenerativas.
- (C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela porque são doenças cobertas pelo Regulamento Sanitário Internacional.
- (D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem a devida confirmação laboratorial da doença não deve ser notificado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

- (A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze a dezoito anos.
- (B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de quinze a dezoito anos.
- (C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a dezoito anos.
- (D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

- (A) 70 anos
- (B) 65 anos
- (C) 75 anos
- (D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção correta.

- (A) Doença ou agravo que incide de forma constante em uma região.
- (B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo do tempo em uma região.
- (C) Elevação estatisticamente significativa da incidência de uma doença ou agravo, acima da norma observada anteriormente, em uma região.
- (D) Redução significativa do número de casos de uma doença ou agravo em uma região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Acerca da hipertensão arterial, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Hipertensão arterial é definida como uma pressão sanguínea usual igual ou superior a 140/90mmHg.
- (B) Pré-hipertensão é uma nova designação usada para pressões sanguíneas entre 120/80mmHg e 139/89mmHg.
- (C) Em caso de pré-hipertensão, está bem estabelecido que os benefícios de se usar anti-hipertensivos superam os riscos do tratamento.
- (D) A hipertensão arterial é um fator de risco para fibrilação atrial passível de tratamento.

QUESTÃO 17

A respeito das doenças cardiovasculares, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Uma pressão sanguínea de 150/110mmHg (pressão de pulso de 40mmHg) acarreta o dobro do risco de cardiopatia coronária fatal que ocorre com uma pressão de 160/60mmHg (pressão de pulso de 100mmHg).
- (B) Em estudos populacionais, a prevalência de hipertensão arterial aumenta linearmente com o índice médio de massa corporal.
- (C) Diuréticos de alça são os diuréticos de escolha para se tratar hipertensão arterial em pacientes com doença renal crônica ou insuficiência cardíaca.
- (D) O efeito colateral mais comum dos inibidores da enzima conversora de angiotensina é a tosse seca.

QUESTÃO 18

Assinale a opção que NÃO corresponde a um motivo possível de ocorrência da insuficiência cardíaca.

- (A) Disfunção diastólica comumente associada a uma fração de ejeção normal.
- (B) Certas desordens da frequência e do ritmo cardíacos.
- (C) Disfunção sistólica caracterizada por uma fração de ejeção relativamente normal.
- (D) Estados clínicos em que o coração não consegue compensar para atender um fluxo sanguíneo periférico aumentado.

QUESTÃO 19

Assinale a opção que apresenta a dose recomendada de captopril para o tratamento inicial da insuficiência cardíaca.

- (A) Três vezes ao dia – 6,25mg.
- (B) Duas vezes ao dia – 12,5mg.
- (C) Duas vezes ao dia – 25mg.
- (D) Três vezes ao dia – 50mg.

QUESTÃO 20

Considere que um paciente de 30 anos, portador de asma alérgica intermitente, tenha desenvolvido um quadro agudo de falta de ar e sibilância, após a inalação de alérgenos. A medicação mais apropriada para o tratamento dessa crise é o(a)

- (A) salmeterol.
- (B) formoterol.
- (C) fenoterol.
- (D) budesonida.

QUESTÃO 21

Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Ocorre em 15% a 20% dos fumantes.
- II – É caracterizada por uma obstrução intermitente das vias aéreas.
- III – Em algumas famílias, o enfisema pan-acinar está associado à deficiência de alfa1-antitripsina.
- IV – O único tratamento que se mostra efetivo para alterar o curso da DPOC é a cessação do fumo.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, V.

QUESTÃO 22

No que se refere à pneumonia, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Caso o paciente tenha sido hospitalizado por menos de 48 horas antes do desenvolvimento dos sintomas respiratórios, considera-se que ele tem Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC).
- (B) Aspiração de material de orofaringe é o mecanismo mais comum pelo qual o pulmão é inoculado por organismos patogênicos.
- (C) O alcoolismo está associado com risco aumentado para infecção por *Streptococcus pneumoniae*, anaeróbios e tuberculose.
- (D) As pneumonias têm sempre etiologia infecciosa (viral, bacteriana, entre outras).

QUESTÃO 23

De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, para Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC) em Adultos Imunocompetentes (2004), assinale a opção que apresenta o(s) antibiótico(s) recomendado(s) para o tratamento ambulatorial inicial, empírico, de PAC em pacientes com doenças associadas, como, por exemplo, DPOC e diabetes.

- (A) macrolídio mais betalactâmico ou fluoroquinolona
- (B) macrolídio ou betalactâmico com inibidor de betalactamase
- (C) betalactâmico ou fluoroquinolona
- (D) penicilina G Benzatina ou fluoroquinolona

QUESTÃO 24

A respeito da úlcera péptica, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A dor pode irradiar-se para as costas e para o tórax.
- (B) Essa doença provoca sintomas em praticamente todos os casos.
- (C) A presença de diarreia importante deve levantar a suspeita de síndrome de Zollinger-Ellison.
- (D) O fator de risco maior é o *Helicobacter pylori*.

QUESTÃO 25

Em relação à diarreia, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A frequência normal de evacuações varia de 3 vezes por semana a 3 vezes por dia.
- (B) Rotavírus pode causar diarreia aguda em adultos, especialmente em idosos.
- (C) Diarreia é a segunda principal causa de morte no mundo. Principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade em países em desenvolvimento.
- (D) A diarreia é causada principalmente por motilidade gastrointestinal alterada.

QUESTÃO 26

Acerca das doenças gastrointestinais e hepáticas, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) Na colite ulcerativa, o reto quase sempre está inflamado, e essa inflamação expande-se continuamente no sentido proximal por uma extensão variável.
- (B) Fistulas intestinais para vagina, bexiga, pele e tecidos moles são complicações da doença de Crohn.
- (C) O risco de câncer está relacionado com a extensão e a duração da colite ulcerativa.
- (D) Na doença do Crohn, o processo inflamatório é contínuo como na colite ulcerativa e pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, especialmente o íleo terminal.

QUESTÃO 27

No que se refere a doenças gastrointestinais e hepáticas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A hipertensão porta é definida como um aumento na pressão da veia porta (maior que 10mmHg) em consequência de obstrução anatômica ou funcional ao fluxo sanguíneo no sistema venoso portal.
- II – Na esquistossomose mansônica, a obstrução ao fluxo sanguíneo é pós-sinusoidal.
- III – Ligadura ou escleroterapia endoscópica de varizes esofagogástricas é o procedimento de escolha para o controle de sangramento agudo na hipertensão porta.
- IV – Bloqueadores beta-adrenérgicos são considerados mais eficazes que a escleroterapia para a prevenção de sangramento inicial de varizes esofagogástricas.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 28

Em relação à síndrome nefrótica, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A síndrome nefrótica é caracterizada por albuminúria acima de 3,5g/24 horas no adulto.
- (B) A síndrome nefrótica pode ter como complicações eventos tromboembólicos e infecção.
- (C) Captopril pode ser causa de síndrome nefrótica.
- (D) Câncer de mama não é causa de síndrome nefrótica.

QUESTÃO 29

Quanto às glomerulonefrites, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) Podem ter causas infecciosas, tais como pneumonia pneumocócica e toxoplasmose.
- (B) No exame sumário de urina (EAS), a presença de cilindros hemáticos não contribui para o diagnóstico.
- (C) Glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é o tipo mais comum em crianças.
- (D) A maioria das formas de glomerulonefrite aguda são mediadas por mecanismos imunológicos.

QUESTÃO 30

Em relação ao diagnóstico de diabetes melito, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Ocorrem sintomas clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia e perda de peso, bem como uma glicemia plasmática ao acaso acima de 200mg/dL.
- II – A glicemia em jejum, acima de 8 horas, é igual ou superior a 126mg/dL.
- III – Duas horas após teste tolerância com ingestão de 75g de glicose anidra dissolvida em água, a glicemia é igual ou superior a 200mg/dL.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 31

Em relação ao tratamento do diabetes, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) Devido às suas características farmacológicas de secretagogas de insulina, as sulfoniluréias são usadas tanto no tratamento do diabetes tipo 1 e no de tipo 2.
- (B) Metformina é uma biguanida que inibe a gliconeogênese hepática.
- (C) Rosiglitazona tem como principais efeitos colaterais retenção de líquido, insuficiência cardíaca congestiva, ganho de peso, edema e anemia.
- (D) Acarbose tem como mecanismo de ação o retardamento na absorção de carboidratos.

QUESTÃO 32

No que se refere ao hipotireoidismo, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) O hipotireoidismo secundário é raro. Corresponde a menos de 1% de todos os casos.
- (B) A causa mais comum de hipotireoidismo primário, tanto em países desenvolvidos quanto em áreas subdesenvolvidas, é a tireoidite auto-imune, ou de Hashimoto.
- (C) Uma associação entre vitiligo e tireoidite auto-imune é observada eventualmente.
- (D) O lítio usado para tratamento de distúrbios afetivos, pode inibir a secreção de T3 e T4 e levar ao aparecimento de hipotireoidismo em 10% dos pacientes tratados.

QUESTÃO 33

Considerando os aspectos próprios da artrite reumatóide, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Comprometimento primário dos tecidos sinoviais.
- II – O fumo é um dos fatores que contribuem para o aumento do risco de desenvolvimento dessa doença.
- III – Drogas antimaláricas e metotrexate incluem-se no grupo de medicamentos denominados drogas anti-reumáticas modificadoras da doença.
- IV – Contraceptivos orais contribuem para o aumento do número de casos dessa doença.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 34

Acerca da escabiose, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A escabiose é transmitida no contato pele a pele e por fômites.
- (B) A escabiose provoca sintomas mesmo em pacientes que usam corticosteróides sistêmicos ou tópicos.
- (C) O diagnóstico é feito pelo exame microscópico do raspado de lesões cutâneas.
- (D) O uso de permetrina (uso tópico) e de ivermectina (uso oral) constituem o tratamento adequado para essa doença.

QUESTÃO 35

A respeito do controle de infecção hospitalar, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A redução na duração do curso de antibióticos pode ser um dos meios mais efetivos para controlar infecções resistentes a antibióticos.
- II – A adequada higiene das mãos reduz, nitidamente, a transmissão nosocomial de organismos resistentes.
- III – Produtos para higiene das mãos à base de álcool são inferiores a água e sabão para a higiene geral das mãos.
- IV – Diminuição da permanência hospitalar ou na UTI reduz a taxa de infecção por organismos resistentes a antibióticos.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 36

Em relação ao equilíbrio hidroeletrólítico do organismo, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Osmolalidade refere-se à concentração de todos os solutos.
- (B) Tonicidade refere-se à concentração de solutos que são efetivos em promover a passagem de água entre compartimentos do organismo.
- (C) O sódio é o principal cátion do fluido intracelular.
- (D) A hiponatremia pode ser hipertônica, isotônica e hipotônica.

QUESTÃO 37

Acerca dos efeitos agudos do uso de cocaína, assinale a opção INCORRETA.

- (A) ocorrência de midríase
- (B) desenvolvimento de hipertermia
- (C) euforia intensa
- (D) aumento do apetite

QUESTÃO 38

Assinale a opção que apresenta agentes terapêuticos que podem causar delírio e agitação quando ingeridos em doses tóxicas.

- (A) agonistas adrenérgicos
- (B) agentes anticolinérgicos
- (C) opióides como propoxifeno e tramadol
- (D) anticonvulsivantes

QUESTÃO 39

Assinale a opção que NÃO corresponde à classe de medicamento que melhor se enquadra para o tratamento de ataques agudos decorrentes de desordem do pânico.

- (A) inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs)
- (B) antidepressivos tricíclicos
- (C) benzodiazepínicos
- (D) betabloqueadores

QUESTÃO 40

A respeito das medidas a serem adotadas prioritariamente em um paciente que chega ao pronto-socorro com hematemese, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Iniciar o atendimento com avaliação e restauração do volume intravascular.
- II – Determinar nível de hemoglobina e hematócrito como índices confiáveis de perda sanguínea aguda.
- III – Obter acesso venoso e iniciar vigorosa reposição de volume com soluções eletrolíticas isotônicas.
- IV – Após a estabilização hemodinâmica, a endoscopia digestiva alta é o procedimento adequado para localizar a origem do sangramento.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, F.

QUESTÃO 41

No que se refere aos distúrbios hidroeletrólíticos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Se a diminuição do sódio sérico for abrupta e inferior a 120mmol/L, podem ocorrer convulsão e coma.
- II – O melhor tratamento para hiponatremia hipovolêmica é a administração de volume sob forma de solução com colóides ou cristalóides isotônicos.
- III – Na hiponatremia hipervolêmica, como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva e cirrose hepática, a conduta adequada consiste no tratamento da doença de base, restrição de sódio, uso de diuréticos e, em alguns pacientes, restrição de água.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 42

Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Deve-se evitar sal e antiinflamatórios não-esteroidais.
- II – É adequado o uso de drogas anti-arrítmicas, mesmo em arritmias assintomáticas.
- III – Deve-se usar diuréticos em pacientes com sobrecarga de volume para alcançar pressão venosa jugular normal e aliviar o edema.
- IV – É adequado o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina nos pacientes com insuficiência cardíaca sistólica.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 43

Considere que um paciente de 65 anos de idade, ex-tabagista, portador de DPOC grave, chegou ao serviço de emergência com febre, tosse com expectoração amarelada e piora da dispnéia. Ao exame médico, apresentou cianose, respiração laboriosa e sibilos pulmonares difusos, além de discreta hepatomegalia e edema de membros inferiores. Assinale a opção que apresenta a medida terapêutica inicial mais apropriada para esse paciente, enquanto são realizados os exames laboratoriais.

- (A) Administrar 40mg de furosemida IV.
- (B) Administrar oxigênio via cateter nasal, 5L/min, de forma contínua.
- (C) Administrar oxigênio via máscara venturi a 24%, associado a nebulização com fenoterol e brometo de ipratrópio diluídos em soro fisiológico.
- (D) Administrar oxigênio via cateter nasal, 5L/min, associado a nebulização com brometo de ipratrópio diluído em soro fisiológico

Considere o seguinte caso clínico hipotético para responder às questões 44 e 45.

Antônio, tabagista, 62 anos, procurou o pronto-socorro com queixas de dor precordial, que não melhora com uso de nitroglicerina, associada a náusea, palidez e apreensão.

QUESTÃO 44

Considerando as condutas indicadas caso os exames realizados tenham dado suporte ao diagnóstico presumido e o eletrocardiograma (ECG) tenha mostrado elevação de segmento, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Administrar imediatamente aspirina para o paciente mastigar, na dose de 162mg a 323mg, caso não tenha intolerância a aspirina.
- II – Avaliar a indicação de terapêutica de reperfusão (intervenção coronária percutânea ou agente fibrinolítico intravenoso).
- III – Considerar a intervenção coronária percutânea mais eficaz que a fibrinólise quando realizada em centros experimentados.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

QUESTÃO 45

São exames indicados após a realização de exame físico, EXCETO:

- (A) Eletrocardiograma.
- (B) CK e CK-MB.
- (C) Troponina T e troponina I.
- (D) Fibrinogênio.

QUESTÃO 46

São contra-indicações para o tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) com ativador de plasminogênio tissular, EXCETO:

- (A) ACVI com sintomas com duração inferior a 3 horas.
- (B) pressão arterial sistólica superior a 185mmHg e diastólica superior a 110mmHg.
- (C) convulsão no início do quadro do AVC.
- (D) neoplasia intracraniana.

QUESTÃO 47

Assinale a opção que apresenta o método diagnóstico de escolha para confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, caracterizado por alto valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade.

- (A) hemograma completo
- (B) radiografia de abdome
- (C) ecografia de abdome
- (D) tomografia computadorizada do abdome com contraste

QUESTÃO 48

Em relação à tuberculose disseminada, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Ocorre mais freqüentemente em pessoas muito jovens e em idosos.
- (B) A radiografia de tórax pode não mostrar anormalidades.
- (C) Corticosteróides são especialmente benéficos em associação com as drogas antituberculosas.
- (D) O teste tuberculino com PPD (*purified protein derivative*) é negativo em cerca de 50% dos casos.

QUESTÃO 49

Considere uma paciente, com 78 anos de idade, ex-fumante, portadora de síndrome de obesidade-hipoventilação, que tenha desenvolvido um agravamento do quadro respiratório no pós-operatório de uma cirurgia de revascularização miocárdica. Considere que os resultados ácido-básicos de uma das gasometrias realizadas no curso evolutivo apresentaram: pH = 7,17, PaCO₂ = 116mmHg, excesso de base = +12mmol/L. Esse quadro indica que a paciente apresenta acidose

- (A) respiratória aguda.
- (B) respiratória crônica agudizada ou acidose respiratória aguda parcialmente compensada.
- (C) metabólica aguda.
- (D) metabólica crônica.

QUESTÃO 50

Com relação ao tratamento da dor, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Acetaminofen pode ser prescrito em doses de até 4.000mg/dia.
- (B) Antiinflamatórios não-hormonais e inibidores de COX-2 freqüentemente provêm melhor analgesia que acetaminofen.
- (C) Meperidina, após dias de tratamento, pode causar mioclonia, ansiedade e convulsão.
- (D) Tramadol pode ser usado com segurança em pacientes com epilepsia.