

Caderno de Prova

\$53

Odontólogo

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Contato prematuro é um termo genérico que se refere a qualquer contato oclusal que, prematuramente, impede o fechamento mandibular na posição de Máxima Intercuspidação Habitual, Relação Cêntrica ou Relação de Oclusão Central ou durante os movimentos excursivos. Sobre os contatos oclusais prematuros, é **correto** afirmar:

- a. () Contatos prematuros são as causas mais comuns de patologias musculares da ATM.
- b. (X) Contatos prematuros nas posições estáticas e ou dinâmicas da mandíbula podem surgir de causas naturais, causas adquiridas ou causas disfuncionais.
- c. () Contatos prematuros na posição de relação cêntrica são considerados interferências oclusais.
- d. () Contatos prematuros devem ser ajustados por desgaste seletivo como tratamento oclusal profilático.
- e. () Procedimentos de ajuste oclusal devem ser indicados para alívio na fase aguda das Disfunções Têmporo-Mandibulares.

17. O trauma oclusal pode acelerar o índice de perda de inserção periodontal e perda óssea em paciente exposto previamente à Doença Periodontal Inflamatória. São sinais e sintomas da presença de trauma oclusal, **exceto**:

- a. (X) Desgastes acentuados da estrutura dentária.
- b. () Dor ou desconforto na região periodontal.
- c. () Abscessos periodontais e acentuada mobilidade.
- d. () Migração patológica dos dentes com conseqüente impacção alimentar.
- e. () Detecção radiográfica de ausência de lâmina dura lateralmente ou na região do ápice.

18. As disfunções Têmporo-Mandibulares (DTM) constituem-se numa série de sinais e sintomas caracterizados principalmente por dores faciais, dor e ruídos na ATM, dores de cabeça e dificuldade de abertura ou movimentação mandibular. Sobre as DTM, é **incorreto** afirmar:

- a. () Diferença entre Máxima Intercuspidação Habitual e Relação Central maior que 4 mm aumenta o risco de DTM.
- b. () Indivíduos com mordida cruzada unilateral e cinco ou mais dentes posteriores ausentes têm risco maior de desenvolver DTM.
- c. (X) Sobrepasso vertical maior que 6 a 7 mm aumenta o risco de o indivíduo vir apresentar DTM.
- d. () As DTM de origem muscular incluem desde mialgias até dores miofasciais.
- e. () Mioespasmos musculares unilaterais ou desordens degenerativas podem causar contatos prematuros.

19. O pênfigo vulgar é uma doença auto-imune, caracterizado pelo desenvolvimento de lesões vesículo-bolhosas na pele e nas membranas mucosas. É mais comum em adultos de meia idade, afetando igualmente ambos os sexos. Sobre o pênfigo vulgar, é **incorreto** afirmar que:

- a. (X) As lesões surgem de forma rápida e insidiosa.
- b. () O sinal de Nikolsky é um aspecto característico desta patologia.
- c. () A boca é o local mais comum de apresentação das lesões do pênfigo vulgar.
- d. () A dor e uma conseqüente perda de peso são queixas comuns.
- e. () O pênfigo vulgar é uma doença séria, ocorrendo mortalidade aproximadamente em 10% dos casos.

20. Um paciente de 47 anos, sexo masculino, branco e ex-tabagista apresentou-se na clínica odontológica queixando-se da presença de uma massa exofítica sés-sil na língua, com aspecto nodular bem-definido, com superfície lisa e rósea e indolor à palpação. O paciente relatou ter observado a presença da lesão há aproximadamente 2 anos e que esta cresceu lentamente. Por fim, o paciente informou que tem o hábito de mordiscar a lesão. Das opções abaixo, o diagnóstico mais provável é:

- a. () Lipoma.
- b. (X) Fibroma.
- c. () Mucocele.
- d. () Fibromatose lingual.
- e. () Granuloma piogênico.

21. A Síndrome de Sjögren é uma doença auto-imune, com manifestações sistêmicas diversas e de interesse particular na odontologia. Este agravo afeta principalmente mulheres entre 40 e 65 anos. Sobre a Síndrome de Sjögren, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Quando o paciente apresenta apenas xerostomia e ceratoconjuntivite, a Síndrome é chamada primária.
- b. () Quando o paciente apresenta a síndrome seca, mais alguma outra doença do tecido conjuntivo, a Síndrome é chamada secundária.
- c. () A presença de fator reumatóide positivo e fator anti-nuclear positivo na saliva do paciente pode preencher o critério de diagnóstico de Síndrome de Sjögren.
- d. (X) Uma complicação freqüente da Síndrome de Sjögren é o desenvolvimento de linfoma na parótida afetada pela doença.
- e. () A biópsia de uma glândula salivar maior afetada pode ser importante na confirmação do diagnóstico da Síndrome de Sjögren.

22. A cárie pode ser mutiladora e resultar em dores e desconforto da mesma maneira que a perda dos dentes. Sobre a cárie dentária, é **incorreto** afirmar que:

- a. (X) A doença cárie desaparece com o aumento da idade.
- b. () A má higiene bucal pode aumentar o risco do desenvolvimento de cáries dentárias.
- c. () A ingestão de alimentos ricos em carboidratos com alta freqüência aumenta o risco de desenvolvimento de cáries.
- d. () A saliva tem efeito tampão capaz de remineralizar as estruturas dentais.
- e. () O xilitol presente em algumas gomas de mascar não é metabolizado em ácido pelos microorganismos da placa.

23. Um paciente com 39 anos, sexo masculino, pele de cor clara e agricultor compareceu para consulta odontológica no ambulatório público. O cirurgião-dentista, após exame clínico detalhado, observou a presença de alteração da mucosa do lábio inferior, que apresentava áreas esbranquiçadas com perda da definição precisa entre a mucosa e a pele do lábio. Quanto a esta situação clínica, é **incorreto** afirmar:

- a. () A entidade clínica mais provável é queilite actínica.
- b. () O paciente deve ser orientado a usar protetor solar labial e chapéu de aba larga para atenuar ou paralisar o processo.
- c. (X) Retinóides sistêmicos podem ser empregados para atenuar ou paralisar o processo.
- d. () Podem surgir ulcerações espontaneamente ou como resultado de trauma.
- e. () Biópsia tem indicação pelo potencial do desenvolvimento para carcinoma de células escamosas.

24. A hemorragia intra-oral é causada pela ruptura de vasos sanguíneos que pode ocorrer em consequência de trauma, cirurgia ou alguma discrasia sanguínea. Sobre a hemorragia intra-oral, é **incorreto** afirmar:

- a. () A equimose é uma área de hemorragia maior, não elevada.
- b. () Um hematoma é o acúmulo localizado de sangue extravasado para os espaços teciduais.
- c. () Petéquia é uma área plana pequena de sangramento localizada.
- d. () Hematomas grandes podem necessitar de intervenção cirúrgica para drenagem.
- e. (X) Quando comprimido, um hematoma empalidece.

25. A gengivite ulcerativa necrosante é considerada uma doença inflamatória destrutiva da gengiva, que apresenta sinais e sintomas característicos. Sobre a gengivite ulcerativa necrosante, é **incorreto** afirmar:

- a. () As lesões típicas são depressões em forma de crateras na crista de papilas interdentárias.
- b. () Hemorragia gengival espontânea ou pronunciado sangramento ao menor estímulo são sinais clínicos característicos.
- c. (X) Odor fétido e redução da salivagem são sinais freqüentemente encontrados.
- d. () As lesões são extremamente sensíveis ao toque.
- e. () Níveis elevados de *Prevotella intermédia* e espiroquetas estão presentes.

26. Distúrbio autossômico-dominante na formação da dentina que apresenta dentes opalescentes em ambas as dentições e não é associado a doença sistêmica. Radiograficamente os dentes mostram fechamento prematuro das câmaras e canais pulpares. Das alternativas abaixo, a entidade clínica a que se refere o enunciado é:

- a. () Odontodisplasia.
- b. () Displasia Dentinária tipo I.
- c. () Displasia Dentinária tipo II.
- d. (X) Dentinogênese imperfeita.
- e. () Dentinogênese imperfeita hipomaturada difusa.

27. Anomalia de desenvolvimento dos molares no qual o corpo do dente afetado é muito amplo e as raízes associadas são encurtadas, com bifurcação próxima ao ápice. Além disso, o dente tende a ter uma forma retangular, com uma câmara pulpar ampla muito aumentada no sentido ápico-oclusal. Das alternativas abaixo, a entidade clínica a que o enunciado se refere é:

- a. (X) Taurodontia.
- b. () Macrodontia.
- c. () Dente Invaginado.
- d. () Dente de Mummery.
- e. () Dente de Hutchinson.

28. A radiografia periapical é a técnica radiográfica intrabucal indicada para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte. A principal característica desta técnica é a riqueza de detalhe da imagem radiográfica. Sobre a radiografia periapical, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Na técnica periapical do paralelismo, a imagem do processo zigomático da maxila é projetada acima dos ápices dos molares superiores.
- b. () Os dentes a serem avaliados e o receptor de imagem (filme) devem estar em contato ou o mais próximo possível.
- c. () A técnica periapical da bisettriz não deve ser utilizada para análise de coroas e cristas ósseas alveolares.
- d. (X) A anatomia da cavidade bucal não interfere na realização da técnica periapical do paralelismo.
- e. () Na técnica periapical da bisettriz, não é possível obter imagens reproduzíveis.

29. A interface alvéolo-restauração é a modificação da superfície radicular por instrumentos rotatórios, durante a cirurgia periodontal, para promover contorno ideal na confecção da restauração. São indicações do procedimento de interface alvéolo-restauração, **exceto**:

- a. () Eliminar lesão de furca grau I.
 - b. () Eliminar fratura radicular (em forma de “lasca”).
 - c. () Eliminar divergências entre a margem da restauração com a emergência da raiz do respectivo alvéolo.
 - d. () Aumentar a embrasura na proximidade radicular.
 - e. (X) Possibilitar acesso às lesões Classe V, sem invasão da unidade dentogengival.
-

30. Visualizar e, principalmente, diferenciar lesões oclusais brancas ativas de lesões oclusais brancas paralisadas nem sempre é tarefa fácil. Para o diagnóstico precoce de lesões oclusais, é fundamental realizar um exame clínico cuidadoso. São cuidados para realização deste, **exceto**:

- a. () Ótima iluminação.
 - b. () Uso de lentes de aumento.
 - c. (X) Uso de sonda exploradora.
 - d. () Secagem da superfície dentária.
 - e. () Limpeza da superfície oclusal com pasta profilática.
-

31. Quanto à inserção e à polimerização das resinas compostas, é **incorreto** afirmar que:

- a. () O fator C expressa em números a previsibilidade de a restauração falhar adesivamente.
- b. () A técnica do pulso tardio permite melhor controle do ponto G.
- c. () Resinas de tonalidades mais claras polimerizam mais facilmente e em menos tempo que as mais escuras.
- d. (X) Resinas compostas com alto módulo de elasticidade permitem o alívio das tensões induzidas pela contração de polimerização.
- e. () A polimerização da resina continua a ocorrer numa taxa significativa, por 20 minutos após a ativação.

32. As fraturas dos dentes anteriores, muitas vezes, marcam as pessoas de forma indelével para o resto da vida, independente da idade, do sexo e do nível socioeconômico do paciente. Sobre a fratura dos dentes anteriores em função de traumatismos, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Um dente anterior parcialmente irrompido com invasão do espaço biológico pode ser mantido sem restauração e aguardar a complementação da erupção dental.
 - b. (X) A chance de um fragmento colado vir a se desprender do remanescente dental diminui quanto mais jovem for o paciente.
 - c. () Dentes anteriores fraturados, já tratados endodonticamente com trespasse vertical maior, têm indicação do uso de pinos intraradiculares.
 - d. () Nas fraturas de esmalte/dentina com exposição pulpar, o tamanho da exposição pulpar não é fator determinante na escolha de tratamento.
 - e. () Dentes fraturados com exposição pulpar, com ápice incompleto e paredes radiculares delgadas, apresentam melhor prognóstico em relação ao tratamento conservador.
-

33. Na descrição da inervação sensorial da polpa dental, é **correto** afirmar:

- a. (X) A predominância de estímulos das fibras C produz dor que não é bem localizada.
- b. () As fibras A delta são fibras mielinizadas com alto limiar que transmitem dor aguda e transitória.
- c. () As fibras C são fibras amielinizadas com baixo limiar que produzem dor em respostas aos mediadores da inflamação.
- d. () A dor aguda e bem localizada em resposta ao frio é conduzida pela estimulação combinada da fibra A delta e da fibra C.
- e. () A dor paroxística ocorre pela estimulação das fibras C.

34. Um paciente queixa-se de dor lenta e constante, com duração de 3 dias, no lado esquerdo da face. O paciente observa que a dor aumenta com alterações posturais, quando se curva e quando se movimenta devagar. Das alternativas abaixo, o diagnóstico mais provável é:

- a. Infarto do miocárdio.
 - b. Pulpite irreversível.
 - c. Dor facial atípica.
 - d. Sinusite maxilar.
 - e. Cefaléia em cacho.
-

35. O tratamento mais bem indicado para dor espontânea intensa e pulsátil, associada a um primeiro molar inferior direito, dente 46, é:

- a. Pulpotomia.
 - b. Pulpectomia.
 - c. Pulpectomia parcial.
 - d. Agentes antiinflamatórios e analgésicos.
 - e. Agentes antiinflamatórios e antibióticos.
-

36. O antibiótico indicado para um paciente com prótese de articulação, que é alérgico a penicilina e cefalosporina, é:

- a. Tetraciclina.
 - b. Amoxicilina.
 - c. Azitromicina.
 - d. Metronidazol.
 - e. Clindamicina.
-

37. Na inflamação aguda, as primeiras células a passarem através das paredes dos vasos sanguíneos para o tecido são:

- a. Eosinófilos.
- b. Linfócitos.
- c. Neutrófilos polimorfonucleares.
- d. Monócitos.
- e. Basófilos.

38. Uma criança de 9 anos estava jogando futebol no período de recreio da escola, quando bateu a boca na cabeça de um colega e teve o dente 11 avulsionado. Nesta situação, das alternativas abaixo qual o fator mais importante para o prognóstico favorável para o tratamento desta avulsão:

- a. A rapidez da reimplantação.
 - b. A preparação apropriada do alvéolo.
 - c. A descontaminação da superfície radicular.
 - d. O início apropriado do tratamento endodôntico.
 - e. Realizar uma radiografia periapical para verificar se não houve fratura alveolar.
-

39. O bloqueio mandibular pode ser obtido pela técnica de Gow-Gates. Sobre esta técnica, é **incorreto** afirmar que:

- a. Anestesia de modo adequado todas as partes sensoriais do nervo mandibular.
 - b. O início da anestesia é rápido e ela tem longa duração.
 - c. A área alvo é a parte lateral do colo do côndilo abaixo da inserção do músculo pterigóideo lateral.
 - d. Apresenta um baixo índice de aspiração positiva.
 - e. Apresenta um maior índice de sucesso do que a técnica de bloqueio tradicional do nervo alveolar inferior.
-

40. A recessão tecidual marginal é causada por múltiplos fatores. Assinale a alternativa que **não** apresenta um desses fatores.

- a. Doença periodontal.
- b. Escovação traumática.
- c. Predisposição genética.
- d. Inserção muscular baixa.
- e. Movimentos ortodônticos.

41. O edema ocorre após cirurgias, como resultado do traumatismo dos tecidos. Sobre o edema pós-operatório, é **incorreto** afirmar que:

- a. O assoalho de boca exibe pouca tendência para o edema.
- b. Quanto maior a quantidade de tecido lesado, maior a quantidade de edema.
- c. Corticosteróides sistêmicos são úteis no controle do edema, somente se administrados antes de o tecido ser lesado.
- d. O lábio contém grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo e pode exibir significativo edema.
- e. O edema ocorre devido ao acúmulo de líquidos no espaço intersticial devido à transudação dos vasos lesados e da obstrução linfática da fibrina.

42. Muitos tipos de materiais de sutura estão disponíveis e são classificados por tamanho, capacidade de reabsorção e se são mono ou polifilamentados. Sobre o material de sutura, é **incorreto** afirmar que:

- a. A sutura de seda trançada não é absorvível e pode resultar em um "efeito de pavio", atraindo bactérias e fluidos para o local da ferida.
- b. O náilon é uma sutura de poliéster tipo monofilamento, biologicamente inerte e não absorvível.
- c. O gut liso é absorvível, tem somente resistência média à tração e perde 50% da força da sutura após 24 horas de exposição aos fluidos intra-orais.
- d. O gut crômico recebe um tratamento que condiciona o material a resistir às enzimas do organismo por um período de 7 a 10 dias.
- e. Os fios absorvíveis naturais têm indicação de uso para realização de suturas em pacientes que apresentam xerostomia.

43. A adequada classificação de Miller em relação às recessões gengivais permite maior precisão no prognóstico relacionado ao tratamento de cobertura radicular. Sobre esta classificação, é **incorreto** afirmar que:

- a. Na classe I, a localização da recessão gengival está aquém da junção mucogengival e não há perda de estrutura periodontal interdental.
- b. Na classe II, a recessão gengival interproximal encontra-se apical em relação à junção cimento-esmalte, mas numa posição coronal em relação à base da recessão.
- c. Na classe III, a previsão de cobertura radicular é parcial.
- d. Na classe IV, a margem gengival encontra-se apical em relação ao limite apical da recessão.
- e. Na classe IV, não há previsão de cobertura radicular pelos métodos cirúrgicos convencionais.

44. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 2002), está **correto** afirmar que:

- a. A saúde bucal não foi contemplada na NOAS-SUS 2002 como área de atuação estratégica mínima da condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
- b. A correspondência entre a prática clínica e a capacidade resolutiva diagnóstica e terapêutica ainda não foi considerada como um dos itens que o gestor estadual deve adotar para a organização regionalizada das ações de média complexidade.
- c. Quanto à forma de gestão, os municípios podem se habilitar em três modalidades: Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada; Gestão Plena do Sistema Municipal e Gestão Parcial do Sistema Municipal.
- d. A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
- e. Será o Ministério da Saúde que fará a gestão do SUS nos municípios não habilitados, enquanto for mantida a situação de não habilitação.

45. A remoção de dentes impactados pode ser extremamente difícil ou relativamente sem dificuldades e fácil. Para determinar o grau de dificuldade antes da execução da cirurgia, o cirurgião-dentista deve realizar cuidadosa classificação da condição do dente impactado e assim avaliar o grau de dificuldade da cirurgia e conduzi-la de forma ordenada, aumentando a previsibilidade do procedimento e proporcionando um melhor pós-operatório ao paciente. Sobre os sistemas de classificação de dentes impactados, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Na impactação classe C de Pell e Gregory, o terceiro molar mandibular está abaixo da linha cervical do segundo molar.
- b. () Na impactação horizontal com relacionamento de classe 2 com o ramo mandibular e classe B de profundidade, a extração é classificada como moderadamente difícil.
- c. (X) Na impactação classe 1 A de Pell e Gregory, o terceiro molar superior está posicionado à frente da tuberosidade e a sua superfície oclusal está no mesmo nível do segundo molar.
- d. () A impactação mesioangular do terceiro molar superior responde a cerca de 12% das impactações.
- e. () Na impactação horizontal, a superfície oclusal dos terceiros molares inferiores, em geral, está imediatamente adjacente à raiz do segundo molar, o que, com frequência, produz grave e precoce doença periodontal.

46. O leite materno é muito importante no primeiro ano de vida para a saúde da criança. Da alta capacidade nutritiva ao poder de imunização, do prazer físico à necessidade psicológica, da estimulação adequada à boca e ao sistema respiratório, o aleitamento natural se constitui no cuidado mais completo que se pode dar ao bebê. O cirurgião-dentista generalista, ou o odontopediatra, deve incentivar e saber prover informações às mães e à comunidade sobre o aleitamento materno. Sobre ele, é **incorreto** afirmar que:

- a. () A mãe deve acomodar a bochecha do bebê mais próximo à mama; isso fará com que o bebê vire o rosto para procurar o mamilo.
- b. (X) Ao amamentar o filho, a mãe deve deixá-lo de barriga para cima deitado no colo.
- c. () O bebê deve mamar num seio, depois noutro, para estimular os dois lados do seu corpo.
- d. () Na amamentação natural, o leite só entra na boca em quantidade proporcional à força de sucção.
- e. () O processo de amamentação, além de alimentar, fornece estímulos necessários para o desenvolvimento harmonioso do sistema bucal.

47. O amálgama de prata, inclusive em ambulatórios públicos, até os dias atuais, é um dos materiais mais utilizados em restaurações de dentes posteriores. Sobre o amálgama de prata, é **incorreto** afirmar que:

- a. () Uma vantagem da brunidura pós-escultura é a diminuição da infiltração marginal.
- b. () As bruniduras pré-escultura e pós-escultura podem ser consideradas uma continuação da condensação do amálgama.
- c. () A escultura de uma restauração de amálgama deve ser iniciada quando o material estiver em processo inicial de cristalização e apresentar certa resistência ao corte.
- d. () O polimento das restaurações confeccionadas, tanto com liga convencional como de alto teor de cobre, proporciona diminuição significativa de infiltração marginal.
- e. (X) Paredes convergentes nas cúspides de trabalho induzem fraturas, uma vez que o amálgama nas margens tem menor espessura e maior possibilidade de coincidir com os contatos em cêntrica.

48. Até a presente data, seis vírus distintos que causam hepatite foram identificados: vírus da hepatite A, B, C, D, E, G. A hepatite é uma doença infecto-contagiosa e o cirurgião dentista, dentre os profissionais da saúde, apresenta elevado risco de contágio. Sobre as hepatites é correto afirmar, **exceto**:

- a. () O dentista vacinado contra o vírus da hepatite B está também protegido contra a infecção do vírus da hepatite D.
- b. () Em pacientes recuperados de hepatite B, o cirurgião-dentista deve entrar em contato com o médico e pedir testes laboratoriais de HBsAg e anti-HBs.
- c. () Se a hepatite for ativa, independente do tipo, o paciente deve receber apenas tratamento odontológico urgencial.
- d. (X) O vírus da hepatite E é um vírus incompleto, para o qual não existe vacina.
- e. () As fontes de contágio da hepatite C são sangue e fluidos corporais.

49. Sobre a fluoretação das águas de abastecimento, está **correto** afirmar que:

- a. () É fundamental entre as crianças com fins à redução da cárie dentária, porém é ineficaz entre os mais idosos, quando a estrutura dentária já está formada.
- b. () É economicamente injustificável, pois apenas uma pequena parcela dela é utilizada para ingestão; o restante se perde na pequena indústria, na higiene ou na lavagem de calçadas, por exemplo.
- c. (X) A instituição de tal prática chegou a reduzir a prevalência de cárie dentária em determinados municípios brasileiros em até, ou às vezes mais, 65%.
- d. () No Brasil, atualmente o risco da fluorose é muito maior que os benefícios advindos dessa prática, sendo a mesma desaconselhada como medida de saúde pública.
- e. () A grande dificuldade de implementação, e da maior difusão, da fluoretação das águas de abastecimento ao longo das décadas de 1980 e 1990 foi a ausência de legislação específica sobre o tema.

50. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), está **correto** afirmar que:

- a. () O SUS é um sistema de saúde singular em todo o mundo por não permitir que a iniciativa privada atue de forma complementar.
- b. () É inegável o avanço da promulgação da lei 8.080 para o serviço de saúde brasileiro, mas indica-se como lacuna o entendimento de que saúde restringe-se a um processo biológico.
- c. () Ações na área de vigilância epidemiológica, assistência terapêutica integral e saúde do trabalhador estão no campo de atuação do SUS; ações na área de vigilância sanitária referem-se ao campo de saúde, mas não no âmbito do SUS.
- d. () A lei 8.080 é dita "paternalista", uma vez que ressalta o dever do Estado na garantia da saúde, eximindo de responsabilidade as pessoas, as famílias e as empresas.
- e. (X) A lei 8.080 garante ao sindicato dos trabalhadores requerer ao órgão competente a interdição de máquina quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>