

Caderno de Prova

S45

Médico (Reumatologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência
projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no
senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
 - b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
 - c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
 - d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
 - e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.
-

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
 - b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
 - c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
 - d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
 - e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
-

21. Em relação à investigação da osteonecrose de cabeça do fêmur na sua fase inicial, assinale o exame de maior sensibilidade para o diagnóstico:

- a. () radiografia simples.
- b. (X) ressonância magnética.
- c. () angio-tomografia óssea.
- d. () tomografia computadorizada.
- e. () cintilografia óssea com tecnécio 99.

22. No lupus eritematoso sistêmico com envolvimento de sistema nervoso central, assinale a afirmativa que melhor identifica a presença de lesões:

- a. () angiografia digital.
 - b. () angio-tomografia cerebral.
 - c. (X) ressonância magnética do cérebro.
 - d. () potencial evocado visual e auditivo.
 - e. () tomografia computadorizada cerebral.
-

23. Assinale a afirmativa correta em relação aos testes diagnósticos utilizados no diagnóstico das miosites:

- a. (X) Anti-Mi2 é um auto-anticorpo associado a quadros de dermatomiosite.
 - b. () Anti-JO 1 é o anticorpo miosite específico mais comum, e está associado à calcinose e à vasculite.
 - c. () FAN ocorre em menos de 50% dos casos de polimiosite ou dermatomiosite.
 - d. () A aldolase é a enzima muscular mais frequentemente elevada nos casos de miosite ativa.
 - e. () O anti-SRP está associado à polimiosite de início agudo, geralmente de excelente prognóstico.
-

24. Assinale, entre as afirmativas abaixo, aquela que inclui os testes diagnósticos que devem ser solicitados na análise de um paciente com monoartrite aguda:

- a. () LDH, glicose, cloretos, citologia total e diferencial e gram.
- b. () pesquisa de cristais, citologia total e diferencial, cultura, PH e glicose.
- c. () citologia total e diferencial, cloreto, cultura e glicose.
- d. () citologia total e diferencial, gram, cultura, PH e glicose.
- e. (X) citologia total e diferencial, gram e cultura, pesquisa de cristais com microscópio de luz polarizada.

25. Em relação aos testes diagnósticos utilizados na artrite reumatóide, assinale a afirmativa **correta**.

- a. () Fator reumatóide positivo pode ocorrer em sífilis, endocardite bacteriana aguda e hanseníase.
 - b. (X) A presença de anti-CCP positivo pode preceder o diagnóstico clínico da artrite reumatóide.
 - c. () Anti-CCP tem uma sensibilidade e especificidade bem superior ao fator reumatóide no diagnóstico de artrite reumatóide.
 - d. () O método de enzima imunoensaio (ELISA) é o mais utilizado para a realização do fator reumatóide.
 - e. () O fator reumatóide e o anti-CCP juntos ocorrem em menos de 50% dos pacientes com artrite reumatóide.
-

26. Assinale a afirmativa **correta** em relação às espondiloartropatias:

- a. () A artrite reativa determina cronicidade e destruição articular em mais de 50% dos pacientes acometidos.
- b. () O uso de agentes biológicos anti-TNF deve ficar restrito apenas àqueles casos de envolvimento axial severo, que não tiveram resposta ao uso de metotrexate e sulfassalazina.
- c. () O uso de pamidronato por via oral 60mg a cada 6 meses é uma opção terapêutica mais eficaz que o infliximabe no comprometimento articular periférico da espondilite.
- d. () O uso de glicocorticóide oral é freqüente e importante nos casos de espondilite anquilosante.
- e. (X) O uso de antiinflamatórios não hormonais de forma contínua determina menor progressão clínica e radiológica na espondilite anquilosante.

27. Em relação à artrite psoriásica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Um local raro de envolvimento axial na artrite psoriásica é a coluna cervical.
 - b. () Tubérculos coróides na retina são manifestações oculares na artrite psoriásica.
 - c. () Anti-CD20 é uma terapia efetiva nos quadros de envolvimento articular periférico.
 - d. (X) Envolvimento de interfalangiana distal, entesite e sacroileíte unilateral são manifestações comuns.
 - e. () O envolvimento ungueal é raro nos pacientes com artrite periférica, contrário aos casos de envolvimento axial.
-

28. No lupus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Talidomida é a droga de escolha nos casos de lupus com lesões cutâneas do tipo discóide.
 - b. () Anti-CD20 não pode ser utilizado nos pacientes com nefrite classe IV.
 - c. (X) Micofenolato mofetil é uma boa opção terapêutica nos quadros de nefrite lúpica membranosa.
 - d. () Inibidores da enzima conversora da angiotensina não devem ser utilizados nos casos de nefrite membranosa com proteinúria.
 - e. () Imunoglobulina intra-venosa está contra-indicada nos pacientes com lupus e trombocitopenia.
-

29. São efeitos adversos dos glicocorticóides, com **exceção** da:

- a. () dislipidemia.
- b. () aterosclerose.
- c. (X) perda de peso.
- d. () necrose avascular.
- e. () hipertensão arterial.

30. Em relação aos autoanticorpos encontrados nos pacientes com lupus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Anti-PL2 está associado ao lupus cutâneo subagudo variante anular.
- b. () Anti-Ro está relacionado com menor envolvimento cutâneo.
- c. () Anti-Jo1 está relacionado com hipertensão pulmonar no lupus eritematoso sistêmico.
- d. () Anti-Sm tem maior sensibilidade para o diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico.
- e. (X) Anti-RNP está mais associado à superposição, fenômeno de Raynaud, miosite e envolvimento pulmonar intersticial.

31. No tratamento da artrite reumatóide, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A leflunomida não pode ser utilizada com anti-TNF alfa.
- b. () A associação do antagonista do receptor de interleucina 1 com etanercepte é segura e mais efetiva na AR do que o uso isolado do etanercepte.
- c. () O antagonista do receptor de interleucina 6 (anakinra) é mais eficaz que rituximabe nos casos de artrite reumatóide soronegativa.
- d. (X) O uso de anti-TNF em combinação com metotrexate é superior ao uso de metotrexate utilizado como monoterapia.
- e. () Rituximabe, um anticorpo monoclonal totalmente humano contra a molécula CD20 expressa nos linfócitos B, é uma droga efetiva na artrite reumatóide.

32. São desordens eosinofílicas que fazem diagnóstico diferencial com a Síndrome de Churg Strauss, **exceto**:

- a. () Fasciíte eosinofílica.
- b. (X) Síndrome de Löfgren.
- c. () Leucemia eosinofílica.
- d. () Síndrome hipereosinofílica.
- e. () Pneumonia eosinofílica crônica.

33. Assinale a afirmativa **incorreta**, em relação ao tratamento da artrite reumatóide:

- a. (X) O uso de glicocorticóides na AR deve ser preferencialmente em dose baixa (menor que 10 mg de prednisona/dia) e associado a DMARDs.
- b. () A dose correta do abatacept é 5 mg/kg subcutâneo, uma vez por mês.
- c. () O uso do rituximabe na AR inclui duas aplicações intra-venosas de 5 mg/kg, com intervalo de 15 dias.
- d. () O uso de ácido fólico associado ao metotrexate deve ser evitado por perda de eficácia.
- e. () A leflunomida 20 mg via oral 1 vez ao dia não deve ser associada ao metotrexate por maior toxicidade.

34. Assinale a afirmativa **correta**, em relação às afecções reumáticas de partes moles:

- a. () A tenossinovite estenosante dos dedos (dedo em gatilho) pode ser secundária a doenças endócrinas como tireoidite de Hashimoto e acromegalia.
- b. () Pacientes com epicondilite lateral exacerbam a dor com a flexão forçada do punho contra a resistência.
- c. () Tenosinovite de Quervain caracteriza uma inflamação do extensor longo do polegar e do abductor curto do polegar.
- d. (X) Na síndrome do canal de Guyon, temos parestesias do aspecto volar do 4º e 5º dedo da mão e ausência de parestesia na face dorsal ulnar da mão.
- e. () A síndrome do túnel do carpo está associada ao teste de Tinel no punho e manobra de Allen positiva.

35. São causas de osteoporose, **exceto**:

- a. (X) amiloidose.
- b. () doença celíaca.
- c. () hipogonadismo.
- d. () hipertireoidismo.
- e. () hiperparatireoidismo.

36. Em relação à fibromialgia, assinale a afirmativa **correta**.

- a. () Gabapentina combinada com pregabalina e tiagabina são uma opção eficaz em fibromialgia.
- b. (X) Topiramato pode melhorar a alodínia e hiperalgisia e auxiliar na profilaxia de enxaqueca e perda de peso no paciente com fibromialgia.
- c. () Amitriptilina associada à fluoxetina, que é um inibidor de recaptção dupla (noradrenalina e serotonina), tem se mostrado efetiva em fibromialgia.
- d. () Exercícios aeróbicos são prejudiciais para os pacientes com fibromialgia.
- e. () O uso de neurolépticos está indicado para o controle da dor da maioria dos pacientes.

37. As patologias abaixo podem estar associadas à presença de anticorpo antinuclear positivo (FAN), com **exceção** de:

- a. (X) Síndrome Löeffler.
- b. () Síndrome de Sjögren.
- c. () Lupus induzido por droga.
- d. () Hipertensão pulmonar primária.
- e. () Esclerose sistêmica.

38. Em relação às vasculites, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Arterite temporal ou de células gigantes é a vasculite mais comum em pacientes acima dos 50 anos, e cursa geralmente com cefaléia de início recente.
- b. () A VHS costuma ser bastante elevada na arterite temporal, habitualmente acima de 50 mm na 1ª hora.
- c. (X) O padrão P-ANCA está mais associado à poliangeíte microscópica e o antígeno envolvido é a proteinase 3.
- d. () O C-ANCA é um teste importante para o diagnóstico de granulomatose de Wegener, considerando a sua frequência e sua especificidade.
- e. () O HIV e o vírus C da hepatite podem ser causas de vasculites e devem ser lembrados na investigação de pacientes com vasculite.

39. Em relação à osteoporose e doença de Paget, assinale a alternativa **correta**:

- a. () O uso de estrogênio como tratamento de osteoporose é melhor que os bisfosfonatos e assim devem ser sempre utilizados nas mulheres pós-menopausa, como primeira opção.
- b. () Os análogos do paratormônio (teriparatida) são drogas que aumentam a reabsorção óssea.
- c. () Na doença de Paget, é comum encontrarmos envolvimento dos ossos do carpo, fosfatase alcalina normal e cálcio sérico elevado.
- d. () As fraturas de crânio são muito comuns em osteoporose, sendo seguidas pelas de quadril e ossos do tornozelo.
- e. (X) O raloxifeno é uma droga que inibe reabsorção óssea e, em relação aos bisfosfonatos, tem menor eficácia na redução do número de fraturas de quadril.

40. Entre as afirmativas abaixo, assinale a **incorreta**:

- a. (X) Anti-Sm, é um anticorpo muito sensível no diagnóstico de lupus.
- b. () Derrame pleural é uma das manifestações que pode ser encontrada nos pacientes com lupus eritematoso sistêmico em atividade.
- c. () Anti-RO é o anticorpo que atravessa a placenta e pode induzir lupus neonatal.
- d. () Anti-DNA está mais relacionado com nefrite lúpica e o seu nível pode flutuar com a atividade da doença.
- e. () Célula LE não deve ser solicitado para o diagnóstico de lupus, considerando sua menor positividade, quando comparado com o FAN.

41. São características comuns da poliangeíte microscópica, **exceto**:

- a. () ANCA positivo.
- b. () Capilarite pulmonar.
- c. () Presença de mononeurite múltipla.
- d. (X) Associação com vírus B da hepatite.
- e. () Acometimento de vasos de pequeno calibre.

42. Em relação ao uso de drogas anti-reumáticas na gestação e lactação, assinale a afirmativa **incorreta**:

- a. O sulfato de hidroxicloroquina não pode ser utilizado durante o período de lactação.
 - b. Ciclosporina e micofenolato mofetil estão classificadas como categoria de risco fetal C (FDA), devendo ser evitadas na gestação.
 - c. Antiinflamatórios não hormonais devem ser evitados no terceiro trimestre pelos riscos de hemorragia materna no parto e pelo risco de fechamento prematuro do ducto arterioso.
 - d. Metildopa e hidralazina são antihipertensivos seguros na gestação de uma paciente com lupus eritematoso sistêmico.
 - e. Pacientes reumáticas em uso de anti-TNF que engravidam, não necessitam interromper a gestação.
-

43. Em relação a complicações associadas à osteoartrite de joelho, assinale a afirmativa **correta**:

- a. A dor da osteoartrite costuma ser maior em repouso e se associa com rigidez matinal prolongada.
 - b. Bursite anserina, osteonecrose e artrite microcristalina podem ser fatores exacerbadores da dor articular.
 - c. O líquido sinovial costuma ser não inflamatório com mais de 20 mil células/mm³
 - d. O raio x demonstra osteopenia, erosões marginais e osteófitos.
 - e. A velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa estão frequentemente elevadas nas exacerbações algicas.
-

44. São doenças auto-imunes órgão específicas associadas à Síndrome de Sjögren, **exceto**:

- a. diabetes melito.
 - b. esclerose múltipla.
 - c. cirrose biliar primária.
 - d. tireoidite de Hashimoto.
 - e. espondiloartropatia indiferenciada.
-

45. Assinale a alternativa **correta** em relação ao tratamento da Síndrome de Sjögren:

- a. O uso de abertura do ponto lacrimal com laser determina boa resposta ocular.
 - b. O uso de anti-CD 20 não tem sido efetivo nos casos de linfoma da Síndrome de Sjögren.
 - c. O uso de anti-TNF tem se mostrado pouco eficaz na síndrome de Sjögren primária.
 - d. O sulfato de hidroxicloroquina tem menor eficácia quando comparado com difosfato de cloroquina.
 - e. Análogos nicotínicos, como pilocarpina 50 mg 3 vezes ao dia, ou cevimelina 5mg 3 vezes ao dia melhoram o quadro de ceratoconjuntivite seca.
-

46. São manifestações músculo-esqueléticas, associadas ao vírus HIV, **exceto**:

- a. osteonecrose.
 - b. artrite reativa.
 - c. artrite psoriásica.
 - d. doença de Dupuytren.
 - e. espondiloartropatia indiferenciada.
-

47. São manifestações reumáticas associadas ao hipotireoidismo, **exceto**:

- a. síndrome do túnel do carpo.
 - b. displasia epifisária.
 - c. condrocalcinose.
 - d. fibromialgia.
 - e. miopatia.
-

48. São consideradas síndromes para-neoplásicas que mimetizam doenças reumáticas, **exceto**:

- a. vasculite cutânea.
- b. fasciite eosinofílica.
- c. lupus ou eritema pérmio.
- d. distrofia simpático-reflexa.
- e. poliartrite soronegativa.

49. Em relação às injúrias associadas com corredores, assinale a **incorreta**.

- a. () Fraturas de estresse são comuns nos ossos da tíbia e fíbula.
 - b. () Síndrome do estresse tibial medial (shin splints) ocorre com maior freqüência nos corredores iniciantes.
 - c. () Síndrome da banda íleo-tibial é uma condição causada pelo atrito no côndilo femoral lateral.
 - d. () Tendinite de Achilles é comum em corredores de superfície dura e em atletas que tenham o arco longitudinal alto.
 - e. (X) Síndrome de dor patelo-femural ou síndrome dolorosa no joelho anterior é uma complicação incomum.
-

50. Em relação às doenças reumáticas de início na infância, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A utilização do abatacepte nos casos de artrite idiopática juvenil poliarticular deve ser considerada na falha do uso de metotrexate.
- b. () O diclofenaco sódico, o naproxeno e o tolmetin são antiinflamatórios aprovados pelo FDA para o tratamento da artrite idiopática juvenil.
- c. () A uveíte secundária e a artrite idiopática juvenil ocorrem com maior freqüência nas meninas com a forma poliarticular e podem complicar com vasculite de retina, episclerite e glaucoma.
- d. (X) O subgrupo de início sistêmico ocorre em 10 a 20% dos casos de artrite idiopática juvenil; apresenta ferritina elevada, anemia, leucocitose e enzimas hepáticas elevadas.
- e. () O uso de anakinra é pouco eficaz na artrite idiopática juvenil de início sistêmico.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>