

Texto 1

Quando é verão no Recife e as acácias se preparam para voar, tudo é abril nos corações:
os que o amam sentem desmanchando-se na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol enquanto o rio soluça ferido de luz carregado de paisagens mansas e pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós
pesado de vivos e mortos também ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e intacto:
porque é abril no Recife e abril nos corações
e as acácias se desmancham em flor e começam a voar.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória)

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não evidencia, claramente e por si só, a função poética da linguagem é:

- A) “é verão no Recife”
- B) “as acácias se preparam para voar”
- C) “tudo é abril nos corações”
- D) “o rio soluça ferido de luz”
- E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:

- I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
- II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
- III. a despeito dos seus problemas, é amada.

Está (ão) **correta** (s) a (s) informação (ões):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 03

A única informação equivocada sobre as relações de sentido entre as idéias do texto 1 é:

- A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações que se coordenam por adição e indicam o tempo em que “tudo é abril nos corações”.
- B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de as acácias se prepararem.
- C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o rio soluça ferido de luz”.
- D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo e intacto”, há uma relação antagônica, marcada lingüisticamente pela conjunção “mas”.
- E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio soluça ferido de luz”.

Texto 2

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a convivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a mulher e embrutece o homem.

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a população canta “*beber, cair e levantar*”, ou “*dinheiro na mão e calcinha no chão*”? O que adianta o governo estadual criar novas delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e violenta? (...)

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos?

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das Flores! Eu quero o meu sertão de volta!

Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.

- () Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
- () No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão de um grupo organizado.
- () No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe social e questiona a aplicação da lei.
- () No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
- () No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do velho”.
- () No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:

- A) F – F – V – V – V – V
- B) F – V – F – V – V – V
- C) V – V – V – V – V – V
- D) F – F – F – F – F – F
- E) V – F – F – V – V – V

QUESTÃO 05

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?

- A) "...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja"
- B) "O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos..."
- C) "...o que se escuta é música de péssima qualidade..."
- D) "Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem..."
- E) "Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos."

QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?

- A) "... com a **CONIVÊNCIA** da maioria das prefeituras e rádios do interior..."
 - **CUMPLICIDADE**
- B) "...letras que **INCITAM** à violência sexual..."
 - **ESTIMULAM**
- C) "... não **COÍBEM**, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos..."
 - **IMPEDEM**
- D) "... matriz sexual **CHULA**..."
 - **FALSA**
- E) "... praticassem um **ESTELIONATO** poético..."
 - **FRAUDE**

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto original implica erro é:

- A) "Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco..."
- B) "E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos..."
- C) "Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró..."
- D) "...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético..."
- E) "Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical!"

QUESTÃO 08

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva contraria idéias defendidas no texto?

- A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade em todos os espaços de convivência.
- B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
- C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos favorecidos, mas também aqueles com maior poder aquisitivo.
- D) Ainda que essas bandas se digam de "forró eletrônico", a música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
- E) Como usam indevidamente o nome forró para a música que fazem, esses conjuntos musicais praticam um estelionato poético.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira Coluna	Segunda Coluna
1. Integralidade	() Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
2. Universalidade	() É garantido ao usuário ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
3. Equidade	() O Sistema de Saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda atenção necessária, sem qualquer custo.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 3, 1.
- C) 2, 1, 3.
- D) 3, 1, 2.
- E) 1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta** em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS):

- A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
- B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
- C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família
- D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família.
- E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica.

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 25% dos delegados eram representantes das instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os outros 75% da sociedade civil.
- B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil.
- C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90.
- D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação.
- E) Sua organização concretizou a proposta do debate democrático, possibilitando que os representantes da sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais e políticos.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) A Lei nº. 8.080/90 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- D) De acordo com a Lei nº. 8.080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- E) De acordo com a lei nº. 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a alternativa incorreta:

- A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano.
- B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para as Equipes de Saúde da Família e duas para as Equipes de Saúde Bucal.
- C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros.
- D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula: população / 2400.
- E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica de Saúde.

QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, porém sem direito a voz e voto.
- B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município;
- C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.
- D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, com direito a voz e voto.
- E) A participação é voluntária e não-remunerada.

QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:

- A) Vigilância ambiental.
- B) Promoção à saúde.
- C) Vigilância epidemiológica.
- D) Vigilância sanitária.
- E) Vigilância em saúde do trabalhador.

QUESTÃO 16

Com relação às lesões ligamentares do tornozelo é verdadeiro afirmar:

- A) No teste de estresse por inversão e eversão a inclinação do talus superior a cinco graus indica lesão ligamentar total.
- B) A inclinação superior a trinta graus indica ruptura de todos os ligamentos.
- C) Os estudos variam entre os autores e não há um consenso quanto aos valores que indicam ruptura ligamentar, nem de quais ligamentos.X
- D) Valores inferiores a vinte e três graus não indicam rupturas ligamentares
- E) Inclinações inferiores a dez graus são indicativos de lesão apenas envolvendo o ligamento talofibular anterior.

QUESTÃO 17

Com relação à reparação cirúrgica das lesões meniscais é falso afirmar:

- A) A sutura dos meniscos é um procedimento de conhecimento que data do século XIX e foi descrita, em 1885, por Annandale.
- B) A sutura dos meniscos pode ser realizada por via aberta ou por via artroscópica.
- C) Os joelhos estáveis apresentam melhores resultados e menor incidência de recidiva da lesão meniscal.
- D) A reparabilidade é indiferente da zona vermelha com zona vermelha, zona vermelha com zona branca e zona branca com zona branca.
- E) acesso aberto pósterio medial para o corno posterior é muito mais fácil que o acesso pósterio lateral.

QUESTÃO 18

Com relação às fraturas localizadas no tornozelo, a de Cotton é fratura:

- A) do maléolo medial desviada.
- B) do maléolo lateral desviada.
- C) trimaleolar.
- D) bimaleolar sem luxação.
- E) bimaleolar com luxação..

QUESTÃO 19

Em um paciente portador de fratura fechada bilateral segmentar da tíbia, qual seria a melhor indicação para o tratamento se não existem complicações sistêmicas ou locais?

- A) Haste intramedular travada bilateral.
- B) Aparelho gessado ínguino-podálico bilateral.
- C) Placa longa bilateral.
- D) Duas placas em cada tíbia.
- E) Fixação com parafusos e aparelho gessado.

QUESTÃO 20

Na classificação de Müller para as fraturas distais do fêmur, caracterizam o tipo A:

- A) fratura supracondileana com fragmento coronal da tróclea femoral.
- B) fratura supracondileana do femur sem comprometimento dos côndilos femorais.
- C) fratura supracondileana cominutiva com fratura intercondileana do fêmur.
- D) fratura intercondileana sem comprometimento supracondileano.
- E) fratura cominutiva dos côndilos femorais e da patela.

QUESTÃO 21

Com relação às fraturas peritrocantéricas é falso afirmar:

- A) A fratura do tipo 1 (Boyd e Griffin) se estende ao longo da linha intertrocantérica do trocânter maior ao trocânter menor.
- B) As fraturas do tipo 2 (Boyd e Griffin) são de fácil redução e estabilização.
- C) As fraturas do tipo 3 (Boyd e Griffin) são subtrocantéricas.
- D) As fraturas do tipo 3 (Boyd e Griffin) podem estar associadas com graus variáveis de fragmentação óssea e são de difícil redução.
- E) As fraturas do tipo 4 (Boyd e Griffin) são da região trocanteriana e diáfise proximal com, pelo menos, dois planos, um dos quais é sagital, de difícil visualização na radiografia convencional.

QUESTÃO 22

A monobra de Stimson para redução da luxação coxo femoral é realizada com o paciente em:

- A) decúbito dorsal e o joelho do paciente sobre o ombro do ortopedista.
- B) mesa ortopédica em decúbito lateral e com tração transóssea femoral.
- C) decúbito dorsal no solo com o pé do ortopedista da sínfise púbica e tração do membro luxado.
- D) decúbito ventral e tração ao longo do eixo do membro.
- E) decúbito ventral, com o quadril fletido em 90 graus com o ortopedista tracionando o membro em direção ao solo e um auxiliar pressionando a região trocanteriana para baixo.

QUESTÃO 23

Com relação às fraturas acetabulares, o percentual de artrose tardia, mesmo diante de uma intervenção cirúrgica perfeita está entre:

- A) dois a cinco por cento.
- B) dez a vinte por cento.
- C) oitenta a noventa por cento.
- D) menos de um por cento.
- E) de quarenta a sessenta por cento.

QUESTÃO 24

São indicações para o tratamento cirúrgico das fraturas da clavícula em adultos todas as abaixo, exceto:

- A) envolvimento neuro vascular.
- B) fraturas da extremidade distal (lateral) com ruptura dos ligamentos coracoclaviculares.
- C) ombro flutuante.
- D) fraturas com desvio angular superior a quinze graus.
- E) separação dos fragmentos com risco iminente de exposição por necrose cutânea.

QUESTÃO 25

Não se constituem critérios para avaliação da aceitação dos desvios das fraturas distais do rádio:

- A) idade e profissão do paciente.
- B) comprimento rádio ulnar.
- C) inclinação frontal do radiografia.
- D) inclinação sagital do rádio.
- E) incongruência articular.

QUESTÃO 26

Na classificação de Salter-Harris para as lesões fisárias da criança é correto afirmar que:

- A) independe do tipo de lesão o prognóstico do crescimento do membro.
- B) tipo V é o de mais difícil diagnóstico e de pior prognóstico.
- C) sinal de Trhust Holand caracteriza o tipo I
- D) tipo III, com frequência, é fácil de reduzir e não necessita de cirurgia.
- E) no tipo I é compulsório a realização de ressonância magnética para o correto tratamento.

QUESTÃO 27

Em uma fratura de falange de uma criança tipo Salter Harris III ou IV, o melhor tratamento é:

- A) conservador com redução e imobilização gessada.
- B) cirúrgico com microplaca e microparafusos.
- C) cirúrgico com redução e fixação por fios de cerclagem.
- D) cirúrgico com redução anatômica e fixação com fios de Kirschner transfisários.
- E) cirúrgico com redução anatômica fechada e mini-fixador externo.

QUESTÃO 28

Nas fraturas do terço médio dos ossos do antebraço na criança, são indicação de tratamento cirúrgico todas as abaixo, exceto:

- A) fraturas expostas.
- B) fraturas desviadas em pacientes próximo ao término do crescimento esquelético.
- C) bilateralidade.
- D) fraturas irreduzíveis por interposição de partes moles.
- E) refraturas repetidas em curto intervalo de tempo.

QUESTÃO 29

São complicações freqüentes das fraturas supracondileanas do úmero na criança tratadas por redução fechada e imobilização gessada todas as abaixo, exceto:

- A) lesões neurológicas (neuropaxias).
- B) consolidação em varo ou valgo do cotovelo.
- C) lesão da artéria braquial.
- D) rigidez da articulação do cotovelo com perda da flexo-extensão e da pronossupinação.
- E) bolhas e flictenas cutâneas ao nível do cotovelo.

QUESTÃO 30

Com relação as fraturas do colo do fêmur na criança é correto afirmar.

- A) Os resultados do tratamento com maior índice de complicações são os das fraturas do tipo I (transepifisárias).
- B) tratamento das fraturas do colo do fêmur na criança com maior índice de bons resultado é o obtido com tração e aparelho gessado.
- C) as fraturas do tipo II (transcervicais) não têm o seu prognóstico definido pelo grau de deslocamento dos fragmentos.
- D) as fraturas do tipo IV (cervicotrocantéricas) têm melhor prognóstico independentemente do tipo de tratamento instituído.
- E) não existe como complicação do tratamento relato de condrólise por lesão da cartilagem articular.

QUESTÃO 31

Com relação às fraturas do platô tibial na classificação de Schatzker a fratura do tipo III é:

- A) exclusivamente por clivagem.
- B) clivagem com depressão.
- C) fraturas bicondilares.
- D) fraturas do côndilo medial.
- E) exclusivamente por depressão central

QUESTÃO 32

Com relação às fraturas da patela, o tratamento conservador:

- A) nunca deve ser efetuado.
- B) pode ser efetuado em pacientes com mais de sessenta anos com qualquer diastase ou incongruência.
- C) pode ser realizado em pacientes com diastase máxima de 3 a 4 mm e incongruência de 2 a 3 mm.
- D) se realizado, consiste em aparelho gessado inguino podálico por sessenta dias sem carga
- E) sempre dá bons resultados.

QUESTÃO 33

Em uma fratura exposta de diáfise de tibia tipo III A de Gustillo e Anderson, com perda cutâneo muscular e exposição da face ânteromedial da cortical óssea proximal, qual seria a **melhor** opção de tratamento?

- A) Osteossíntese com placa lateral e cobertura da tibial com enxerto de pele total
- B) Fixação por fixador externo biplanar e cobertura da tibia com o gastrocnêmio medial.
- C) Fixação por haste intramedular travada e cobertura da tibia com retalho muscular do tibial anterior
- D) Limpeza cirúrgica em mobilização com aparelho gessado.
- E) Estabilização por fixador externo e cobertura da tibia por retalho músculo cutâneo reverso do bíceps sural.

QUESTÃO 34

No tratamento de uma fratura exposta diafisária tipo I de Gustillo e Anderson em um paciente adulto, ela pode ser considerada fechada para a indicação de seu tratamento com relação a:

- A) contaminação bacteriana.
- B) profilaxia de tétano.
- C) evolução.
- D) indicação do tipo de osteossíntese
- E) estabilidade.

QUESTÃO 35

Em uma fratura exposta grau I ou II de Gustillo e Anderson, por ocasião da realização de osteossínteses com placa e parafusos, ou hastes, a via de acesso a ser utilizada deve:

- A) sempre aproveitar a lesão traumática.
- B) ser a adequada, evitando-se no possível a ferida traumática.
- C) qualquer via de acesso independentemente de se tratar de uma fratura exposta.
- D) ficar o mais longe possível da ferida traumática para evitar contaminação.
- E) cruzar a lesão traumática em 45°.

QUESTÃO 36

Em uma criança de oito anos, que apresenta uma escoliose torácica e manchas café-com-leite na pele em número maior que seis, qual o provável diagnóstico?

- A) Siringomielia.
- B) Neurofibromatose
- C) Paralisia cerebral.
- D) Síndrome de Marfan.
- E) Hemivértebra congênita.

QUESTÃO 37

A displasia congênita progressiva do quadril é mais comum em:

- A) meninos, da raça negra, de apresentação pélvica.
- B) meninas brancas e primogênicas.
- C) meninos brancos e primogênicos.
- D) meninas negras de apresentação pélvica.
- E) meninos brancos independentemente da apresentação no parto.

QUESTÃO 38

Segundo a OMS, qual o principal fator associado a osteoporose estabelecida?

- A) Perda das trabéculas ósseas no estudo radiológico da pelve.
- B) Valor da densidade óssea maior que 2 desvios-padrão abaixo do esperado para a faixa etária.
- C) Valor da densidade óssea maior que dois desvios-padrão abaixo do esperado e pelo menos uma fratura por fragilidade óssea.
- D) Valor para densidade óssea superior a um desvio-padrão abaixo do esperado para jovens saudáveis.
- E) Múltiplas fraturas espontâneas.

QUESTÃO 39

Os principais elementos de diagnóstico da artrite séptica do quadril são:

- A) Ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia.
- B) História clínica, exame físico e exames séricos complementares.
- C) Punção articular dirigida por ultrassonografia e ressonância magnética.
- D) Cintilografia óssea e tomografia computadorizada.
- E) Exame radiológico, punção articular e cultura com antibiograma.

QUESTÃO 40

Em uma criança de seis anos, negra, com genu varo bilateral, que apresenta em seu exame físico, rosário raquítico, crânio tabes, alargamento das metáfises, qual o diagnóstico provável?

- A) Escorbuto.
- B) Anemia falciforme.
- C) Doença de Von Vilebran.
- D) Raquitismo.
- E) Osteogênese imperfeita.

QUESTÃO 41

Diante de um pé plano de uma criança de seis anos de idade, irredutível, que radiologicamente apresenta como único achado alteração ângulo talo calcaneano por verticalização do talo, o provável diagnóstico é:

- A) pé plano postural por se tratar de um pé rígido.
- B) distrofia muscular progressiva, pois nesta idade as deformidades tornam-se fixas.
- C) talo vertical congênito, pois esta deformidade só se faz presente nesta faixa etária.
- D) coalizão tarsal porque nesta idade as imagens de raios x não mostram as barras ósseas nesta idade.
- E) mielomeningocele porque esta deformidade é progressiva.

QUESTÃO 42

O escorregamento epifisário proximal do fêmur ocorre com **mais frequência** em:

- A) pacientes na puberdade com sobrepeso.
- B) em crianças entre os cinco e dez anos de idade após um traumatismo banal.
- C) em pacientes que terminaram o crescimento e apresentam hipotireoidismo.
- D) em pacientes do sexo masculino com hipogonadismo.
- E) acomete pacientes adultos.

QUESTÃO 43

Na fibrodysplasia ossificante progressiva (FOP) **não** é verdadeiro:

- A) ossificação de músculos e aponeuroses de caráter progressivo.
- B) ossificação em áreas submetidas a intervenção cirúrgica.
- C) ser de característica hereditária de transmissão autossômica dominante.
- D) apresentar surtos inflamatórios periarticulares ao nível da origem ou da inserção dos tendões.
- E) apresentar ossificação nos músculos onde foram realizadas injeções intramusculares.

QUESTÃO 44

Com relação à tuberculose da coluna vertebral, é **verdadeiro** afirmar:

- A) é sempre secundária a enfermidade em outro sistema.
- B) acomete principalmente a região da junção lombosacra
- C) nunca leva a comprometimento neurológico.
- D) não existe influência na frequência epidemiológica com relação aos pacientes transplantados e portadores de imunodeficiência adquirida.
- E) o tratamento da tuberculose da coluna vertebral é sempre operatório.

QUESTÃO 45

Nos pacientes em crescimento, portadores de osteomielite hematogênica crônica, é **falso** afirmar:

- A) A principal bactéria da osteomielite hematogênica é o *S. aureus*.
- B) O tratamento deve ser multidisciplinar.
- C) A formação de sequestros é uma eventualidade rara.
- D) O diagnóstico precoce é a chave do sucesso para evitar a cronificação.
- E) O início da infecção é quase sempre metafisário em tíbia proximal e fêmur distal.

QUESTÃO 46

O tratamento conservador do pé torto congênito típico

- A) é obsoleto devendo-se iniciar logo pela cirurgia.
- B) não tem espaço após a criação do fixador externo de Ilizarov.
- C) deve ser tentado sempre antes da indicação de tratamento operatório.
- D) deve ser iniciado após os seis meses de vida quando o paciente tem condições de pele para suportar o aparelho gessado
- E) não deve ser tentado.

QUESTÃO 47

A enfermidade de Dupuytren está associada com, *exceto*:

- A) Diabetes mellitus.
- B) Epilepsia.
- C) Uso de anticonvulsivantes.
- D) Fatores raciais.
- E) Doença de Crohn.

QUESTÃO 48

São técnicas para tratamento do hallux valgus todas as abaixo, *exceto*:

- A) Lapidus.
- B) Keller.
- C) Wilson.
- D) Giovaninni.
- E) Lanbrinudi.

QUESTÃO 49

Com relação a hérnia discal lombar, assinale a alternativa *correta*:

- A) Todos os pacientes sintomáticos devem ser operados por discectomia e estabilização.
- B) Apenas os pacientes com quadro algico ou neurológico que não curem devem ser operados por discectomia, ficando a estabilização reservada aos pacientes com instabilidade ou espondilartrose grave.
- C) O tratamento cirúrgico jamais deverá ser realizado pelos riscos a este inerentes.
- D) A estabilização não faz parte do arsenal cirúrgico dos pacientes portadores de hérnias discais.
- E) Todos os pacientes devem ser tratados por radioterapia e se operados deverão ter o disco substituído por uma prótese discal..

QUESTÃO 50

Não faz(em) parte da Síndrome de Apert

- A) Sindactilia múltipla.
- B) Sinostose crânio facial.
- C) Bridas cutâneas amnióticas.
- D) Exoftalmia.
- E) Retardo mental.

RAASCUNHO