

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO

21. Um operário chega ao ambulatório da empresa apresentando pele fria, pegajosa, cianótica, nível de consciência alterado, enchimento capilar lento. Os sinais e sintomas descritos sugerem choque do tipo:
- A) anafilático.
 - B) neurogênico.
 - C) espinhal.
 - D) hipovolêmico.
 - E) térmico.
22. Ao realizar uma atividade educativa, com um grupo de adolescentes, sobre doenças sexualmente transmitidas, a enfermeira falou dos sinais e sintomas delas. Com relação à sífilis, as informações corretas compõem o item:
- A) secundária, caracteriza-se por lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas), alterações neurológicas, cardiovasculares e articulares.
 - B) terciária, tem como características pápulas de coloração eritemo-acastanhada, lisas a princípio, e posteriormente escamosas, conhecidas como sífilides papulosas.
 - C) primária, caracteriza-se pela presença de lesão rosada ou ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, com base endurecida, fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa.
 - D) congênita, tardia e caracteriza-se por obstrução nasal, coriza, fistula peribucal, surdez neurológica, pênfigo palmo-plantar, hepatomegalia, anemia severa.
 - E) latente, com características de lesão papulosa, dolorosa e hepatoesplenomegalia.
23. A escala de coma de Glasgow tem por objetivo:
- A) determinar a gravidade no trauma abdominal.
 - B) fornecer medidas semiquantitativas do grau de envolvimento cerebral.
 - C) determinar a gravidade no choque.
 - D) fornecer sinais de pneumotórax.
 - E) determinar a gravidade no infarto do miocárdio.
24. Na avaliação primária, nos casos de emergência, utiliza-se na palpação, preferencialmente, o pulso:
- A) radial e femural.
 - B) carotídeo e braquial.
 - C) femural e braquial.
 - D) carotídeo e radial.
 - E) poplíteo e radial.
25. Assinale o item que contém o esquema correto para o tratamento relativo ao esquema básico (Esquema I) dos casos novos de todas as formas de Tb pulmonar e extra pulmonar.
- A) 1ª fase de tratamento – 4 meses com RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
 - B) 1ª fase de tratamento – 2 meses – RH – (Rifampicina e isoniazida).
 - C) 2ª fase de tratamento – 2 meses RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
 - D) 2ª fase de tratamento – 4 meses RH (Rifampicina e isoniazida).
 - E) 2ª fase de tratamento – 4 meses RHZ (Rifampicina, isoniazida, pirazinamida).
26. A tuberculose é um problema mundial de saúde pública. Infecta aproximadamente um terço da população do mundo e permanece como a principal causa de morte por doença infecciosa. Todas as afirmativas estão corretas, **exceto**:
- A) A tuberculose é a principal causa de morte entre as pessoas HIV-positivas.
 - B) O *Mycobacterium tuberculosis*, também denominado bacilo de Koch (BK) é o agente causador da tuberculose.
 - C) A tuberculose está intimamente ligada à pobreza, desnutrição, multidão, alojamento em condições deficientes de cuidados.
 - D) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente, pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos.
 - E) Sua transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar.
27. O Músculo preferencial para administração de medicação intramuscular, por provocar dor de menor intensidade, ser o local mais distante de nervos e vasos importantes e ter o tecido subcutâneo menos denso, é denominado de:
- A) glúteo máximo ou grande glúteo.
 - B) deltóide.
 - C) músculo glúteo médio.
 - D) músculo vasto lateral.
 - E) músculo trapézio.
28. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde, ‘não como ausência de doença’ e sim como ‘um bem-estar biopsicossocial’ para melhorar a qualidade de vida da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005)”. Baseados nessa definição, pode-se afirmar que a atuação da enfermagem é:
- A) cuidar do paciente estritamente no ambiente hospitalar.
 - B) dar atendimento prioritário às necessidades físicas do paciente.
 - C) recuperar, manter e promover a saúde do paciente.
 - D) auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico de moléstias.
 - E) promover e recuperar a saúde do paciente.
29. Os cuidados de emergência para uma pessoa que, após uma queda, apresenta fratura com extremidades ósseas expostas no membro superior direito, compreendem:
- A) cobrir a pele e ossos expostos e aplicar uma tração suave sobre a fratura.

- B) cobrir o local da exposição óssea com material limpo e imobilizar com talas, mantendo o membro na posição encontrada.
 C) cobrir e imobilizar o local acima da fratura na posição funcional.
 D) aplicar uma tração para alinhar as extremidades ósseas e imobilizar.
 E) cobrir a pele e ossos e enfaixar o membro superior direito.
30. Deverá ser considerado como tuberculose pulmonar (Tb) positiva o caso que apresentar:
 A) uma baciloscopia direta positiva apenas.
 B) duas baciloscopias diretas positivas.
 C) uma baciloscopia direta positiva e cultura negativa.
 D) uma baciloscopia direta negativa e imagem radiológica sugestiva de Tb.
 E) cultura positiva e baciloscopia negativa.
31. Em relação aos ferimentos nos olhos, o protocolo de Suporte Básico de Vida (SAMU-2004) define o seguinte procedimento:
 A) aplicar curativo oclusivo, sobre ambos os olhos para limitar movimentos.
 B) efetuar pressão no globo ocular.
 C) retirar corpos estranhos.
 D) recolocar no lugar o globo ocular protuso.
 E) lavar abundantemente com soro glicosado estéril e continuar a irrigação durante o transporte.
32. Na avaliação clínica, o enfermeiro utiliza quatro métodos propedêuticos. Ao realizar o exame abdominal, o mesmo deve seguir a seqüência de:
 A) percussão, seguida de inspeção, ausculta e palpação.
 B) ausculta após a inspeção e antes da palpação e da percussão.
 C) palpação depois da inspeção e antes da percussão e ausculta.
 D) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
 E) inspeção, percussão, palpação e ausculta.
33. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem define como responsabilidades do profissional de enfermagem as seguintes situações, **exceto**:
 A) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
 B) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, somente quando praticadas individualmente.
 C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, da coletividade e do desenvolvimento da profissão.
 D) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal, e somente aceitar cargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.
 E) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de Saúde.
34. Lesões acidentais que podem ser acompanhadas de perdas de tecido e ocorrem sob condições não assépticas e por isso apresentam predisposição para infectar são classificadas como feridas:
 A) contaminadas. B) cirúrgicas.
 C) infectadas. D) traumáticas.
 E) incisais.
35. Escreva nos parênteses (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, marque a opção que contém a seqüência correta:
 () A vacina contra a Hepatite B é administrada via intramuscular profunda, sendo no vasto lateral da coxa direita.
 () A vacina BCG-ID é administrada a partir do nascimento, em dose de 0,1ml, na inserção inferior do deltóide direito..
 () A tetravalente é aplicada em dose de 0,5ml intramuscular, sendo no vasto lateral da coxa esquerda, aos dois, quatro e seis meses.
 () As vacinas Sabin e rotavírus, ao serem administradas e eliminadas pela criança, por meio de choro ou vômito, devem ser administradas novamente.
 () A vacina triviral é de aplicação subcutânea e protege contra sarampo, rubéola e caxumba, sendo indicada aos 12 meses, com reforço aos 5 anos.
- A) F F F V V. B) F V V F F.
 C) V V V F V. D) F V F V F.
 E) V F V V V
36. Na Unidade de Emergência, o Código de Ética permite a execução das ações de enfermagem ao cliente inconsciente, sem o seu consentimento ou do representante legal. Nessa situação de iminente perigo à vida, as ações do enfermeiro são orientadas pelo:
 A) princípio ético da beneficência. B) princípio ético da prevaricação.
 C) consentimento esclarecido e renovado. D) postulado bioético de demanda.
 E) consentimento omissivo ou implícito.
37. Um cliente diabético, com 75 anos, que vive só, deve saber utilizar o glucômetro e interpretar o resultado para administrar a sua dosagem correta de insulina. Um dos fatores que lhe impede o desempenho seguro é:
 A) a não adesão à atividade. B) a perda de peso.
 C) o senso-percepção visual alterado. D) a troca gasosa ineficaz.
 E) alimentação inadequada.

38. A equipe de enfermagem está legalmente habilitada a exercer a profissão de acordo com as atividades previstas na Lei do Exercício Profissional nº 7498/86 e Decreto Lei nº 94406/87. Essa equipe é composta de:
- A) enfermeiros.
 - B) enfermeiro e técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro.
 - C) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e instrumentador.
 - D) enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
 - E) enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem.
39. A educação em saúde é uma das atividades dos enfermeiros voltada à prevenção do Diabetes *Mellitus*. Analise as afirmativas a seguir, sobre os procedimentos adequados aos portadores da referida doença.
- I. Usar sapatos confortáveis; utilizar meias de algodão; verificar a presença de fissuras e outras lesões de pele entre os dedos.
 - II. Examinar os pés diariamente com espelho, para visualizar a parte inferior dos dedos, e testar a água do banho com o pé.
 - III. Lavar os pés com água morna e sabão neutro, secando bem os espaços entre os dedos.
 - IV. Evitar calçados mal ajustados, não andar descalço e pedir ajuda de um familiar para examinar os pés, caso não consiga fazê-lo sozinho.
 - V. Quando sentado, manter pés para cima, mexer dedos, tornozelos. Não cruzar pernas por longos períodos.
- Assinale a opção correta.
- A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 - B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 - C) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
 - E) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
40. O cuidado mais importante na emergência com um paciente após sofrer um acidente automobilístico e com uma possível lesão medular cervical é:
- A) colocar-lhe a coluna em posição flexionada.
 - B) imobilizar-lhe a cabeça e a coluna, mantendo-as em alinhamento.
 - C) avaliar para ver se o cliente pode mover os membros inferiores.
 - D) verificar os sinais vitais a cada 10 minutos.
 - E) deitar a vítima em decúbito dorsal.
41. São princípios e diretrizes da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:
- A) Participação da comunidade, regionalização e centralização dos serviços nas capitais dos Estados.
 - B) Regionalização, hierarquização da rede de serviços de saúde e centralização político-administrativa.
 - C) Universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, hierarquização e centralização político-administrativa.
 - D) Universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
 - E) Integralidade de assistência e centralização político-administrativa.
42. Um servidor ao chegar ao seu setor de trabalho, apresentou convulsão tônico-clônica. A enfermeira da instituição é chamada, com urgência, para:
- A) proteger-lhe a cabeça e as demais extremidades do corpo, evitando-lhe o contato com os objetos.
 - B) fazer-lhe contenção dos membros superiores e inferiores.
 - C) elevar-lhe a cabeça e conter-lhe os membros inferiores.
 - D) colocar-lhe uma espátula de madeira entre os dentes e lateralizar-lhe a cabeça.
 - E) proteger-lhe o corpo e elevar-lhe os membros inferiores.
43. Segundo o Ministério da Saúde (2005), as doenças sexualmente transmissíveis (DST), decorrentes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, podem ser evitadas com o uso de medicamentos de reconhecida eficácia profilática. As medicações penicilina G, benzatina, ceftriaxona, azitromicina, metronidazol são as mais utilizadas para a profilaxia das seguintes DSTs:
- A) sífilis, gonorréia, herpes genital, hepatite B.
 - B) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, cancro mole.
 - C) clamidíase, herpes simples, herpes genital, gonorréia.
 - D) sífilis, gonorréia, cancro mole, tricomoníase
 - E) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, sífilis.
44. As vacinas de DPT, sarampo, Sabin e BCG têm aplicação respectivamente:
- A) IM, SC, VO, ID.
 - B) IM, VO, ID, SC.
 - C) VO, IM, ID, SC.
 - D) ID, IM, VO, SC.
 - E) SC, IM, VO, ID.
45. Entre as doenças de notificação compulsória, as de fluxo rápido de comunicação e notificação imediata são:
- A) sarampo e febre amarela.
 - B) tuberculose e AIDS.
 - C) hanseníase e difteria.
 - D) tracoma e sarampo.
 - E) esquistossomose e tuberculose.

46. Nos anexos da portaria nº 5 de 21 de fevereiro de 2006, da lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória constam:
- A) Dengue, varíola, tuberculose e eventos adversos pós-vacina.
 - B) Dengue, mononucleose, tétano e varíola.
 - C) Hanseníase, toxoplasmose, malária e peste.
 - D) Sarampo, toxoplasmose, herpes simples e hepatites virais.
 - E) Mononucleose, toxoplasmose, tétano e malária.
47. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. Para tanto, fez constar em cada esfera de governo os Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde Municipais são compostos por representantes:
- A) do governo e dos usuários.
 - B) do governo, dos usuários e dos profissionais de saúde.
 - C) do governo, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço.
 - D) do governo, dos usuários, dos profissionais da saúde e dos prestadores de serviço.
 - E) do governo e prestadores de serviços.
48. Na imobilização dos membros inferiores ou superiores, em caso de fratura, é necessário:
- A) verificar o pulso distal, a sensibilidade e a perfusão antes e após a imobilização.
 - B) imobilizar uma articulação acima da lesão.
 - C) fazer o alinhamento do membro.
 - D) fixar as talas da região proximal para a distal.
 - E) fazer curativo oclusivo antes da imobilização.
49. No Sistema de Informação em Saúde, os agravos de notificação e investigação epidemiológicas são registrados no:
- A) SIM (Sistema de Informação de Mortalidade).
 - B) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
 - C) SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos).
 - D) SIH (Sistema de Informações Hospitalares).
 - E) SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais).
50. "O processo pelo qual se consegue eliminar os microorganismos não patogênicos e patogênicos de determinado objeto" é realizado através da:
- A) aplicação das técnicas de assepsia.
 - B) utilização de métodos de saneamento básico.
 - C) aplicação de técnicas de assepsia médica e assepsia cirúrgica.
 - D) utilização de técnicas de esterilização.
 - E) aplicação de técnicas de lavagem manual.
51. O enfermeiro atua no Programa Nacional de Imunização em todas as fases, desde o planejamento até a administração do imunobiológico na população alvo. Compete à equipe de vacinação:
- A) identificar a vacina a ser administrada, dose, via, tipo, e orientar o uso de medicamentos e cuidados no local da aplicação da BCG.
 - B) identificar a vacina a ser administrada, dose, via, tipo, local, orientar os pais ou responsáveis quanto às reações e agendar a data do retorno.
 - C) contra-indicar a administração de vacina em desnutridos e em usuário de antimicrobianos.
 - D) evitar a associação de vacinas por aumentar a incidência de efeitos indesejáveis.
 - E) orientar os pais ou responsáveis para as possíveis reações e aplicar compressas quentes no local aplicado.
52. Considera-se atitude de risco nas precauções universais:
- A) Lavar as mãos antes e após cada procedimento.
 - B) Usar luvas no manuseio de sangue e fluídos corpóreos.
 - C) Aplicar medicação endovenosa sem luvas de procedimento.
 - D) Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) na assistência a Herpes Zoster.
 - E) Observar a limpeza e a desinfecção de equipamentos e ambientes hospitalares.
53. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, curável, ocasionada pelo *Mycobacterium leprae*. Durante o tratamento, o paciente e seus familiares devem ser orientados quanto:
- A) à necessidade do isolamento protetor para os portadores da hanseníase do tipo virchowiano ou dimorfa.
 - B) à internação do paciente para efetivação do tratamento precoce, visando à interrupção da cadeia epidemiológica e a avaliação de incapacidade física.
 - C) à observação dos comunicantes, em especial, as crianças do sexo feminino, devido ao bacilo caracterizar-se pela alta infectividade e baixa patogenicidade neste grupo.
 - D) aos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos e a retornar a unidade de saúde na ocorrência desses efeitos.
 - E) à sua exclusão do convívio social e familiar.
54. O surgimento de doenças de origem ocupacional vem crescendo e, mesmo com os programas de prevenção, na saúde do trabalhador, há o aparecimento da falta de vontade e indisposição para qualquer atividade, sensação de cansaço, mesmo após o sono, suscetibilidade psíquica e tendência à depressão. Esses sintomas podem surgir com mais frequência em trabalhadores de turnos:
- A) matutino.

- B) vespertino.
 - C) de 12 x 36 diurno.
 - D) noturno.
 - E) matutino/vespertino com revezamento.
55. Segundo o Ministério da Saúde (2001), o tratamento do diabetes *mellitus* inclui prioritariamente a adoção:
- A) dos hipoglicemiantes orais aos pacientes com diabetes infanto-juvenil.
 - B) dos hipoglicemiantes orais a todos os pacientes com insuficiência renal crônica.
 - C) de comportamentos que acentuem o risco para obesidade e tabagismo.
 - D) da hospitalização precoce para modificação dos hábitos de vida.
 - E) de medidas educativas que favoreçam as modificações dos hábitos e, se necessário, a introdução medicamentosa.
56. Assinale a opção correta:
- A) A atual política de saúde que instituiu o Sistema Único de Saúde não estabelece a participação do setor privado.
 - B) O Sistema Único de Saúde desconsidera a participação social através de conselhos e conferências de saúde.
 - C) O Sistema Único de Saúde mantém a tradicional política centralizadora das ações no nível federal.
 - D) O Sistema Único de Saúde tem como princípio básico o acesso universal aos serviços públicos de saúde.
 - E) O Sistema de Saúde tem acesso igualitário aos serviços do setor privado.
57. A Política Nacional de Promoção da Saúde descreve ações para a redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, e tem por finalidade:
- A) investir em ações que denigram a participação e acesso de crianças e adolescentes quanto ao uso abusivo de álcool e suas conseqüências.
 - B) desenvolver iniciativas de redução de danos pelo consumo de álcool e outras drogas que envolvam parcerias com as indústrias fabricantes de bebidas alcoólicas.
 - C) liberar o acesso de bebidas alcoólicas de acordo com o perfil epidemiológico de dado território, protegendo apenas segmentos vulneráveis e priorizando situações de violência e danos sociais.
 - D) investir no aumento de informações veiculadas pela mídia quanto aos riscos e danos.
 - E) divulgar a taxa de mortalidade por acidentes em decorrência do uso abusivo do álcool.
58. De acordo com o calendário básico de vacinação da criança, nas primeiras doze horas de vida do recém-nascido, ainda na maternidade, devem ser administradas as vacinas:
- A) contra hepatite B e contra a poliomielite.
 - B) contra hepatite B e a BCG.
 - C) BCG e contra a poliomielite.
 - D) BCG e contra rotavírus humano.
 - E) tetravalente e rotavírus humano.
59. A prevenção primária de doenças e complicações cardiovasculares é tarefa da equipe do Programa Saúde da Família (PSF), na qual se deve enfatizar:
- A) o controle da atividade física e o estímulo à alimentação sem restrição.
 - B) o controle do tabagismo e da obesidade.
 - C) o sedentarismo e o consumo de sal.
 - D) o controle do alcoolismo e atividade física intensa.
 - E) atividade física diária e dieta hipercalórica.
60. A pressão arterial (PA) constitui um importante indicador de saúde cardiovascular. O conhecimento da enfermeira sobre essas variáveis hemodinâmicas auxilia na avaliação das alterações da pressão arterial. Portanto, são corretos os procedimentos de aferição da pressão arterial abaixo relacionados, **exceto**:
- A) Deixar o paciente descansar por meia hora em ambiente calmo e temperatura agradável.
 - B) Localizar a artéria braquial por palpação.
 - C) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não fez esforço físico, não ingeriu bebidas alcoólicas ou café até 30 minutos antes da medida.
 - D) Manter o braço estendido na altura do coração durante a medição.
 - E) Deixar o paciente descansar de 5 a 10 minutos em ambiente calmo e com temperatura agradável.