



3 DE FEVEREIRO DE 1874



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DA CAPITAL

CONCURSO PÚBLICO

001. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO JUDICIÁRIO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 100 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Saúde não é brinquedo político, diz diretor da OMS

“A saúde não é um brinquedo político, ela deve ser usada para promover o bem-estar e a qualidade de vida. E isso só vai acontecer quando nos comprometermos a fazer da atenção primária à saúde a base da assistência universal.”

A afirmação é do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante a assinatura nesta quinta (25/10/2018) de um acordo internacional em Astana, capital do Cazaquistão, em que 194 países membros da OMS, incluindo o Brasil, comprometeram-se a fortalecer a atenção primária.

Chamado de “Declaração de Astana”, o acordo também comemora o 40º aniversário da histórica Declaração de Alma Alta, que exortou o mundo a fazer dos cuidados primários de saúde o pilar da cobertura universal de saúde em 1978.

Ocorre que, embora nos últimos 40 anos a expectativa de vida tenha aumentado e a mortalidade infantil, caído pela metade, por exemplo, o progresso em saúde tem sido desigual e injusto entre países e dentro dos países.

“Devemos reconhecer que não alcançamos esse objetivo [saúde para todos]. Em vez de saúde para todos, conseguimos saúde para alguns. Temos ficado muito focados em combater doenças específicas, muito focados no tratamento, em detrimento da prevenção de doenças”, disse Ghebreyesus.

Quase metade da população mundial não tem acesso a serviços essenciais de saúde e, segundo a OMS, 100 milhões de pessoas são empurradas para a pobreza a cada ano por causa de gastos catastróficos em saúde. A atenção primária à saúde pode fornecer de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa durante sua vida.

A Declaração de Astana aponta a necessidade de uma ação multissetorial que inclua tecnologia, conhecimento científico e tradicional, juntamente com profissionais de saúde bem treinados e remunerados, e participação das pessoas e da comunidade para que seja alcançada a tão sonhada saúde para todos com qualidade.

(Cláudia Collucci, Saúde não é brinquedo político, diz diretor da OMS. Em: *Folha de S.Paulo*, 25.10.2018. Adaptado)

01. As informações do texto mostram que a atenção primária à saúde

- (A) vive ainda enfrentamentos para se estabelecer plenamente, uma vez que se identificam desigualdades entre os países e, até mesmo, dentro deles.
- (B) obteve êxito em seu propósito a partir da Declaração de Alma Alta, razão pela qual os 40 anos subsequentes a ela foram de saúde para todos os cidadãos.
- (C) tende a ser brevemente atingida, uma vez que a Declaração de Astana ratifica os cuidados primários como pilar da cobertura universal de saúde.
- (D) passou por um período de estabilização, mas vem sendo questionada recentemente com o recrudescimento de uma série de doenças específicas.
- (E) deixou de ser atendida porque a Organização Mundial da Saúde parou de perseguir os preceitos defendidos pelas Declarações de Alma Alta e Astana.

02. De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, a universalização da saúde

- (A) ganha destaque nas políticas, garantindo a atenção à prevenção de doenças e o acesso a serviços essenciais de saúde.
- (B) pode ser conseguida de forma bem simples, priorizando-se métodos tradicionais e profissionais com formação mais humanizada.
- (C) está prejudicada pela baixa atenção à prevenção de doenças, o que ainda pode piorar caso se use politicamente a saúde.
- (D) caminha para atingir um número maior de pessoas, já que se tem abandonado o combate a doenças específicas.
- (E) exige políticas mais voltadas à tecnologia, o que demandará menos profissionais em um trabalho mais eficiente para a população.

03. Na passagem do 3º parágrafo “... que **exortou** o mundo a fazer dos cuidados primários de saúde o **pilar** da cobertura universal de saúde em 1978.”, os termos destacados significam, correta e respectivamente,

- (A) obrigou e desejo.
- (B) amainou e suporte.
- (C) dissuadiu e modelo.
- (D) orientou e incremento.
- (E) estimulou e arrimo.

04. Considere os enunciados, reescritos a partir das informações textuais:

- A Declaração de Alma Alta e a Declaração de Astana _____ preocupação em fortalecer a atenção primária à saúde.
- As ações em saúde _____ ficado muito _____ em combater doenças específicas, em detrimento da prevenção de doenças.
- De acordo com a Declaração de Astana, _____ uma ação multissetorial que inclua tecnologia, conhecimento científico e tradicional.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas dos enunciados devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) revela ... têm ... focadas ... é necessária
- (B) revelam ... tem ... focados ... é necessário
- (C) revelam ... têm ... focadas ... é necessária
- (D) revela ... tem ... focado ... é necessário
- (E) revelam ... têm ... focado ... é necessário

05. Assinale a alternativa que traz, respectivamente, um substantivo cujo plural se faz a exemplo de “bem-estar” (termo presente no 1º primeiro parágrafo); e outro substantivo, destacado em expressão do texto, com sentido de coletivo.

- (A) Alto-falante / “Quase metade da **população** mundial não tem acesso...” (6º parágrafo)
- (B) Saca-rolha / “... a base da **assistência** universal.” (1º parágrafo)
- (C) Bomba-relógio / “... o **progresso** em saúde tem sido desigual...” (4º parágrafo)
- (D) Louva-a-deus / “... em detrimento da **prevenção** de doenças...” (5º parágrafo)
- (E) Arco-íris / “... e participação das pessoas e da **comunidade**...” (7º parágrafo)

06. Nos trechos “E **isso** só vai acontecer quando...” (1º parágrafo) e “... **que** exortou o mundo a fazer dos cuidados primários de saúde...” (3º parágrafo), os pronomes **isso** e **que** retomam, correta e respectivamente, as seguintes ideias:

- (A) não usar a saúde como brinquedo político; Organização Mundial da Saúde.
- (B) usar a saúde para promover o bem-estar e a qualidade de vida; Declaração de Astana.
- (C) deixar de atentar para a saúde; Declaração de Astana.
- (D) usar a política para promover a saúde; o 40º aniversário da Declaração de Alma Alta.
- (E) usar a saúde para promover o bem-estar e a qualidade de vida; Declaração de Alma Alta.

07. Assinale a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Embora as nações aspirem cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer de que ela ainda não chegou em todos os habitantes do planeta.
- (B) Embora as nações aspirem na cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer de que ela ainda não chegou a todos os habitantes do planeta.
- (C) Embora as nações aspirem pela cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer que ela ainda não chegou em todos os habitantes do planeta.
- (D) Embora as nações aspirem à cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer que ela ainda não chegou a todos os habitantes do planeta.
- (E) Embora as nações aspirem por cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer que ela ainda não chegou com todos os habitantes do planeta.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

Um estudo realizado por pesquisadores do Porto concluiu que a intervenção de enfermeiros especialistas em saúde mental, aliada _____ medicação, é significativamente mais eficaz _____ reduzir os níveis de ansiedade quando comparada com o tratamento apenas com medicamentos.

A pesquisa, _____ que o jornal teve acesso, foi realizada por um grupo de pesquisadores do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Escola Superior de Enfermagem do Porto e publicada no *Journal of Advanced Nursing*.

Os resultados indicam um “efeito positivo da intervenção psicoterapêutica da enfermagem”, realizada por um enfermeiro especialista em saúde mental, registrando-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade e um aumento do autocontrole da ansiedade no final das cinco sessões (45 a 60 minutos/semana) realizadas em cinco semanas consecutivas.

(Expresso. <https://expresso.sapo.pt>. Adaptado)

08. De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) a ... a ... de
- (B) a ... em ... em
- (C) à ... para ... a
- (D) à ... à ... à
- (E) à ... de ... à

09. A exemplo de “intervenção” – grafada com “ç” – e de “autocontrole” – grafado sem hífen –, estão correta e respectivamente grafados, em conformidade com a ortografia oficial, os termos:

- (A) pretenção e autohemoterapia.
- (B) intenção e autoobservação.
- (C) compreensão e autoterapia.
- (D) propenção e autofecundação.
- (E) isenção e autodefesa.

10. Observe as passagens do texto:

- **Um estudo realizado por pesquisadores do Porto** concluiu que a intervenção de enfermeiros especialistas em saúde mental... (1º parágrafo)
- Os resultados indicam um “efeito positivo da intervenção psicoterapêutica da enfermagem”, realizada por um enfermeiro especialista em saúde mental, **registrando-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...** (3º parágrafo)

Transpondo-se as orações destacadas para a voz ativa, obtêm-se, correta e respectivamente, as seguintes reescritas:

- (A) Pesquisadores do Porto realizaram um estudo que... / ... e registram uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...
- (B) Pesquisadores do Porto tinham realizado um estudo que... / ... e tem sido registrado uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...
- (C) Um estudo, que foi realizado por pesquisadores do Porto que... / ... e registra uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...
- (D) Pelos pesquisadores do Porto realizaram um estudo que... / ... e tem sido registrada uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...
- (E) Realizou-se por pesquisadores do Porto um estudo que... / ... e registram-se uma clara diminuição dos níveis de ansiedade...

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 16.

Tempo incerto

Os homens têm complicado tanto o mecanismo da vida que já ninguém tem certeza de nada: para se fazer alguma coisa é preciso aliar a um impulso de aventura grandes sombras de dúvida. Não se acredita mais na existência de gente honesta; e os bons têm medo de exercitarem sua bondade, para não serem tratados de hipócritas ou de ingênuos.

Vivemos um momento em que a virtude é ridícula e os mais vis sentimentos se mascaram de grandiosidade, simpatia, benevolência. A observação do presente leva-nos até a descer dos exemplos do passado: os varões ilustres de outras eras terão sido realmente ilustres? Ou a História nos está contando as coisas ao contrário, pagando com dinheiros dos testemunhos a opinião dos escribas?

Se prestarmos atenção ao que nos dizem sobre as coisas que nós mesmos presenciamos – ou temos que aceitar a mentira como a arte mais desenvolvida do nosso tempo, ou desconfiamos do nosso próprio testemunho, e acabamos no hospício!

Pois assim, é, meus senhores! Prestai atenção às coisas que vos contam, em família, na rua, nos cafés, em várias letras de forma, e dissei-me se não estão incertos os tempos e se não devemos todos andar de pulga atrás da orelha!

Agora, pensam os patrões, os empregados, os amigos e inimigos de uns e de outros e todo o resto da massa humana. E não só pensam, como também pensam que pensam! E além de pensarem que pensam, pensam que têm razão! E cada um é o detentor exclusivo da razão!

Pois de tal abundância de razão é que se faz a loucura. E a vocação das pessoas, hoje em dia, não é para o diálogo com ou sem palavras, mas para balas de diversos calibres. Perto disso, a carestia da vida é um ramo de flores. O que anda mesmo caro é alma. E o Demônio passeia pelo mundo, glorioso e imune.

(Cecília Meireles, Tempo incerto. Em: *Escolha o seu Sonho*. Adaptado)

11. Em suas considerações, o narrador pondera que

- (A) a ideia geral é de que todos sabem opinar, discutindo e avaliando com acuidade a opinião alheia.
- (B) a acriticidade com que todos se comunicam tem oportunizado, sensatamente, a busca pela razão.
- (C) o modo como as pessoas se relacionam nos dias de hoje tem promovido o diálogo com civilidade.
- (D) o momento atual se marca por uma inversão de valores, o que gera confusão e incertezas.
- (E) a confusão do mundo atual tem sido deixada de lado, priorizando-se a humanização das pessoas.

12. Assinale a alternativa em que está transcrita do texto uma expressão em sentido figurado, acompanhada da correta indicação do seu sentido.

- (A) “pensam os patrões” (5º parágrafo) → ideia de raciocinar com profundidade.
- (B) “a arte mais desenvolvida do nosso tempo” (3º parágrafo) → ideia de verdade.
- (C) “os mais vis sentimentos” (2º parágrafo) → ideia de enobrecimento.
- (D) “andar de pulga atrás da orelha” (4º parágrafo) → ideia de desconfiança.
- (E) “o mecanismo da vida” (1º parágrafo) → ideia de trabalho.

13. Assinale a alternativa em que informações do 4º parágrafo estão corretamente reescritas em conformidade com o sentido do texto e com a pontuação, segundo a norma-padrão.

- (A) Meus senhores prestem atenção às coisas que lhes contam, e digam-me se não estão incertos os tempos.
- (B) Prestem atenção, meus senhores, às coisas que lhes contam e digam-me se não estão incertos os tempos.
- (C) Prestem atenção às coisas que lhes contam e digam-me se não estão incertos meus senhores, os tempos?
- (D) Meus senhores, prestem atenção às coisas que lhes contam! E digam: se não estão, incertos os tempos!
- (E) Prestem atenção às coisas que lhes contam meus senhores – e digam se não estão incertos os tempos?

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14. Assinale a alternativa em que os termos estão acentuados, correta e respectivamente, a exemplo das palavras do texto: dúvida, abundância e também.
- (A) exíguo; hemácia; outrém.
 - (B) trôpego; anúncia; provém.
 - (C) rúbrica; latência; pajém.
 - (D) álibi; essência; aquém.
 - (E) récorde; incôncio; amém.
15. Assinale a alternativa cuja frase atende à norma-padrão de colocação pronominal.
- (A) Vivemos um momento em que os mais vis sentimentos têm mascarado-se de grandiosidade.
 - (B) Nos acostumamos ao medo de exercitar a bondade, pois não se acredita mais na existência de gente honesta.
 - (C) As pessoas certamente comunicam-se entre si não mais por meio do diálogo, com ou sem palavras.
 - (D) Ofenderíamos-nos porque questionam se os varões ilustres de outras eras teriam sido mesmo ilustres?
 - (E) O que agora se vê é uma situação na qual o que se mostra mesmo caro é a alma, já que não se dialoga mais.
16. Assinale a alternativa cujo enunciado atende aos sentidos do texto, em conformidade com a norma-padrão.
- (A) Parece que a abundância da razão mostra a insipiência do momento atual que vivemos, já que as pessoas se relacionam sem pensar em minorar a escassez de sentimentos.
 - (B) Se vemos com mais atenção aquilo que nos dizem sobre as coisas que nós mesmos presenciemos, teremos de aceitar a mentira, afim de não acabarmos no hospício.
 - (C) A observação do presente leva-nos a perceber de que a ideia que se tem hoje dos varões ilustres de outras eras vai ao encontro àquilo que eles representaram para nós.
 - (D) Assim como acontece com muitas pessoas, é difícil para mim exercitar a bondade, porque hoje as pessoas veem ela como um traço ridículo da personalidade humana.
 - (E) É fragrante no mundo de hoje um movimento que tenta colocar violência aonde deveriam haver diálogos entre as pessoas, o que mostra que a vocação dessas mudou.
17. Ao assumir o cargo, o enfermeiro constatou que, recentemente, havia sido implantado o prontuário eletrônico no ambulatório onde desenvolveria suas funções. Frente a essa situação, de acordo com a nova redação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 2017), o enfermeiro deve
- (A) digitar seu nome completo e número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, após a descrição do cuidado prestado.
 - (B) solicitar a certificação de sua assinatura, conforme legislação vigente, para que possa utilizá-la no prontuário eletrônico ao registrar a assistência prestada.
 - (C) copiar e colar a imagem digitalizada de sua assinatura ou rubrica ao final da descrição do cuidado de enfermagem prestado.
 - (D) digitar seu nome completo ou social, categoria e número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem do estado onde atua, após a descrição do cuidado de enfermagem prestado.
 - (E) copiar e colar a imagem digitalizada de seu carimbo onde deve constar seu nome social, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem do estado onde concluiu o curso.
18. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, que deve ser organizado de acordo com diretrizes, entre elas,
- (A) a centralização, com protagonismo do município, por meio das unidades básicas de saúde (UBS).
 - (B) a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 - (C) a centralização, com protagonismo da esfera federal representada pelo Ministério da Saúde.
 - (D) o atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços de atenção primária à saúde.
 - (E) a implantação do programa de Saúde da Família como estratégia para a efetivação da atenção básica à saúde.

Para responder à questão de número 19, leia atentamente o texto a seguir.

DIU no SUS: 5 passos para conseguir colocar o dispositivo de graça

Por Carolina Dantas, G1
26.10.2018

O dispositivo intrauterino (DIU) é um dos métodos disponíveis de graça no Brasil, com eficácia superior a 99%. No Sistema Único de Saúde (SUS), os médicos implementam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em hospitais públicos, sem nenhum tipo de custo.

O DIU de cobre é um método contraceptivo não-hormonal. Ele é disponibilizado em Unidades Básicas de Saúde e hospitais com atendimento ginecológico. Pode ser colocado desde a adolescência até a menopausa. É importante pesquisar na internet a UBS mais próxima da sua casa e ligar para descobrir se o procedimento está disponível.

Após encontrar a unidade mais próxima que coloca o dispositivo, a paciente precisa ir até o local. Os médicos recomendam a participação em um grupo de planejamento familiar. Ele não é obrigatório, mas é importante para conhecer todos os métodos anticoncepcionais disponíveis e entender se o perfil condiz com o DIU, por exemplo.

“A gente imagina que conhece os métodos, mas a gente não conhece. Existem muitos mitos, fantasias relacionadas a vários métodos anticoncepcionais. Então é importante a paciente ouvir e poder avaliar qual é a melhor opção para o momento de vida dela”, disse a ginecologista Cristina Guazzeli.

Se a pessoa passou pelo grupo, será encaminhada para uma consulta com o médico ginecologista disponível no local. Se não teve interesse em participar, a marcação poderá ocorrer pessoalmente na UBS ou hospital.

(<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018/10/26/diu-no-sus-5-passos-para-conseguir-colocar-o-dispositivo-de-graca.ghtml>. Acesso em 17.11.2018. Adaptado)

19. De acordo com o estabelecido pela Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, o relato apresenta uma situação em que, está sendo atendida, entre outros princípios, a diretriz do SUS de

- (A) participação esclarecida.
- (B) livre escolha.
- (C) individualidade.
- (D) universalidade.
- (E) beneficência.

20. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio da atuação de representantes dos usuários

- (A) na administração do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
- (B) no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (C) no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
- (D) na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
- (E) no Conselho de Saúde.

21. Durante a campanha do “Outubro Rosa”, a equipe de saúde organizou uma série de atividades com foco na conscientização dos funcionários a respeito do câncer de mama, cabendo ao enfermeiro a discussão a respeito de medidas de prevenção primária e de promoção da saúde relacionadas ao tema, tais como a

- (A) prática regular de atividade física e alimentação saudável.
- (B) prática regular de atividade física e do autoexame das mamas, para todas as mulheres.
- (C) importância do exame clínico das mamas, realizado pelo médico ou enfermeiro, uma vez ao ano, para mulheres a partir dos 50 anos de idade.
- (D) realização do autoexame das mamas, uma vez por mês, para todas as mulheres a partir dos 20 anos de idade.
- (E) realização do aconselhamento genético e exame de mamografia anual, para mulheres a partir dos 35 anos de idade com história de câncer de mama na família.

22. M.A., 32 anos, sexo masculino, auxiliar administrativo, compareceu ao ambulatório da empresa com queixa de tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Relatou que ao se levantar pela manhã, percebeu a presença de “manchas vermelhas” que começaram por traz da orelha e “foram se espalhando”. Durante a anamnese, informou ter retornado de viagem por motivo de trabalho de Roraima há cinco dias, onde está ocorrendo um surto de sarampo, e desconhecer seu histórico vacinal. Ao exame físico constatou-se temperatura axilar = 38,8 °C e presença de exantema cutâneo máculo-papular de coloração vermelha, na região retroauricular, pescoço e tórax. Suspeitando tratar-se de um caso de sarampo, o médico solicitou os exames complementares necessários e afastou M.A. do trabalho, encaminhando o caso ao enfermeiro para as demais providências necessárias.

Frente a essa situação, entre outras ações, o enfermeiro deve

- (A) providenciar, imediatamente, a aplicação de uma dose de reforço com a vacina pentavalente em todos os funcionários que trabalham no mesmo setor que M.A., com o objetivo de evitar a ocorrência de novos casos da doença.
- (B) administrar, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo, 2 g de vitamina C, via oral, para reduzir a possibilidade de ocorrência de caso grave ou fatal.
- (C) comunicar o caso suspeito de sarampo, por telefone, à Secretaria Municipal de Saúde, dentro das primeiras 24 horas após o atendimento de M.A., e providenciar o preenchimento da Ficha de Investigação de Doenças Exantemáticas Febris Sarampo/Rubéola.
- (D) providenciar a aplicação da vacina tríplice bacteriana para todos os funcionários que trabalham na empresa, em até três dias, com o propósito de evitar a disseminação da doença.
- (E) aguardar o resultado dos exames complementares e, se confirmado tratar-se de um caso de sarampo, preencher a Ficha de Notificação Compulsória de Sarampo, encaminhando-a à unidade básica de saúde responsável pela área onde a empresa está localizada, para as demais providências cabíveis.

23. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de tuberculose pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Por meio da busca ativa de sintomas respiratórios (SR), esforços devem ser realizados no sentido de encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a cadeia de transmissão da doença e reduzindo a incidência da doença a longo prazo. (Ministério da Saúde).

Para tal, considera-se como sintomático respiratório o indivíduo com tosse por tempo igual ou superior a

- (A) sete dias, com presença de expectoração.
- (B) três semanas.
- (C) cinco dias, com histórico de febre superior a 38 °C.
- (D) dez dias, na presença de expectoração de cor esverdeada.
- (E) três dias, com histórico de hipertermia igual ou maior que 39 °C.

24. Considere as Teorias de Enfermagem e relacione as duas colunas do quadro a seguir, de modo a tornar verdadeira a associação entre o teórico de enfermagem e o tema central da teoria que desenvolveu.

Teórico de Enfermagem		Tema central	
a.	Florence Nightingale	I	Atendimento às necessidades pessoais do paciente no ambiente.
b.	Martha Rogers	II	Ênfase na ciência e na arte da enfermagem, com a pessoa sendo o elemento central da disciplina de enfermagem.
c.	Dorotea Orem	III	O autocuidado é uma necessidade humana, e déficits de autocuidado requerem ações de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) a-III; b-I; c-II.
- (B) a-I; b-II; c-III.
- (C) a-III, b-II; c-I.
- (D) a-II; b-III; c-I.
- (E) a-I; b-III; c-II.

25. Implementada a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), ao estabelecer os resultados esperados, o enfermeiro está executando a etapa do Processo de Enfermagem de

- (A) diagnóstico de enfermagem.
- (B) implementação da assistência de enfermagem.
- (C) avaliação.
- (D) investigação.
- (E) planejamento.

Para responder à questão de número **26**, considere o relato a seguir.

F.A., 34 anos, sexo feminino, compareceu ao ambulatório de saúde ocupacional para realizar o exame médico de retorno à função devido ao término da licença maternidade, sendo considerada apta pelo médico. Durante a consulta de enfermagem, informou ao enfermeiro que, até o momento de reassumir seu trabalho, vinha praticando o aleitamento materno exclusivo, mostrando-se muito preocupada pelo fato de que o bebê, com quatro meses de idade, passaria a ficar em uma creche e a receber fórmula láctea, prescrita pelo pediatra, enquanto estivesse no trabalho. Para essa situação, utilizando a taxonomia NANDA 2015-2017, o enfermeiro estabeleceu como diagnóstico de enfermagem “Amamentação interrompida relacionada ao emprego materno e separação mãe-lactente caracterizada por amamentação não exclusiva”.

26. O diagnóstico de enfermagem assinalado tem como característica definidora

- (A) amamentação interrompida.
- (B) emprego materno.
- (C) uso de fórmula láctea.
- (D) amamentação não exclusiva.
- (E) separação mãe-lactente.

27. Em relação à Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) Versão 1.0, é correto afirmar que

- (A) se destina, exclusivamente, à elaboração de diagnósticos de enfermagem para uso no âmbito da saúde coletiva.
- (B) consiste em uma classificação multiaxial constituída por sete eixos, a saber: foco, juízo/julgamento, meios/recursos, ação, tempo, localização e cliente/paciente.
- (C) para criar enunciados de diagnósticos de enfermagem e resultados de enfermagem, devem ser incluídos, obrigatoriamente, um termo do eixo foco e um termo do eixo ação, complementados, se necessário, por termos de outros eixos.
- (D) sua utilização só é válida se realizada de modo combinado com a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC).
- (E) o eixo foco compreende o sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário de uma intervenção de enfermagem.

28. A coordenação de saúde decidiu utilizar o método “planejamento estratégico situacional” como instrumento para o planejamento e gestão dos ambulatórios de saúde. Atualmente, os participantes estão trabalhando na implementação das ações propostas para a resolução dos problemas prioritizados, incluindo o cronograma e os recursos necessários, entre outros itens. Considerando as etapas que compõem o método, o grupo está vivenciando o momento

- (A) tático-operacional.
- (B) explicativo.
- (C) normativo.
- (D) cooperativo.
- (E) estratégico.

29. Ao utilizar o método de dimensionamento de pessoal para unidades assistenciais especiais (UAE), o responsável técnico de enfermagem deve dispor para a cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação em programas de educação permanente, o mínimo de

- (A) 2% do quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição.
- (B) 5% do total de pessoal de nível técnico e 2% do total de enfermeiros.
- (C) 5% do quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição.
- (D) 10% do quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição.
- (E) 15% do total de pessoal de nível técnico e 10% do total de enfermeiros.

30. F.N., enfermeiro, foi designado pela chefia de enfermagem para compor a comissão de gerenciamento de recursos materiais da instituição. Finalizada a etapa de classificação dos materiais, passou a trabalhar na padronização de materiais utilizados pela enfermagem. Essa etapa do trabalho consiste na

- (A) determinação do produto específico para procedimentos específicos, com o propósito de diminuir a diversidade desnecessária de alguns itens e normatizar o uso de produtos similares.
- (B) determinação da quantidade mínima de cada item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento, caso ocorra atraso no suprimento.
- (C) descrição minuciosa do material, de modo a representar com precisão o que é necessário se adquirir.
- (D) estimativa das quantidades de material a serem compradas para atender às necessidades das unidades de enfermagem que utilizam esses insumos, num período pré-determinado.
- (E) descrição das indicações de uso, desempenho técnico e matéria-prima utilizada para fabricação, dimensões e tamanhos dos materiais de uso pela enfermagem.

Para responder a questão de número 31, considere o relato a seguir.

A equipe de enfermagem do setor de ambulatórios, composta por dez funcionários, procurou o enfermeiro para conversar a respeito da escala de folgas para o mês de novembro, pois, devido à existência de dois feriados no período, um em uma quinta-feira e o outro em uma sexta-feira, havia a possibilidade de emenda totalizando, em um dos casos, um total de quatro dias. Tal situação estava gerando conflito, porque, não havendo mais possibilidade de emenda para o ano, a totalidade dos funcionários desejava ter a oportunidade de descansar por um período mais longo. Face à dificuldade para resolver a questão, o enfermeiro decidiu que os cinco funcionários mais jovens não poderiam folgar na emenda do feriado, para cobrir o serviço.

31. Face à situação apresentada, é correto afirmar que, para administrar o conflito, o enfermeiro adotou a estratégia de

- (A) solução integrativa de problemas.
- (B) acomodação.
- (C) dominação.
- (D) barganha.
- (E) não compromisso.

32. Em atenção ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, a equipe de saúde de uma instituição decidiu elaborar material educativo, para distribuição entre funcionários e clientes, sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado da doença, esclarecendo, entre outros itens, que

- (A) se trata de uma doença que acomete apenas adultos, de ambos os sexos, a partir dos 40 anos de idade.
- (B) todo indivíduo adulto, caracterizado como contato social, ou seja, que conviva ou tenha convivido com um indivíduo com diagnóstico de hanseníase, tratado ou não, incluindo-se vizinhos, colegas de trabalho e de escola, entre outros, devem receber a vacina BCG e ser acompanhado, por pelo menos cinco anos.
- (C) a hanseníase é uma doença aguda, infectocontagiosa, cujo agente etiológico, o *Mycobacterium leprae*, é transmitido por via fecal-oral.
- (D) cerca de 90 dias após o início do tratamento, se realizado de forma regular, a doença deixa de ser contagiosa.
- (E) os sinais e sintomas da hanseníase compreendem, entre outros itens, pápulas, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas, e diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas (madarose).

33. Face a uma realidade global de índices elevados de infecções transmissíveis por via sexual (IST), torna-se fundamental que os profissionais de saúde aproveitem todas as oportunidades para orientar sobre a importância de se pensar em opção contraceptiva que proporcione uma dupla proteção exemplificada pelo uso combinado
- (A) da camisinha feminina e do anticoncepcional oral.
 - (B) do diafragma e do dispositivo intrauterino.
 - (C) do anticoncepcional injetável e do diafragma.
 - (D) do gel espermicida e do anticoncepcional oral.
 - (E) da camisinha masculina e da camisinha feminina.

34. Com a proximidade do verão, quando ocorrem, com maior frequência, as chuvas e o aumento do número de casos de dengue, zika e febre Chikungunya, decidiu-se elaborar matéria a respeito do assunto para publicação no boletim mensal de saúde da instituição, esclarecendo, entre outros aspectos, sobre as medidas de proteção individual que devem ser adotadas, tais como
- (A) evitar coçar o local da picada do inseto, reduzindo a possibilidade de introdução dos vírus na corrente sanguínea.
 - (B) lavar uma vez por semana as bandejas coletoras de água de geladeiras e aparelhos de ar condicionado.
 - (C) lavar, diariamente, com água e detergente, vasilhas de água para animais.
 - (D) usar repelentes compostos por DEET, IR3535 ou Icaridin, estritamente de acordo com as instruções do rótulo, que podem ser aplicados na pele exposta ou nas roupas.
 - (E) usar roupas que minimizem a exposição da pele durante a noite, quando os mosquitos são mais ativos.

35. Em 31.01.2019, M.T., 30 anos, compareceu ao ambulatório de saúde ocupacional a fim de realizar o exame admissional para ocupar o cargo de assistente judiciário. Ao solicitar a carteira de vacinação, o enfermeiro observou os seguintes registros:

Dupla adulto 10.01.2014	Hepatite B 20.10.2016	Febre amarela 17.07.2018
Dupla adulto 20.10.2016	Hepatite B 17.07.2018	Tríplice viral 17.07.2018
Dupla adulto 17.07.2018		

Diante dessa situação, de acordo com o calendário nacional de vacinação vigente, o enfermeiro deve

- (A) aplicar a terceira dose da vacina hepatite B, uma dose de reforço da vacina dupla adulto e a segunda dose da vacina tríplice viral.
- (B) aplicar a terceira dose da vacina hepatite B.
- (C) aplicar a terceira dose da vacina hepatite B, a segunda dose da vacina febre amarela e a vacina HPV, em dose única.
- (D) reiniciar o esquema da vacinas dupla adulto e hepatite B, considerando inválidas as doses aplicadas devido ao espaçamento entre elas.
- (E) considerar que, para o momento, o esquema vacinal de M.T. está completo e correto.

36. Conforme planejamento anual, na primeira semana de abril, será disponibilizada a vacina contra gripe para todos os funcionários. Para garantir sua qualidade, esse imunobiológico deverá ser mantido, em nível local, na temperatura de
- (A) -2°C a $+2^{\circ}\text{C}$.
 - (B) $+2^{\circ}\text{C}$ a $+10^{\circ}\text{C}$.
 - (C) -8°C a -2°C .
 - (D) $+5^{\circ}\text{C}$ a $+10^{\circ}\text{C}$.
 - (E) $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$.

37. Com o objetivo de identificar e orientar os funcionários sobre o glaucoma, uma instituição promove, anualmente, a “Campanha de prevenção do glaucoma”. Ao que diz respeito a essa doença, com o propósito de esclarecer e orientar adequadamente os interessados, os enfermeiros que atuam na instituição devem saber que
- (A) o glaucoma pode se desenvolver em um ou em ambos os olhos e é resultante da opacificação do cristalino.
 - (B) o manejo cirúrgico do glaucoma cura a doença em 95% dos casos.
 - (C) a história familiar de glaucoma, o uso prolongado de corticosteroides tópicos ou sistêmicos, a diabetes e o traumatismo ocular constituem-se em alguns dos fatores de risco para o glaucoma.
 - (D) os sinais e sintomas do glaucoma, tais como: diplopia, ausência de lágrimas e dor orbital surgem precocemente, propiciando o rápido início do tratamento para a doença.
 - (E) devido a sua ação antioxidante, a ingestão diária de 200 000 UI de vitamina A constitui importante medida de prevenção para a ocorrência do glaucoma.

Para responder à questão de número 38, considere o relato a seguir.

Durante consulta de enfermagem, A.T., 46 anos, sexo feminino, escrevente técnico judiciário, contou ao enfermeiro que “vinha se sentindo esquisita”. Informou perceber que apresentava nervosismo e irritabilidade, sem motivo aparente; cansaço, intolerância ao calor, sudorese incomum, episódios de palpitações em repouso, perda de peso e que, recentemente, passou a observar que seus olhos pareciam mais saltados. Além disso, disse que estava preocupada porque não menstruava há dois meses, mas os resultados de exames para diagnóstico de gravidez estavam todos negativos. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou, entre outros itens, temperatura axilar = $36,9^{\circ}\text{C}$; pulso = 98 batimentos por minuto; pressão arterial = 140 x 90 mmHg, IMC = $18,4\text{ Kg/m}^2$, pele facial ruborizada.

- 38.** Frente ao quadro apresentado, o enfermeiro deve encaminhar A.T. para avaliação médica, porque a funcionária apresenta sinais e sintomas característicos de
- (A) anemia falciforme.
 - (B) hipertireoidismo.
 - (C) endometriose.
 - (D) hipotireoidismo.
 - (E) síndrome de Cushing.
- 39.** Devido ao fato de que, na instituição onde atua, um percentual expressivo de funcionários se concentra na faixa etária de 50 a 59 anos, o enfermeiro desenvolve ações de educação em saúde sobre a osteoporose, orientando a respeito das medidas de prevenção que devem incluir, entre outros itens, a importância de
- (A) evitar o consumo de cafeína e a importância da exposição à luz solar, em horários recomendados e adequadamente protegidos.
 - (B) evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros e ingerir suplemento alimentar com alta concentração de vitamina A.
 - (C) evitar o consumo de vegetais com folhas de cor verde escuro e realizar exercícios físicos aeróbicos.
 - (D) ingerir dieta rica em proteína animal, cálcio e vitamina D e evitar a exposição à luz solar.
 - (E) evitar a automedicação e ingerir, diariamente, suplemento alimentar com alta concentração de vitamina A.
- 40.** No ambulatório, o enfermeiro foi procurado por um funcionário interessado em participar do programa de combate ao tabagismo existente na empresa. Durante a consulta de enfermagem, deixou claro para o enfermeiro que estava “se organizando” para abandonar o cigarro e desejava parar de fumar a partir do dia de seu aniversário de 40 anos, que ocorreria em duas semanas.
- Considerando que a identificação do estágio motivacional em que o indivíduo se encontra é de extrema importância à elaboração de estratégias para intervenções, ao utilizar o Modelo de Avaliação do Grau de Motivação para a Mudança, desenvolvido por Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), o enfermeiro deve reconhecer que o funcionário se encontra na fase de
- (A) motivação.
 - (B) ação.
 - (C) pré-contemplação.
 - (D) contemplação.
 - (E) preparação.
- 41.** Devido aos sintomas físicos e emocionais apresentados após ter sido vítima de estupro, P.C., 34 anos, sexo feminino, recebeu o diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático e foi afastada, temporariamente, do trabalho. Ao retornar da licença, compareceu à consulta de enfermagem para acompanhamento de sua saúde. Após realizar a coleta de dados, utilizando a classificação NANDA 2015-2017, o enfermeiro estabeleceu como um dos diagnósticos de enfermagem “síndrome pós-traumática relacionada a evento desconfortável, considerado fora da gama de experiências habituais, evidenciado por flashbacks e pesadelos”. Para esse diagnóstico, a intervenção de enfermagem adequada é
- (A) discutir com a paciente os estressores identificados e a conexão de cada um deles com a ansiedade quando o nível dela estiver elevado.
 - (B) dar reforço positivo a comportamentos ritualísticos, ajudando a paciente a aprender maneiras de interromper os pensamentos obsessivos.
 - (C) desestimular a tomada de decisão quando evidenciado um baixo nível de ansiedade por parte da paciente.
 - (D) apoiar a paciente e tranquilizá-la quanto ao fato de esses sintomas serem comuns após um trauma da magnitude que vivenciou.
 - (E) frequentar atividades de grupo com a paciente se isso for assustador para ela.
- 42.** Frente a um indivíduo em uso de antidepressivo à base de fluoxetina, o enfermeiro deve alertar o usuário e, quando possível, seus familiares sobre os potenciais efeitos colaterais do medicamento que incluem
- (A) obstipação intestinal, retenção urinária, boca seca e rigidez muscular.
 - (B) inibição do apetite, perda de peso, sonolência e disfunção sexual.
 - (C) hipertermia maligna, parkinsonismo, delírios e fobia.
 - (D) ganho de peso, soluços, diarreia e disfunção sexual.
 - (E) salivação excessiva, poliúria, hipertensão e polidipsia.

43. Os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico de Kegel constituem-se em uma das medidas não farmacológicas que contribuem para o melhor controle da incontinência urinária que acomete cerca de 30% das pessoas idosas não institucionalizadas, sendo que, entre as mulheres, encontram-se as maiores prevalências. Ao orientar sobre como realizar esses exercícios, o enfermeiro deve explicar que

- (A) a pessoa deve contrair os músculos das nádegas ou os músculos abdominais ao mesmo tempo que os músculos do assoalho pélvico.
- (B) para obtenção dos resultados esperados, só devem ser realizados com a pessoa na posição sentada.
- (C) sua realização na posição deitada produz resultado mais rápido do que quando executados na posição em pé.
- (D) consistem na introdução vaginal de cones com diferentes pesos, que devem ser retidos por um determinado tempo, utilizando-se para tal a contração da musculatura do assoalho pélvico.
- (E) para um treinamento eficaz, recomenda-se de 8 a 12 contrações lentas e próximas da força máxima de contração dos músculos pélvicos, por pelo menos 6 segundos, em três séries, 3 a 4 vezes por semana.

44. No processo de avaliação de idosos, o Index de Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a independência funcional no desempenho das atividades de vida diária. Esse instrumento avalia a independência no desempenho das seguintes funções:

- (A) controle dos esfíncteres, alimentação, locomoção, libido, comunicação e alimentação.
- (B) autocuidado, controle de esfíncteres, transferência, locomoção, comunicação e cognição social.
- (C) higiene pessoal, uso do vaso sanitário, vestir-se acima da cintura e alimentação.
- (D) controle financeiro, autocuidado, sexualidade, locomoção e comunicação.
- (E) banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação.

Para responder às questões números **45 a 48**, leia atentamente o relato a seguir.

M.T., 63 anos, sexo masculino, assistente jurídico, hipertenso, portador de diabetes tipo 2 há cinco anos, tabagista, compareceu ao ambulatório para consulta de enfermagem de acompanhamento. Informou que vinha fazendo uso regular da medicação para hipertensão e diabetes, seguindo corretamente as orientações sobre a alimentação e conseguindo fazer cerca de 20 minutos de caminhada, aos domingos. Queixou-se que, nas últimas semanas, apresentou episódios de tonturas ao se levantar bruscamente, que cessavam rapidamente. Ao exame físico, o enfermeiro obteve temperatura axilar = 36,7 °C, pulso = 72 batimentos por minuto, pressão arterial = 138 x 88 mm Hg, peso = 84 200 g, altura = 175 cm, circunferência abdominal = 93 cm. Ao analisar os resultados de exames recentes apresentados pelo funcionário, contactou glicemia de jejum = 105 mg/dL, hemoglobina glicada = 5,8%.

45. Ao aferir a pressão arterial de M.T., o enfermeiro deve, entre outros cuidados,

- (A) deixar M.T. em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo e medir sua pressão arterial na posição de pé, após 3 minutos.
- (B) certificar-se de que o paciente não fumou nos últimos 15 minutos.
- (C) determinar a pressão arterial diastólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff).
- (D) determinar a pressão arterial sistólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).
- (E) medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço em que foi obtida a menor pressão como referência.

46. O índice de massa corporal (IMC) de M.T. e sua interpretação (I) são, respectivamente,

- (A) IMC = 27,5; I = obesidade.
- (B) IMC = 27,5; I = normal.
- (C) IMC = 24,7; I = normal.
- (D) IMC = 27,5; I = sobrepeso.
- (E) IMC = 24,7; I = sobrepeso.

47. No que diz respeito à prática de atividade física, o enfermeiro deve explicar a M.T. que

- (A) o treinamento resistido dinâmico ou isotônico, que envolve a contração de segmentos corporais localizados com movimento articular, é o mais indicado para hipertensos devido ao seu elevado potencial para redução dos níveis pressóricos, se praticado regularmente.
- (B) se considerando os valores pressóricos obtidos na consulta, a atividade física, na forma como tem sido praticada, está sendo eficaz e deve ser continuada.
- (C) continue fazendo as caminhadas em intensidade leve, ou seja, mantendo sua frequência cardíaca e respiração constantes, de forma normal, sem se sentir cansado.
- (D) para se obter o efeito de redução da pressão arterial, M.T. necessita fazer, no mínimo, 30 min/dia de atividade física moderada, de forma contínua (1 x 30 min) ou acumulada (2 x 15 min ou 3 x 10 min), em 5 a 7 dias da semana.
- (E) o treinamento resistido estático ou isométrico, que envolve a contração de segmentos corporais localizados sem movimento articular, está contraindicado para hipertensos.


48. A análise dos resultados obtidos para a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada sugerem que

- (A) a diabetes não está controlada e M.T. deve ser encaminhado ao endocrinologista para avaliação e controle.
- (B) o tratamento medicamentoso está sendo efetivo e M.T., no que diz respeito à diabetes, vem fazendo uso regular da medicação e seguindo adequadamente as orientações sobre a dieta.
- (C) a dosagem da medicação hipoglicemiante é excessiva e deve ser ajustada de acordo com as necessidades de M.T.
- (D) embora a glicemia de jejum se apresente adequada, os valores obtidos para a hemoglobina glicada demonstram que M.T. vem ingerindo alimentos com alto valor glicêmico.
- (E) pode ter ocorrido erro laboratorial, pois os valores da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada não são compatíveis.

49. Recentemente C.V., 58 anos, sexo masculino, passou a utilizar a insulina como tratamento para diabetes tipo 2. Com dúvidas sobre o transporte e conservação da insulina, procurou o enfermeiro para orientações. Frente a essa situação, o enfermeiro deve esclarecer que, para que a potência e estabilidade da insulina sejam mantidas, deve

- (A) em deslocamentos, independentemente da forma e do tempo, transportar o medicamento na bagagem de mão, tomando precauções para que a insulina não entre em contato direto com gelo ou similar, quando utilizado.
- (B) para transporte, colocar a insulina sobre gelo comum, em saco plástico e acondicioná-la em embalagem térmica ou isopor até 30 minutos antes de seu uso.
- (C) quando se tratar do frasco lacrado, manter a insulina em sua embalagem original, no congelador doméstico, em temperatura de -4°C a 0°C , transferindo-a para a geladeira 24 horas antes de iniciar seu uso.
- (D) manter o medicamento em temperatura ambiente, desde a compra até o momento da aplicação.
- (E) em geladeira doméstica, conservar a insulina na primeira prateleira da porta da geladeira, até o momento de sua aplicação.

50. O exame periódico dos pés do indivíduo diabético propicia a identificação precoce e o tratamento oportuno das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de um número expressivo de complicações. Considere as figuras a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o local onde deve ser aplicado o monofilamento de 10 g de Semmes-Weinstem utilizado para a avaliação da sensibilidade tátil.



- (A) I.
- (B) IV.
- (C) II.
- (D) III.
- (E) V.

- 51.** Ao orientar um indivíduo com histórico de eliminação urinária de cálculos de oxalato, o enfermeiro deve enfatizar que para prevenir sua formação, torna-se importante
- (A) consumir uma dieta rica em proteínas.
 - (B) a ingestão de oito a dez copos de água por dia para manter a urina diluída.
 - (C) dar preferência à ingestão de chás para hidratação devido a seu efeito diurético.
 - (D) introduzir na dieta o consumo de alimentos como o espinafre, morango, amendoim e farelo de trigo, entre outros, porque eles facilitam a excreção de oxalatos na urina.
 - (E) evitar consumir alimentos ricos em cálcio, tais como leite e queijos brancos.
- 52.** Portadores de veias varicosas devem ser alertados sobre a importância em usar de modo correto as meias de compressão graduada prescritas pelo médico, porque, além do alívio que proporcionam, constituem uma das medidas de prevenção para
- (A) a doença oclusiva arterial periférica.
 - (B) o fenômeno de Raynaud.
 - (C) o aneurisma aórtico-abdominal.
 - (D) a arteriosclerose.
 - (E) o tromboembolismo venoso.
- 53.** Entre outras ações, durante a Semana de Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabete, o enfermeiro realiza a estratificação do risco cardiovascular, utilizando o escore de Framingham. Para tal, inicialmente, são coletadas informações sobre
- (A) idade, sexo, peso, pressão arterial e HDL-Colesterol.
 - (B) índice de massa corporal (IMC), pressão arterial, tabagismo, LDL-Colesterol e HDL-Colesterol.
 - (C) idade, LDL-Colesterol, HDL-Colesterol, pressão arterial, diabete e tabagismo.
 - (D) pressão arterial, idade, glicemia, peso e circunferência abdominal.
 - (E) peso, estatura, glicemia, LDL-Colesterol e tabagismo.
- 54.** No ambulatório, M.J., 42 anos, sexo masculino, escrevente técnico judiciário, procurou o enfermeiro para esclarecer dúvidas a respeito da vasectomia, pois ele e a esposa desejavam adotar esse método anticoncepcional. Frente a essa situação, o enfermeiro deve esclarecer que
- (A) pode ser realizada em ambiente ambulatorial, com anestesia local, sem necessidade de internação e consiste na retirada da vesícula seminal.
 - (B) entre as complicações crônicas, destacam-se: a persistência de espermatozoides no ejaculado e a possibilidade de ocorrer impotência sexual nas primeiras quatro semanas após a cirurgia.
 - (C) em caso de arrependimento, a reversão da vasectomia é possível e o sucesso do procedimento está assegurado em 95% dos casos.
 - (D) é necessário o uso de condons ou outro método de planejamento familiar eficaz pelo menos nas primeiras 20 ejaculações ou por três meses após o procedimento.
 - (E) se trata de um procedimento cirúrgico simples, de pequeno porte, seguro e rápido, que consiste na ligadura dos ductos deferentes.
- 55.** Durante consulta de enfermagem, A.A., 59 anos, sexo feminino, divorciada, informou, entre outros itens, que entrara na menopausa há cinco anos e que, desde a separação de seu ex-marido, não mais havia mantido relações sexuais. Ao analisar resultados dos exames que constavam no prontuário, o enfermeiro constatou que os últimos exames citopatológicos para a prevenção do câncer de colo do útero haviam sido realizados, respectivamente, há dois anos e três anos e apresentavam resultados considerados normais. Nesse caso, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro deve
- (A) orientar A.A. que só deverá repetir o exame em um ano, pois os dois exames anteriores apresentavam resultado normal.
 - (B) aproveitar a oportunidade e proceder à coleta de material para a realização do exame preventivo do câncer de colo.
 - (C) solicitar o exame, orientando a funcionária que, para obtenção de uma amostra de material com boa qualidade, deve realizar ducha vaginal quatro horas antes do procedimento.
 - (D) explicar para A.A. que, por ter entrado na menopausa há mais de dois anos, não necessita mais realizar esse exame.
 - (E) explicar para a funcionária que mulheres com mais de 50 anos, sem vida sexual ativa, estão dispensadas de realizar esse exame.

- 56.** Ao analisar os resultados do exame de sorologia para hepatite B de um indivíduo considerado anteriormente como suscetível, que refere ter recebido a terceira dose da vacina hepatite B há seis meses, espera-se encontrar positivo(s) o(s) anticorpo(s)/antígeno(s)
- (A) apenas HBsAg.
 - (B) HBs-Ag, AntiHBc total e AntiHBc IGG.
 - (C) apenas anti-HBs (≥ 10 UI/mL).
 - (D) anti-HBe e HBsAg.
 - (E) HBs-Ag, AntiHBc total e AntiHBc IGM.

Para responder à questão de número **57**, considere o relato a seguir.

O enfermeiro observou que O.O., 32 anos, sexo feminino, casada, procurava o ambulatório com frequência, em busca de medicação para alívio de cólicas menstruais. Ao conversar com a funcionária, foi informado que, após a suspensão do uso de anticoncepcional oral, seus ciclos menstruais passaram a ter a duração de 25 dias e que suas menstruações, com duração de 6 a 8 dias, vinham acompanhadas por cólicas intensas, que algumas vezes a levavam a faltar ao serviço. Relatou ainda que sentia desconforto e, eventualmente, dores na região pélvica. O.O. mostrou-se preocupada, porque, apesar de ter suspenso o uso de anticoncepcionais há cerca de um ano, ainda não havia conseguido engravidar, mas não havia procurado o médico, pois achava isso natural.

57. Frente a essa situação, o enfermeiro deve

- (A) orientar e encaminhar O.O. ao médico ginecologista para avaliação e tratamento, uma vez que a funcionária apresenta sinais e sintomas sugestivos de um quadro de endometriose.
- (B) prescrever anti-inflamatórios para suprimir a dismenorrea e estimular a prática de atividade física para alívio dos sintomas.
- (C) explicar que a demora para engravidar é considerada normal, até dois anos após a suspensão do uso de anticoncepcionais orais, e que caso não ocorra a gravidez, O.O. deve procurar o ginecologista para avaliação e tratamento.
- (D) orientar a ingestão de alimentos ricos em vitaminas A, E e D para alívio dos sintomas apresentados e o uso de compressas quentes no abdome para alívio da dor pélvica, quando houver.
- (E) orientar O.O. sobre a importância e necessidade de avaliação médica e encaminhá-la ao ginecologista, pois apresenta sinais e sintomas compatíveis com um quadro de mioma uterino.

- 58.** De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, na Portaria nº 2.048/2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, entre outras ações, é atribuição do enfermeiro que atua nos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar Móvel,
- (A) receber os chamados de auxílio, analisar a demanda e classificar em prioridades os atendimentos.
 - (B) realizar o acompanhamento do atendimento local e determinar o local de destino do paciente.
 - (C) exercer, em conjunto com o médico, a regulação do sistema e realizar a seleção de meios para atendimento de urgência solicitado.
 - (D) manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema.
 - (E) realizar manobras de extração manual de vítimas.

59. A avaliação primária de um paciente que apresenta agravo clínico compreende os seguintes passos:

- I. Avaliar ventilação.
- II. Avaliar permeabilidade de via aérea (VA).
- III. Avaliar estado circulatório.
- IV. Avaliar a responsividade (chamar o paciente) e a expansão torácica.
- V. Avaliar estado neurológico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta a ser adotada.

- (A) III, II, IV, V, I.
- (B) V, IV, III, II, I.
- (C) IV, I, II, V, III.
- (D) IV, II, I, III, V.
- (E) I, II, III, IV, V.

60. Vítima de ferimento por arma branca em hemitórax direito apresenta dispneia. Ao inspecionar o local, o enfermeiro observa presença de lesão aberta, com franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem do ar através do ferimento. Nessa situação, o cuidado imediato a ser prestado pelo enfermeiro consiste em

- (A) promover a hidratação da vítima por meio de acesso central.
- (B) cobrir o ferimento com curativo oclusivo com plástico ou papel metálico com 3 pontos/lados de fixação.
- (C) realizar curativo oclusivo do ferimento, com gazes estéreis e esparadrapo, fixando-o à pele em seus quatro lados.
- (D) colocar a vítima em posição de Fowler.
- (E) puncionar veia periférica e coletar uma amostra de sangue para tipagem sanguínea e prova cruzada, se necessário.

61. Entre outras ações, ao prestar os cuidados imediatos a um politraumatizado com traumatismo craniano, o enfermeiro realizou a repetição seriada da Escala de Coma de Glasgow com resposta pupilar (ECG-P). Ao realizar essa avaliação, deve considerar a

- (A) resposta a estímulos externos, o nível de alerta a abertura ocular e a melhor resposta verbal.
- (B) reatividade pupilar, a melhor resposta motora, a melhor resposta verbal e a pressão arterial.
- (C) abertura ocular, a postura corporal, a resposta verbal e a resposta ao exame dos reflexos profundos.
- (D) abertura ocular, a resposta verbal, a melhor resposta motora e a reatividade pupilar.
- (E) reatividade pupilar, a abertura ocular, o nível de alerta e a melhor resposta motora.

Para responder às questões números **62** e **63**, considere o relato a seguir.

C.H., 54 anos, sexo feminino, obesa, hipertensa, chegou ao ambulatório relatando dor precordial irradiada para o braço e desconforto gástrico. Durante o atendimento inicial, rapidamente evoluiu apresentando confusão mental e parada cardiorrespiratória. Após solicitar o desfibrilador automático externo (DEA), o enfermeiro iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, aplicando compressões torácicas.

62. A frequência (F) e profundidade (P) das compressões torácicas aplicadas em C.H. devem ser, respectivamente, de

- (A) F = 70 a 100 compressões por minuto; P = 8 a 10 cm.
- (B) F = 80 a 100 compressões por minuto; P = 5 a 6 cm.
- (C) F = 60 a 80 compressões por minuto; P = cerca de um terço do diâmetro anteroposterior do tórax.
- (D) F = 80 a 120 compressões por minuto; P = cerca de um terço do diâmetro anteroposterior do tórax.
- (E) F = 100 a 120 compressões por minuto; P = 5 a 6 cm.

63. Ao utilizar o DEA, o enfermeiro deve

- (A) posicionar as pás do desfibrilador na base lateral do tórax, uma à direita e a outra à esquerda.
- (B) aplicar três choques, com intervalo mínimo de 1 minuto entre eles, caso o paciente/cliente não apresente sinais de recuperação.
- (C) certificar-se de que ninguém esteja tocando o paciente/cliente ou o leito.
- (D) suspender seu uso se o paciente estiver em fibrilação ventricular.
- (E) aplicar um choque apenas, imediatamente.

Para responder às questões de números **64** e **65**, leia atentamente o relato a seguir.

E.O., 33 anos, sexo masculino, com história de asma, compareceu ao ambulatório da empresa queixando-se de dificuldade para respirar. O enfermeiro observou que, para se comunicar, o funcionário demonstrava incapacidade de falar mais de algumas palavras antes de parar para respirar. Ao exame físico, o enfermeiro constatou que E.O. apresentava, entre outros sinais, dispneia e retração subcostal moderadas, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca = 112 batimentos por minuto. Considerando tratar-se de uma crise de asma, o enfermeiro solicitou a presença do médico, para avaliação clínica e tratamento, enquanto prestava os cuidados de enfermagem iniciais adequados para o caso.

64. Frente a essa situação, a assistência de enfermagem deve compreender, entre outros cuidados imediatos,

- (A) manter o paciente em posição supina e administrar oxigênio suplementar por máscara com reservatório.
- (B) puncionar veia periférica e administrar medicação com efeito broncodilatador, em bolus.
- (C) manter o paciente sentado e/ou em posição confortável e instalar o oxímetro de pulso.
- (D) instalar cateter nasal e administrar oxigênio úmido, com fluxo de 10 litros por minuto.
- (E) puncionar veia periférica e coletar amostra de sangue arterial para gasometria.

65. Nesse caso, ao realizar a ausculta pulmonar de E.O., o enfermeiro deve constatar a presença de

- (A) roncosp.
- (B) sibilos.
- (C) maciez, em base.
- (D) submaciez, em ápice.
- (E) murmúrio vesicular aumentado.

66. Como medida de prevenção da lombalgia relacionada ao trabalho, o enfermeiro deve orientar os indivíduos cuja atividade exige longos períodos na posição sentado, a

- (A) evitar o uso de cadeira de espaldar reto, com apoio para os braços.
- (B) ajustar a altura da cadeira, de modo a manter os joelhos mais baixos do que o quadril.
- (C) ajustar a altura da área de trabalho, evitando forçar as costas.
- (D) puxar os objetos ao invés de empurrá-los.
- (E) realizar exercícios ativos, contraindo os músculos glúteos por 20 a 30 segundos, por dez vezes, a cada duas horas na posição sentado.

67. Em relação à síndrome de esgotamento profissional ou síndrome de burnout, é correto afirmar que
- (A) por ter o afastamento afetivo como característica central, o trabalhador com o diagnóstico comprovado da síndrome não deve ser afastado do trabalho, mas sim receber tratamento psicoterápico concomitante e dentro da jornada de trabalho.
 - (B) é composta por três elementos: sentimentos de desgaste emocional, esvaziamento afetivo e afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços prestados pelo indivíduo acometido pela síndrome.
 - (C) crise depressiva, anorexia/bulimia, hipersonia, abuso de substâncias lícitas e/ou ilícitas e irritabilidade são alguns dos sinais e sintomas característicos da doença.
 - (D) sua prevenção envolve, entre outras ações, mudanças na cultura da organização do trabalho, estabelecimento de restrições à exploração do desempenho individual, diminuição da competitividade e diminuição da intensidade do trabalho.
 - (E) o trabalho em turnos, a má adaptação ao trabalho e a necessidade de lidar com valores constituem os principais fatores de risco ocupacionais para o desencadeamento da síndrome entre os trabalhadores.
68. Constitui uma das causas da hipertensão arterial secundária relacionada ao trabalho, a exposição ocupacional
- (A) ao ruído.
 - (B) à umidade.
 - (C) a campos eletromagnéticos.
 - (D) ao frio.
 - (E) ao calor/temperaturas elevadas.
69. O técnico de enfermagem (TE) informou ao enfermeiro que, há poucos minutos, após administrar medicação anticoncepcional por via intramuscular em uma funcionária, picou-se, acidentalmente, na polpa digital do polegar direito ao tentar retirar da seringa, com as mãos, a agulha hipodérmica usada. Comunicou ainda que, estava com o esquema vacinal para hepatite B completo, mas que nunca havia realizado os exames para a comprovação da imunidade.
- Para esse tipo de acidente, a conduta do enfermeiro deve compreender, entre outras ações,
- (A) conversar com o funcionário-fonte, orientando-o sobre a importância de informar a equipe de saúde caso adoeça ou se torne positivo para HIV, hepatite B ou hepatite C nos próximos seis meses, para que o TE possa iniciar a quimioprofilaxia para essas doenças.
 - (B) solicitar o consentimento do TE para a realização de exames de comprovação de sua imunidade em relação à hepatite B, bem como a sorologia para HIV e hepatites B e C.
 - (C) lavar com água e sabão e irrigar o ferimento com solução de hipoclorito de sódio a 1%, por pelo menos cinco minutos.
 - (D) considerando que o *status* sorológico da fonte é desconhecido, afastar o TE das suas atividades e prescrever, para início imediato, a quimioprofilaxia para HIV e hepatites B e C com AZT (zidovudina) associado à 3TC (lamivudina), até que se obtenha informações sobre o *status* sorológico do funcionário-fonte.
 - (E) orientar o TE a realizar a expressão do local até obter a saída de uma gota de sangue do ferimento.
70. A prescrição médica é:
- Penicilina cristalina 1.750.000 UI
Diluir em 100 mL de SF 0,9%
Correr em 30 minutos.
- Para a administração dessa medicação estão disponíveis: bomba de infusão, com velocidade programada em microgotas por minuto (mcg/min) e frascos de penicilina cristalina, com 5.000.000 UI. Considerando que foram utilizados 8 mL de diluente para o preparo do medicamento, o volume (V) a ser aspirado do frasco do medicamento e a velocidade de infusão (I) serão de
- (A) $V = 3,5 \text{ mL}; I = 207 \text{ mcg/min.}$
 - (B) $V = 0,35 \text{ mL}; I = 67 \text{ mcg/min.}$
 - (C) $V = 3,5 \text{ mL}; I = 67 \text{ mcg/min.}$
 - (D) $V = 2,8 \text{ mL}; I = 67 \text{ mcg/min.}$
 - (E) $V = 2,8 \text{ mL}; I = 207 \text{ mcg/min.}$

71. Ao realizar um curativo, o enfermeiro deve considerar os vários tipos de coberturas que podem ser utilizadas para promover ambientes adequados e facilitar o processo de cicatrização. Assim sendo, relacione as duas colunas do quadro a seguir de modo a tornar verdadeira a associação entre o tipo de cobertura e sua indicação de uso.

Tipo de cobertura		Indicação de uso	
a.	Carvão ativado com prata	I	Proteção da pele, prevenindo úlceras por pressão, feridas cirúrgicas sem complicação.
b.	Filme transparente semipermeável	II	Feridas infectadas, profundas, com tecido necrótico, odor acentuado, com exsudato de moderado a abundante.
c.	Placas de hidrocoloide	III	Feridas superficiais com pouco exsudato, com ou sem tecido necrótico.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) a-I; b-III; c-II.
- (B) a-II; b-III; c-I.
- (C) a-I; b-II; c-III.
- (D) a-II; b-I; c-III.
- (E) a-III; b-II; c-I.

72. Ao elaborar o procedimento operacional padrão (POP) para uma determinada atividade de enfermagem, os enfermeiros elaboradores estabeleceram a necessidade de utilização de “precauções de contato”, ou seja, para realizá-la é necessário que o executante higienize suas mãos e use

- (A) máscara/respirador PFF2 (N95), apenas.
- (B) óculos de proteção, máscara cirúrgica e caixa para material perfurocortante no descarte de material.
- (C) avental e luvas.
- (D) máscara/respirador PFF2 (N95), óculos de proteção e avental.
- (E) máscara cirúrgica, avental, luvas, gorro e propés.

73. Ao realizar o treinamento do pessoal de enfermagem que participará de campanha anual de vacinação contra a gripe para os funcionários da instituição em que atua, o enfermeiro deve orientá-los que os frascos de vacina vazios ou com sobras de vacina devem ser

- (A) submetidos à autoclavagem por cinco minutos, em temperatura de 121 °C, antes de serem descartados no lixo comum.
- (B) expostos ao calor seco, em estufa, por 5 minutos, a 60 °C, antes de serem descartados no lixo comum.
- (C) descartados, diretamente, junto com os demais resíduos classificados como classe D.
- (D) acondicionados, ao final da jornada de trabalho, em saco branco leitoso.
- (E) acondicionados em caixas coletoras de material perfurocortante.

74. Nas unidades de ambulatório da instituição, a “Incidência de Quase Falha Relacionada à Administração de Medicação” constitui um dos indicadores utilizados na avaliação da qualidade nos processos de trabalho de enfermagem. Para sua construção, entende-se como quase falha a ação que

- (A) inclui apenas a administração de medicamento em via correta, porém em lateralidade incorreta e o tempo de infusão divergente do prescrito.
- (B) atinge o usuário/cliente/paciente, mas não traz consequências para sua saúde.
- (C) atinge o usuário/cliente/paciente, mas é detectada rapidamente e são tomadas as providências necessárias para sua neutralização.
- (D) não atinge o usuário/cliente/paciente, pois foi detectada antes que o medicamento fosse administrado.
- (E) está relacionada apenas com o uso/aplicação de medicamento vencido ou medicamento deteriorado.

CONHECIMENTOS GERAIS

ATUALIDADES E DEVERES DOS SERVIDORES PÚBLICOS

75. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira (29 de outubro) que não buscará um quinto mandato na chefia de governo em 2021 e que deixará a liderança da União dos Democratas Cristãos (CDU) no fim de 2018. “É hora de dar início a um novo capítulo”, afirmou à imprensa, na saída de uma reunião com correligionários, acrescentando que a mudança traz mais oportunidades do que riscos. “Em 2021, não voltarei a disputar a chancelaria nem uma cadeira no Parlamento. E não concorreirei mais a cargos políticos.”

(Folha de S.Paulo, 29 out.18.
Disponível em: <<https://goo.gl/MVBW7d>>. Adaptado)

Entre as razões para as afirmações de Merkel, é correto identificar

- (A) o fracasso do seu projeto de integração econômica europeia.
 - (B) o aumento significativo do desemprego na Alemanha.
 - (C) a perda progressiva de apoio e credibilidade de seu grupo político.
 - (D) a sua oposição malsucedida à participação da União Europeia na guerra civil síria.
 - (E) a rejeição popular à sua política de criminalização da imigração.
76. As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que ocorreram nesta terça-feira, 6 de novembro, vão eleger representantes para as 435 cadeiras da Câmara e um terço do Senado, além de 36 dos 50 governadores.

(Estado de S.Paulo, 6 nov.18.
Disponível em: <<https://goo.gl/RS5a8g>>. Adaptado)

As eleições de meio de mandato marcaram o controle

- (A) Democrata sobre a Câmara e simbolizaram a eleição de um Congresso mais diverso.
- (B) Republicano sobre a Câmara e simbolizaram a eleição de um Congresso mais belicista.
- (C) Republicano sobre a Câmara e simbolizaram a eleição de um Congresso mais conservador.
- (D) Democrata sobre a Câmara e simbolizaram a eleição de um Congresso mais autoritário.
- (E) Democrata sobre a Câmara e simbolizaram a eleição de um Congresso mais isolacionista.

77. TRECHO I

O presidente ordenou a prisão do comandante do Exército por 30 dias, após este se pronunciar publicamente contra um projeto de lei impulsionado pelo governo. O comandante se manifestou contra uma reforma do sistema de pensões militares e uma nova lei orgânica para as Forças Armadas. A detenção conta a partir de segunda-feira (17 de setembro).

(Folha de S.Paulo, 13 set.18.
Disponível em: <<https://goo.gl/nYDtf>>. Adaptado)

TRECHO II

O Exército destituiu nesta semana o diretor da Escola Militar por permitir, em um ato da instituição, uma homenagem a um condenado por crimes cometidos durante a ditadura.

(Exame, 16 out.18. Disponível em: <<https://goo.gl/dDUrrB>>. Adaptado)

Os trechos I e II abordam, respectivamente, situações vividas

- (A) no Equador e na Bolívia.
 - (B) na Colômbia e no Peru.
 - (C) no Uruguai e no Chile.
 - (D) na Argentina e no Paraguai.
 - (E) na Venezuela e no Panamá.
78. Conforme disciplinado na Lei nº 10.261/68, assinale a alternativa correta.
- (A) É vedado a qualquer pessoa reclamar sobre erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público.
 - (B) A Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição quando julgá-la ilegal.
 - (C) Ao servidor público é assegurado o direito de pedir reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias, e recorrer de decisões, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias improrrogáveis.
 - (D) É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos.
 - (E) É assegurado à pessoa jurídica interessada para defesa de seus direitos, após o pagamento das devidas taxas, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder.
79. Nos termos da Lei nº 10.261/68, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que
- (A) apresentar ineficiência no serviço público.
 - (B) apresentar procedimento irregular de qualquer natureza.
 - (C) aplicar indevidamente dinheiro público.
 - (D) abandonar o cargo.
 - (E) lesar o patrimônio ou os cofres públicos.

80. A Lei nº 8.429/1992, nas suas disposições gerais determina que

- (A) quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Juiz competente, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
- (B) a indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
- (C) as disposições desta Lei não são aplicáveis àqueles que não são agentes públicos e prestam serviços voluntários nas Fundações.
- (D) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às penas desta Lei.
- (E) agente público é todo aquele que exerce, com remuneração, por nomeação em decorrência de aprovação em concurso público, cargo público nas entidades da Administração Direta ou Indireta.

81. Constitui um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, dentre outros,


- (A) revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
- (B) praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento previsto na sua área de competência.
- (C) celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais.
- (D) conceder benefício administrativo sem a observância das formalidades legais ou regulamentos diversos.
- (E) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública para compras de materiais específicos da área de saúde.

82. A possibilidade e condição de alcance e utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme disciplinado na Lei nº 13.146/2015, considera-se






- (A) barreiras urbanísticas.
- (B) tecnologia assistiva.
- (C) ajuda técnica.
- (D) acessibilidade.
- (E) barreiras atitudinais.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

83. Tem-se o seguinte documento criado no Microsoft Word 2010, em sua configuração original.



Assinale a alternativa com o resultado, ao posicionar o cursor imediatamente após a palavra eficiência (no final da primeira linha) e pressionar DEL.



84. No Microsoft Windows 10 Pro, em sua configuração padrão, um usuário está utilizando o Explorador de Arquivos para ver os arquivos de uma pasta. O modo de exibição é Ícones Grandes e o usuário selecionou um deles.

Assinale a alternativa que indica onde o usuário consegue o tamanho desse arquivo.

- (A) Barra de endereços, acima dos arquivos exibidos.
- (B) Barra de título, na parte superior da janela.
- (C) Barra de status, na parte inferior da janela.
- (D) As informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são copiadas para a Área de Transferência.
- (E) O usuário deve pressionar as teclas ALT+F4 e as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são exibidas em menu suspenso.

85. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B	C
1	Mês	Qtde	
2	Junho	2	
3	Julho	6	
4	Agosto	8	
5	Setembro	9	
6	Outubro	7	
7			

Assinale a alternativa com o resultado da fórmula =SOMA(B2;B6) a ser inserida na célula B7.

- (A) 9
- (B) 32
- (C) #ERRO
- (D) 7
- (E) 2

86. Rafael tem em seu computador um arquivo chamado contrato.pdf, e o anexou em uma mensagem de correio eletrônico do Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original, que foi enviada para Viviane, com cópia oculta para Tiago, e recebida em seus respectivos computadores, também com o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que indica em quais computadores existe o arquivo contrato.pdf.


- (A) Computadores de Rafael e Viviane, apenas.
- (B) Computadores de Rafael, Viviane e Tiago.
- (C) Computadores de Viviane e Tiago, apenas.
- (D) Computador de Rafael, apenas.
- (E) Computador de Viviane, apenas.

87. Considere a sequência $\left(\frac{1}{5}; \frac{5}{10}; \frac{10}{15}; \frac{15}{20}; \frac{20}{25}; \dots\right)$.

O produto entre o 30º e o 31º termos é igual a

- (A) $\frac{27}{29}$
- (B) $\frac{25}{27}$
- (C) $\frac{31}{33}$
- (D) $\frac{23}{25}$
- (E) $\frac{29}{31}$

88. Considere o diagrama de conjuntos.



O total de elementos do conjunto A é 37. O total de elementos do conjunto C é 37. Sabendo que há elementos em todas as seções e interseções e que x é o dobro de w, o menor número de elementos possível para o conjunto B é igual a

- (A) 30.
- (B) 26.
- (C) 28.
- (D) 32.
- (E) 34.

89. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas.

- I. Ada é alegre e Bete é amigável. Afirmação FALSA.
- II. Carla é faladora ou Dina é compreensiva. Afirmação VERDADEIRA.
- III. Se Ada é alegre, então Dina é compreensiva. Afirmação FALSA.
- IV. Bete é amigável ou Elen é calada. Afirmação VERDADEIRA.


A partir dessas informações é correto afirmar que

- (A) Bete é amigável.
- (B) Dina é compreensiva.
- (C) Elen é calada.
- (D) Ada não é alegre.
- (E) Carla não é faladora.

90. Saí de casa com uma certa quantia comigo. Gastei metade do que tinha e em seguida dei R\$ 3,00 de gorjeta. Continuei e gastei metade do que ainda tinha e novamente dei R\$ 3,00 de gorjeta. Além dessas duas vezes, fiz exatamente a mesma coisa outras duas vezes. Ao final estava com R\$ 17,00. Sendo assim, havia saído de casa com

- (A) R\$ 298,00.
- (B) R\$ 344,00.
- (C) R\$ 384,00.
- (D) R\$ 362,00.
- (E) R\$ 280,00.

91. Considere que haja elementos em todas as seções e interseções do diagrama.



A partir dessas informações, é correto afirmar que

- (A) todos os elementos de A, que não são elementos de B, são elementos de C ou de D.
- (B) não há elemento de B que seja elemento de três conjuntos ao mesmo tempo.
- (C) todos os elementos de C, que não são elementos apenas de C, ou são também elementos de B ou são também elementos de D.
- (D) há elemento de B que seja elemento de outros três conjuntos além do B.
- (E) qualquer elemento de D, que não é elemento de B, é também elemento de C ou elemento de A.

92. Ao realizar caminhadas, um atleta quer que sua trajetória forme triângulos equiláteros. Ele inicia no ponto A e percorre três etapas de 15 metros e completa o primeiro triângulo equilátero (ver Figura 1). O atleta continua, na mesma direção e sentido, outros 15 metros e dessa maneira, ele considera que já percorreu o primeiro lado do segundo triângulo equilátero, agora com medida do lado igual a 30 metros (15 + 15, ver na Figura 2). Observe que parte do primeiro lado do segundo triângulo é o mesmo que o terceiro lado do primeiro triângulo. Ele faz mais duas etapas de 30 metros e completa o segundo triângulo equilátero (ver Figura 3).

FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



Para realizar essa caminhada, até agora, o atleta já caminhou 120 metros. Cada vez que completa um novo triângulo equilátero ele continua caminhando mais 15 metros, na mesma direção e sentido, e esse lado fica sendo o primeiro lado do novo triângulo equilátero.

O atleta continua caminhando dessa maneira até completar, exatamente, o sexto triângulo equilátero. A distância total caminhada pelo atleta foi de

- (A) 720 metros.
- (B) 750 metros.
- (C) 780 metros.
- (D) 800 metros.
- (E) 830 metros.

93. Considere a afirmação: 'Se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado.' Uma afirmação logicamente equivalente a ela é

- (A) Não administro o remédio nos intervalos previstos ou não ofereço nas quantidades corretas e o paciente não está bem cuidado.
- (B) Não administro o remédio nos intervalos previstos e não ofereço nas quantidades corretas ou o paciente não está bem cuidado.
- (C) Se o paciente não está bem cuidado, então não administro o remédio nos intervalos previstos ou não ofereço nas quantidades corretas.
- (D) Se o paciente está bem cuidado, então administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas.
- (E) Administro o remédio nos intervalos previstos ou ofereço nas quantidades corretas e o paciente está bem cuidado.

94. 'Gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró ou troco isso por uma praia'. Uma afirmação que corresponda à uma negação lógica dessa afirmação é

- (A) Não gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró, e troco isso por uma praia.
- (B) Gosto de ouvir clássicos e não amo cantar forró, e troco isso por uma praia.
- (C) Não gosto de ouvir clássicos e não amo cantar forró ou não troco isso por uma praia.
- (D) Não gosto de ouvir clássicos ou não amo cantar forró, e não troco isso por uma praia.
- (E) Gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró e não troco isso por uma praia.

95. Em uma enquete na qual as pessoas deveriam escolher apenas um dentre A ou B, a razão entre o número de votos em A e o número de votos em B foi $\frac{7}{13}$. Foram 102 votos a mais em B do que em A. O número de pessoas que votaram nessa enquete foi
- (A) 285.
(B) 298.
(C) 317.
(D) 352.
(E) 340.
96. A média aritmética simples dos números 9, 12, 13, 16, 16 e 24 é a soma de todos eles dividida por 6. O maior desses números supera essa média aritmética simples em
- (A) 55%
(B) 60%
(C) 45%
(D) 65%
(E) 50%
97. O planejamento de um filme era que ele durasse 1 hora e 40 minutos. Os atores do filme reclamaram e o diretor aumentou esse tempo em 15%. Ao serem realizadas as filmagens verificou-se que o tempo excedeu o tempo planejado (já com os 15% de acréscimo) em 20%. Desse modo o tempo total do filme, após esses aumentos, é de
- (A) 2 horas e 25 minutos.
(B) 2 horas e 20 minutos.
(C) 2 horas e 18 minutos.
(D) 2 horas e 27 minutos.
(E) 2 horas e 15 minutos.
98. Considere apenas os dados a seguir para resolver a situação. Suponha que viajando a 65 km/h minha viagem durou exatamente 2 horas e 15 minutos. Suponha também que essa mesma viagem fosse feita a 75 km/h. Nesse caso, o tempo de viagem diminuiria em
- (A) 18 minutos.
(B) 28 minutos.
(C) 15 minutos.
(D) 13 minutos.
(E) 35 minutos.

99. Considere três números naturais, representados por x , y e z , respectivamente. Sabe-se que a divisão de x por 5 resulta no quociente y e resto 3, e que a divisão de y por 5 resulta no quociente z e resto 1, e que a divisão de z por 5 resulta no quociente 3 e resto 4. O resultado de $x - y$ é
- (A) 391.
 - (B) 413.
 - (C) 402.
 - (D) 425.
 - (E) 387.
100. Um paciente precisa tomar 3 g de um certo remédio a cada 4 horas, durante 3 dias completos. Sabendo que cada comprimido desse remédio contém 200 mg e que cada caixa contém 40 comprimidos, o número mínimo de caixas que precisam ser utilizadas para cumprir a prescrição é
- (A) 6.
 - (B) 7.
 - (C) 5.
 - (D) 8.
 - (E) 9.

